

## 第十九章 其它药

本章所收载的药物,大都用于外科疾患,临床上以外用为主,具有消肿解毒、收敛止血、化腐生肌、排脓止痛等作用。

其中某些具有剧毒的药物,如用于内服时应注意严格控制剂量,不能过量和持续使用。在剂型方面,内服一般宜作为丸剂,取其缓缓溶解吸收。在炮制方面,应严格遵照一定的操作要求,以保证用药安全。

除上述治疗外科疾患的药物外,对其它具有涌吐、截疟等作用的药物,由于药数较少,不能自成一章,或不能恰当地归入以上各章,也附编在内。

### 蟾酥(附:蟾皮)

【科属与药用部分】本品为蟾蜍科动物大蟾蜍及黑眶蟾蜍的耳后腺及皮肤腺分泌物,经加工而成。

【性味与归经】甘、辛,温。有毒。入心、胃经。

【功效】解毒消肿,止痛,辟秽浊。

【临床应用】1.用于疮痈肿毒,咽喉肿痛等症。

**蟾酥**具有解毒消肿止痛的功效。用于痈疽、疮肿、咽喉肿痛,常配合腐香、**生黄**等制成丸剂内服。

2.用于暑天饮食不洁、吐泻腹痛等症。

**蟾酥**功能辟秽浊,故对暑天感受秽恶导致的吐泻腹痛,常与茅朮、**雄黄**、**麝香**等制成丸剂应用。

【处方用名】**蟾酥**。

【一般用量与用法】外用适量。内服每次一毫至二毫,为粉末入丸剂用,不入煎剂。本品有毒,不宜久服。

【附药】**蟾皮**:即蟾蜍刮去**蟾酥**、除去内脏的干燥尸体。性味辛凉有小毒。功能杀虫治痛,拔毒疗疮。适用于小儿虫积痛热,痈疡肿毒、恶疮等症。一般用量为一钱至二钱,煎服。或入丸散中用,每次吞服量一般为一分至三分。

【方剂举例】**蟾酥丸**(外科正宗):**蟾酥**、**雄黄**、**轻粉**、铜绿、枯矾、寒水石、胆矾、乳香、没药、**麝香**、**朱砂**、蜗牛。治疗毒初起及诸恶疮。

【文献摘录】《药性本草》:「取眉脂,以**朱砂**、**麝香**为丸如麻子大,治小孩子疳瘦,空心服一丸;如脑髓,鞞汁调,滴鼻中。」

〔本草衍义〕：「治齿缝出血及牙疼，以纸纫少许，按之立止。」

〔本草纲目〕：「疗发背疗疮，一切恶肿。」

## 雄黄

〔药用〕本品为含硫化砷的矿物。

〔性味与归经〕辛，温。有毒。入肝、胃经。

〔功效〕解毒，杀虫。

〔临床应用〕1.用于痈疮肿毒、虫蛇咬伤等症。

**雄黄**能疗疮毒，如疗疮肿毒，可配合螺酥、**朱砂**等药用于外敷，或制成丸剂内服。如虫蛇所伤，可配合五瓓脂，研成细末，外敷，或制成蛇药内服，以奏解毒之效。

2.用于虫积腹痛、疥癣等症。

**雄黄**能毒杀蛔虫等一些肠寄生虫，内服可作驱虫药，一般配合苦楝根皮、槟榔、**牵牛子**、**大黄**等同用。对疥癣，本品可以配**轻粉**、大风子等外搽。

此外，**雄黄**又可合**常山**等药用治疟疾。另有用本品与艾叶、苍朮、**白芷**等药作烟熏剂，可作房舍、畜厩的消毒剂。

〔处方用名〕**雄黄**、雄精、腰黄（生用，内服，须飞边用。本品不宜用火炮制）。

〔一般用量与用法〕外用适量。内服每次五厘至一分。一般入丸散，不入汤剂；且不能持续服用，以免蓄积中毒。

〔方剂举例〕红璣丹（验方）：**雄黄**、**麝香**、**朱砂**、**青礞石**、银硝、硼砂、**冰片**治中暑，发疔，头晕胸闷，腹痛吐泻。

〔文献摘录〕《本经》：「主寒热鼠痿恶疮，疽痔死肌，杀百虫毒。」

〔别录〕：「疗疥虫匿疮，目痛，鼻中息肉。」

〔大明本草〕：「主疥癣，风邪癩痢，岚障，一切虫兽伤。」

〔本草纲目〕：「治疟疾寒热，伏暑泄痢，酒饮成癰，蚤滴，头风弦晕。」

## 硼砂

〔药用〕本品为硼砂矿石加工品。

〔性味与归经〕甘、咸，凉。入肺、胃经。

〔功效〕解毒、清热化痰。

【临床应用】1.用于咽喉肿烂，目赤肿痛等症。

硼砂有良好的解毒作用，常和冰片、玄明粉、朱砂等研粉制成吹口药，以治口疮、咽喉肿烂。亦可和冰片等制成眼药，或洗眼剂以疗目赤肿痛。

2.用于热痰咳嗽。

硼砂内服有清化痰热作用，可单用或与蛤粉、瓜蒌、贝母等同用。

【处方用名】硼砂、月石、西月石（打碎或研粉用）。约月石（约用）。

【一般用量与用法】内服二分至三分。外用适量。

【方剂举例】四宝丹（疡医大全）：硼砂、冰片、甘草、雄黄外用治鹅口疮。

【文献摘录】《大明本草》：「当痰止嗽，破瘕结喉痹。」

《本草纲目》：「上焦痰热，生津液，去口气，消障翳，除噎膈反胃，阴溃，骨哽，恶疮，及口齿诸病。」又云：「能去胸膈上焦之热。……治噎膈积聚，骨哽结核，恶肉阴质……痰热眼目障翳……。」

## 礞砂

【药用】本品为矿石，有紫、白紫种，紫礞砂为紫色石盐，白礞砂为氯化铯矿石。

【性味与归经】咸、苦、辛，温。有毒。入肝、脾、胃经。

【功效】消积祛瘀，软坚散结。

【临床应用】1.用于痈疽疔毒，鼻中赘肉。

礞砂为性温有毒之物，外科用以治疗痈疽疔毒，未成可消，已成能溃，有散结、去腐的作用；并能去鼻中赘肉。

2.用于噎膈反胃，症瘕等症。

本品能消积去瘀，故可用于噎膈反胃，症瘕积块等症。

【处方用名】红礞砂、白礞砂（研粉用）。

【一般用量与用法】一分至二分，吞服，或入丸散。外用适量。

【方剂举例】立马回疔丹（外科正宗）：礞砂、蟾酥、轻粉、丁香、蜈蚣、雄黄、朱砂、乳香、麝香、金顶砒。治疗毒走黄。

【文献摘录】《唐本草》：「主治积聚，破结血，止痛下气，疗咳嗽宿冷，去恶肉，生好肌。」

《本草衍义》：「去目翳胬肉。」

《本草纲目》：「治噎膈症瘕，积痢，骨哽，除痔[灰黑]疣赘。」

## 砒石

【药用】本品为络华矿石。

【性味与归经】辛、酸，大热。有大毒。入肺经。

【功效】外用蚀疮去腐。内服截疟，劫痰平喘。

【临床应用】1.用于痔疮、管、瘰疬、牙疳。

砒石外用有去腐拔毒的作用，现在常合枯矾、[乌梅肉](#)等用以蚀痔；又可合枯矾、[朱砂](#)、石膏等用于管、瘰疬等症。此外，本品合红枣同研末，可治走马牙疳。

2.用于寒喘气促，不得平卧。

砒石性温，能劫寒痰，以奏平喘之功，常合淡豆豉，研制成丸，内服以疗寒性哮喘、咳嗽、痰多清稀等症。

此外，据古代文献记载，本品又可用以截疟。但现在临床上很少应用。

【处方用名】白砒、白信、砒石、信石、砒霜（均为白信石，质较纯而为较强）。红砒、红信（均为红信石，含有杂质）。

【一般用量与用法】内服每次一毫至二毫，每日一次，入丸剂。外用适量。

【按语】本品有剧毒，内服都须用绿豆或豆腐同煮后应用，不能多服或持续久服，以防中毒。孕妇忌用。

【方剂举例】紫金丹（本事方）砒石，豆豉。治寒喘。

【文献摘录】《开宝本草》：「疗诸疟，风痰在胸隔，可作吐药；不可久服，伤人。」

《本草纲目》：「除[鼻]喘积痢，烂肉，蚀瘰疬、蚀痛疽败肉，枯痔杀虫。」

## 斑蝥

【科属与药用部分】本品为鞘翅目豆象科昆虫[斑蝥](#)或苦苣**[斑蝥](#)**的虫体。

【性味】辛，寒。有毒。

【功效】外用攻毒蚀疮，内服破症散结。

【临床应用】1.用于疮疽瘰疬等症。

[斑蝥](#)对皮肤有强烈的刺激作用，能引起皮肤发赤，继则起水泡，如敷贴过久，对肌肤有腐蚀作用。据文献记载，前入有用本品炒酥研末，调蜜外敷，以治疮疽瘰疬。现临床应用不多。

2.用于症瘕积聚等症。

据文献记载，本品有破症散结之功，可用于症瘕积聚等症。近代有用斑笮微量，配合其它药物，用以治疗癌肿。

此外，本品研末放膏药中贴大椎穴(在发作前1～3时贴)，起水泡即去掉，可截疟。

【处方用名】斑笮(糯米同炒，去头翅用)。

【一般用量与用法】二厘，研末，入丸散用。外用适量。

【方剂举例】斑笮酒(全国中草药新医疗法展览会技术资料选编)：斑笮、樟脑、白酒，外用治神经性皮炎。

【文献摘录】《本经》：「主寒热鬼疟，蛊毒，鼠疮疽，蚀死肌，破石癰。」

《本草纲目》：「治疔瘕，解疗毒、碯犬毒、沙虱毒、蛊毒、轻粉毒。」

## 石灰

【药用】本品为石灰石类矿物 烧而成的块状物，或再经吸取水分而得的粉状物。

【性味】辛，温。有毒。

【功效】解毒，止血。

【临床应用】外用于汤火烫伤，创伤出血等症。

本品有较强的解毒和止血作用，用风化石灰一斤，加水四碗，浸泡，搅拌，澄清后，吹去水面浮衣，取中间清水，每水一份加麻油一份，调成乳状，磨涂汤火伤处；又陈石灰研末，可作刀伤止血药用。此外，本品还可用以腐蚀赘疣、黑痔。

【处方用名】生石灰(用以腐蚀赘疣、黑痔)。熟石灰、陈石灰(用于烫伤)。

【一般用量与用法】外用适量，不作内服。

【方剂举例】桃衣散(外科正宗)：风化石灰、生大蓟。外用治创伤出血。

【文献摘录】《本经》：「主疽疥瘙，热气恶疮，窥疾，死肌堕眉，杀痔虫，去黑子息肉。」

《本草纲目》：「散血定痛，上水泻血病....。」又云：「石灰，止血....，但不可着水，着水即烂肉。」

## 轻粉

【药用】本品为由水银与其它物质加工制成的粉末。

【性味】辛，寒。有毒。

【功效】杀虫，逐水。

【临床应用】1、用于疥癣、[月廉]疮等症。

**轻粉**外用有杀虫作用，可合**雄黄**、大风子等疗疥癣。合石膏等有拔毒收敛作用，可疗[月廉]疮等症。

2、用于水肿、二便秘结等症。

**轻粉**内服有泻下逐水作用，可配合**大黄**、**牵牛子**等同用。

【处方用名】**轻粉**、汞粉、膩粉(研细应用)。

【一般用量与用法】外用适量。内服每次一厘至二厘。宜入丸剂，不入汤剂，且不能过量，也不能持续服用，以防汞中毒。孕妇忌用。

【方剂举例】疯油膏(经验方)：**轻粉**，东丹、**朱砂**、黄芩。外用治鹅掌风、神经性皮炎、皮肤皲裂，干燥作痒者。

【文献摘录】《本草拾遗》：「通大肠，转小儿疳并瘰疬，杀疮疥癣虫，及鼻上酒猪，风疮瘙痒。」

《本草纲目》：「治痰涎积滞，水肿鼓胀，毒疮。」

## 大风子

【科属与药用部分】本品为大风子科植物大风子树及同属植物的成熟种子。

【性味】辛，热。有毒。

【功效】祛风，杀虫。

【临床应用】用于麻风、疥癣等症。

本品有祛风燥湿杀虫的作用，临床常配合**苦参**、**白用藜**、大胡麻、**苍耳子**、**防风**、白花蛇、**草乌**等药做成丸剂，内服治疗麻风；又可配合土槿皮、**地肤子**、**硫黄**、樟脑等药，外用治疥癣等症。

【处方用名】大风子、大枫子(打碎用)。

【一般用量与用法】内服一次量一分至三分。外用适量。

【方剂举例】大风诸痢方(普济方)：大风子、**苦参**末。用于风癣疥癩。

【文献摘录】《本草纲目》：「治风癣疥癩，……攻毒杀虫。」

## 蜂房

【药用】本品为胡蜂科昆虫**大黄蜂**等所造的巢。

【性味与归经】甘，平。有毒。入胃经。

【功效】祛风攻毒，散肿止痛。

【临床应用】用于龋齿疼痛，痈疽，瘰疬，疮癣等症。

本品性味甘平有毒，具有祛风攻毒，散肿止痛之功，用治龋齿疼痛，可与乳香、[细辛](#)等配合煎水合漱，或与[全蝎](#)同研擦牙；治痈疽、瘰疬等症，可与乳香、没药、[蒲公英](#)等配合应用。

【处方用名】露[蜂房](#)、[蜂房](#)（炙用）。

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【方剂举例】[蜂房膏](#)（证治准绳）：露[蜂房](#)、蛇脱、玄参、[蛇床子](#)、黄耆、杏仁、乱发、铅丹、笮。治瘰疬。

【文献摘录】《别录》：「合乱发、蛇皮烧灰，以酒日服二方寸匙，治恶疽附骨痛。」

《大明本草》：「煎水漱牙齿，止风虫疼痛。」

## 木槿皮（附：土槿皮、木槿花、木槿子）

【科属与药用部分】本品为锦葵科植物木槿的茎皮。

【性味与归经】甘，平。入大肠经。

【功效】杀虫治癣。

【临床应用】用于皮肤疥癣等症。

本品有杀虫止痒的作用，以治皮肤疥癣，一般多作外用，以木槿皮浸液磨[雄黄](#)，治疥疮；用醋调涂可治顽癣。

【处方用名】木槿皮、川槿皮（洗净，晒干，切碎用）。

【一般用量与用法】外用适量。

【附药】1、土槿皮：为松柏科金钱松的根皮。杀虫治癣的作用较木槿皮强，为目前治疗体癣、脚癣等症的常用药物。有毒，只供外用。

2、木槿花：又叫白槿花。即木槿的白色花。性味苦寒。功能清热解毒。治痢疾、泄泻、白带等。一般用量为一钱至三钱，煎服。或研粉吞服，每次五分至一钱。

3、木槿子：即木槿的果实。性味苦平。功能清肺化痰。治肺热咳嗽。一般用量为三钱至四钱，煎服。

【方剂举例】一号癣药水（经验方）：土槿皮，大枫子肉、[地肤子](#)、[蛇床子](#)、[硫黄](#)、白藜皮、枯矾、[苦参](#)、樟脑、酒。外治手癣、足癣等症。

【文献摘录】《本草拾遗》：「止肠风泻血，痢后热渴。」

〔本草纲目〕：「治亦白带下，肿痛疥癣。」

〔本草纲目拾遗〕：「杀虫，为治癣良药。」

## 绿矾

〔药用〕本品为含硫酸亚铁的矿石，或化学制品。

〔性味与归经〕酸，寒。入肝、脾经。

〔功效〕燥湿，杀虫，补血。

〔临床应用〕1、用于湿疹，疥癣。

本品有燥湿、杀虫、止痒作用，治疗湿疹、疥癣时，可用本品研末外搽，或烧汤熏冻。古代文献有用皂矾配楝树子，研末外搽，治白秃头疮，亦取其燥湿、杀虫的作用。

2、用于黄胖病。

黄胖病，大都为钩虫病引起，症见神疲乏力，腹胀纳呆，面黄虚肿等。绿矾有一定的补血作用，临床常与茅朮、[厚朴](#)、[陈皮](#)、[甘草](#)等配伍应用，治黄胖病。

〔处方用名〕绿矾、青矾、皂矾、绛矾（成绛色）。

〔一般用量与用法〕三厘至一分，和丸内服。外用适量。

〔方剂举例〕绛矾丸（验方）：绿矾、[厚朴](#)、[甘草](#)、红枣、茅朮、[陈皮](#)治黄疸腹胀，面浮足肿。

〔文献摘录〕《新修本草》：「疔及诸疮。」

《大明本草》：「喉痹虫牙口疮，恶疮疥癣，酿鲫鱼烧灰服，疗肠风泻血。」

〔本草纲目〕：「消积滞，燥脾湿，化痰涎，除胀满黄肿疔利，风眼口齿诸病。」

## 樟脑

〔科属与药用部分〕本品为樟科植物樟树的木材及枝叶经蒸馏精制而成的结晶。

〔性味与归经〕辛，热。有毒。入心经。

〔功效〕外用除湿杀虫，散肿止痛。内服开窍辟秽。

〔临床应用〕1、用于疥癣疮痒及跌扑损伤，瘀滞肿痛等症。

本品有杀虫止痛之功，治疗疥疮痒，可与[硫黄](#)、[枯矾](#)、[苦参](#)、[黄柏](#)等配合外用。本品又能散肿止痛，可用酒精配成酊剂外擦，以治跌扑损伤、瘀滞肿痛。

2、用于中恶、卒然昏倒，或热病神识昏迷等症。

樟脑辛香走窜，有类似**冰片**的芳香开窍和辟秽化浊的作用，治卒然昏倒，或热病神识昏迷等症，可与**麝香**等配合入散剂或制成丸剂用。

【处方用名】樟脑

【一般用量与用法】内服一分至二分，须与其它药配合制成丸剂用(不入煎剂)。外用适量。

【方剂举例】樟脑酒(验方)：樟脑、乳香、没药、酒。治疹气腹痛。

【文献摘录】《本草纲目》：「通关窍，利滞气，治中恶邪气，霍乱心腹痛，寒湿脚气，疥癣风瘙，龋齿，杀虫辟蠹。」

## 硫黄

【药用】本品为天然**硫黄**矿或含硫矿物的提炼品。

【性味与归经】酸，温。有毒。入肾、大肠经。

【功效】杀虫，补火助籛。

【临床应用】1、用于疥癣，阴疽等症。

本品有以毒攻毒的作用，且有杀虫之功，对于疥癣，可配伍**轻粉**，大风子等同用；还可外敷阴疽，有消散的功效。

2、用于命门火衰，腰酸膝冷，籛痿，以及肾气不纳所致的喘逆和虚寒腹痛等症。

本品有补火助籛之功，对命门火衰所致的腰酸、籛痿，及虚寒腹痛等症，可与**附子**、**肉桂**等配合应用；治疗肾气不纳的喘逆，可配合黑锡、**补骨脂**、**葫芦巴**等同用。

此外，本品还可用于虚寒便秘。

【处方用名】**硫黄**(与豆腐同煮后用)。

【一般用量与用法】一日量三分至八分，入丸、散。外用适量。

【方剂举例】半硫丸(和剂局方)：半夏、**硫黄**、姜汁。治虚寒便秘。

【文献摘录】《本经》：「主妇人阴蚀，疽痔，恶血，坚筋骨，除头秃。」

《药性本草》：「能下气，治脚弱腰肾久冷，除冷风顽痹。」又云：「生用治疥癣，及疗寒热咳逆。」

《本草图解》：「主命门火衰，籛气暴绝，阴证伤寒，籛道痿弱，老人虚秘，妇人血结，虚寒久痢，心腹积聚。」

## 炉甘石

【药用】本品为天然产的菱锌矿。

【性味】甘，平。

【功效】明目去翳，收湿敛疮。

【临床应用】1、用于目赤肿烂、目翳等症。

[炉甘石](#)有去腐解毒、收湿退翳的作用，可配[黄连](#)、朴硝、硼砂、[冰片](#)等制成眼药点眼，以治睑缘炎及结膜炎等症，并可疗翳膜孪肉。

2、用于疮疡、湿疹等症。

[炉甘石](#)具收敛吸湿的作用，能防腐敛疮，常可与[黄柏](#)、[滑石](#)、[青黛](#)、石膏粉等用于湿疹及疮疡不敛，脓水淋漓。

【处方用名】[炉甘石](#)、飞甘石（，淬[黄连](#)等汁后，水飞用）。

【一般用量与用法】外用适量，不作内服。

【方剂举例】[炉甘石散](#)（证治准绳）：[炉甘石](#)、片脑、[黄连](#)、[黄柏](#)。治目赤翳障。

【文献摘录】《本草纲目》：「止血，消肿毒，生肌，明目去翳，退赤，收湿除烂。」

## 孩儿茶

【药用】本品为豆科植物[儿茶](#)树的枝干加水煎汁浓缩而成的干浸膏。

【性味与归经】苦、涩，平。入肺经。

【功效】收湿、敛疮、止血。

【临床应用】用于疮疡多脓水，久不敛口，牙痛及外伤出血。

本品以外用为主，用于疮疡多脓汁黄水，或久不敛口，以及牙疳溃烂等症，与龙骨、[冰片](#)等药配合，能起收湿作用，并有生肌敛口等功效。

此外，本品外用能止血，可用于外伤出血。内服能止泻，还能治泻痢便血等症。

【处方用名】孩[儿茶](#)、铁[儿茶](#)、珠[儿茶](#)、[儿茶](#)

【一般用量与用法】五分至一钱，包煎。或微炒研粉入丸散吞服，每服一分至三分。外用适量。

【方剂举例】龙骨[儿茶散](#)（医宗金鉴）：龙骨、[儿茶](#)、[轻粉](#)、[冰片](#)，为末外用。治皮肤破烂，湿疮。

【文献摘录】《本草纲目》：「清上隔热，化痰生津，涂金疮一切诸疮，生肌定痛，止血收湿。」

《本草求真》：「凡一切口疮喉痹，时行瘟疫，烦躁口渴，并一切吐血、衄血、便血、尿血，血痢，及妇人崩淋，经血不止，阴疝痔肿者。」

## 血竭

【药用】本品为棕搁科植物麒麟竭及其同属植物的果实和树干渗出的树脂。

【性味与归经】甘、咸，平。入心胞、肝经。

【功效】行瘀，止血，止痛，敛疮生肌。

【临床应用】1、用于金疮或折跌瘀血凝滞作痛等症。

本品能祛瘀行滞、止血定痛，治刀伤或跌扑损伤、瘀滞疼痛等症，常与[儿茶](#)、乳香等配合应用。

2、用于疮口不敛等症。

本品外用有收敛防腐保护疮面的作用，能促使疮面愈合，对疮口不合，可以同[儿茶](#)、乳香、没药等配合研末外敷。

【处方用名】[血竭](#)、麒麟竭

【一般用量与用法】内服三分至五分，入丸散。外用适量。

【方剂举例】[血竭散](#)（[砒氏尊生](#)）：[血竭](#)、[大黄](#)、[自然铜](#)。治皮骨破折。

【文献摘录】《新修本草》：「疗心腹卒痛，金疮出血，破积血，止痛，生肌，去五脏邪气。」

《海药本草》：「伤折打损，一切疼痛，血气搅刺，内伤血聚，并宜酒服。」

《大明本草》：「敷一切恶疮疥癣久不合。」

## 象皮(附：象牙屑)

【药用】本品为脊椎动物象科象的外皮。

【性味】甘、咸，寒。

【功效】敛疮生肌。

【临床应用】用于疮口久不愈合等症。

本品功专收敛，能生肌敛疮，促使疮面愈合，治溃疡不敛，可以本品同[珍珠](#)、[冰片](#)、[血竭](#)、孩[儿茶](#)等药研末外敷。

【处方用名】象皮(炙用)。

【一般用量与用法】外用适量。

【附药】象牙屑：为象牙的屑末。性味甘寒。功能清热定蚤，拔毒生肌。适用于痰热蚤痢，喉痹肿痛，痈肿疮毒，痔漏等症。一般用量为一钱至三钱，煎服。或研细入丸散，或外用。

【方剂举例】[珍珠散](#) (张氏医通) : [珍珠](#)、[炉甘石](#)、[唬泊](#)、[龙骨](#)、[赤石脂](#)、[钟乳石](#)、[朱砂](#)、[麒麟竭](#)、[象皮](#)。治外症溃烂不长肉。

【文献摘录】《本草纲目》：「下疳，烧灰和油敷之。又治金疮不合。」

## 松香

【药用】本品为松科植物马尾松及其同属多种植物的树脂。

【性味】苦、甘，温。

【功效】生肌止痛，燥湿杀虫。

【临床应用】用于痈疔，疥癣等症。

本品通常作为外用药，治痈疔、疥癣湿疮瘙痒等症。治痈疔，可与蓖麻子、东丹等配用；治疥癣湿疮，可与[轻粉](#)、[麻油](#)等配用。

【处方用名】松香

【一般用量与用法】外用适量。

【方剂举例】[千捶膏](#) (经验方) : 松香、蓖麻子、[轻粉](#)、东丹、银朱、[茶油](#)。外治痈、疔、疔等。

【文献摘录】《本经》：「痈疽恶疮，头疡白秃，疥瘙风气，安五脏，除热。」

《药性本草》：「煎膏，生肌止痛，排脓祛风，贴诸疮、脓血 烂，塞牙孔杀虫。」

## 铅丹

【药用】本品为纯铅加工而成的四氧化三铅。

【性味与归经】辛，微寒。有毒。入脾、肝经。

【功效】外用拔毒生肌；内服杀虫，截疟。

【临床应用】用于疮疡多脓。

本品主要外用于散剂及膏药中，能与植物油化合，为制膏药的基础剂，有较好的解毒收敛作用。如经验方红油膏，即用本品配合九一丹(熟石膏九钱、升丹一钱)，调入油膏内，有防腐生肌作用，可治溃疡不敛。

此外，内服小量可坠痰截疟，又可用于虫积腹痛，因本品有毒，故目前临床上罕少应用。

【处方用名】铅丹、黄丹、广丹、东丹

【一般用量与用法】内服一分至二分，入丸散。不可过量，以防中毒。外用适量。

【文献摘录】《本经》：「主吐逆胃反，蚤病癩疾。」

〔药性本草〕：「煎膏用止痛生肌。」

〔本草衍义〕：「治疟及久积。」

〔本草纲目〕：「坠痰杀虫。」

## 毛窠

〔科属与药用部分〕本品为毛窠科植物毛窠的全草。

〔性味〕辛，温。有毒。

〔功效〕截疟，退黄。

〔临床应用〕1、用治疟疾。

本品有毒，临床上一一般作为外用。用鲜草少许，洗净，打烂，在疟疾发作前6小时敷于大椎穴，皮肤有灼热感时，即除去。

2、用治黄疸

用本品治肝炎黄疸，亦可采用外治法（用法同上），贴于寸口或内关上（也可垫薄姜片一块），皮肤有灼热感时，即除去。

3、用治哮喘。

用法同上，敷大椎穴；或取鲜叶少量，揉烂，用纱布包，塞鼻孔内，喘平后即除去。

本品有毒，只供外用，一般不作内服；外敷数小时后皮肤可引起发泡热痛，发泡后，要保持清洁，避免感染。

〔处方用名〕毛窠、老虎脚爪草（鲜草，洗净，打烂用）。

〔一般用量与用法〕外用适量。

〔文献摘录〕《本草拾遗》：「恶疮痈肿，疼病未溃，捣叶敷之，不得入疮内令肉烂；又患疟人，以一握微碎，缚于臂上；……和姜涂腹，破冷气。」

## 马钱子(附:土木鳖)

〔科属与药用部分〕本品为马钱科植物马钱的成熟种子。

〔性味与归经〕苦，寒。大毒。入肝、脾经。

〔功效〕通经络，消结肿，止疼痛。

〔临床应用〕1、用于风湿疼痛，经络拘挛。

本品有通经络的功效,又能止疼痛,常与羌活、川乌、乳香、没药等药物配合,治疗风湿疼痛、经络拘挛之症。

2、用于跌扑损伤肿痛,以及阴疽。

在伤科、外科方面,取马钱子消肿胀、止疼痛,治疗跌扑损伤、骨折等瘀滞肿痛之症,可与自然铜、骨碎补、乳香、没药等同用;治疗阴疽,可与草乌、当归、地龙等药配合。

本品近年来有用于食道癌、胃癌、直肠癌以及肺癌等。因其毒性剧烈,一般须经过严格的加工炮制后,再配合甘草等解毒药制成丸剂应用。临床观察,近期疗效比较好,但远期疗效不很明显,有待于进一步研究。

【处方用名】番木鳖、马钱子(水浸10天,每天换水一次,刮去毛,切片,阴干,用麻油炸成外焦黄内里深黄色后应用)。

【一般用量与用法】内服一日量为二厘至三厘。外用适量。

【附药】土木鳖,又名木鳖子、方八。为多年生蔓生草本葫芦科植物木鳖的种子。性味甘温有毒。功能消积块,化肿毒。适用于肿毒,乳痈,恶疮,瘰疬,痔疮,跌扑损伤肿痛,腰痛等症。一般作为外用。

【方剂举例】散瘀和伤汤(正骨心法要旨):番木鳖、红花、生半夏、骨碎补、甘草、葱须。治一切撞伤、瘀血积聚。

治伤消瘀丸(上海中成药)马钱子、麻黄、地鳖虫、自然铜、乳香、没药、香附、骨碎补、红花、蒲黄、赤芍、桃仁、泽兰、五玳脂。治跌扑损伤。

【文献摘录】《本草纲目》:「伤寒热病,咽喉痹痛,消痞块,并含之咽汁,或磨水噙咽」

《本草从新》:「治咽喉痹痛,消痞块。」

## 蒟蒻

【科属与药用部分】本品为天南星科植物蒟蒻的球茎。

【性味】辛,寒。有毒。

【功效】消肿,解毒。

【临床应用】用于痈疔肿毒等症。

本品有消肿解毒的功效,治痈疔肿毒,常与蒲公英、紫花地丁、银花、连翘等配合应用。或单用本品,适量捣烂外敷患处,但不可过久,以免发泡。

此外,本品又可用于瘰疬结核等症;近年来临床上有人用本品治癌肿、脑瘤等病。

【处方用名】蒟蒻、魔芋、鬼笔烛、蛇六谷(洗净,晒干,切片用)。

【一般用量与用法】三钱至八钱，煎服(本品有毒，须煎二小时以上，滤去渣，取汁服，切勿吃渣，以免中毒)。

## 常山(附:甜茶)

【科属与药用部分】本品为虎耳草科植物黄常山的根。

【性味与归经】苦、辛，微寒。有小毒。入肺、心、肝经。

【功效】截疟。

【临床应用】用于疟疾。

常山能杀灭疟原虫，为中医沿用已久的抗疟专药，可以控制疟疾症状的发作，并有良好的退热作用，常和知母、槟榔、草果同用。但本品服后往往能引起恶心呕吐，因此，过去也用作催吐药，用以治疗胸中有痰饮积聚之症。然而吐法在目前临床上已很少采用，而用治疟疾则又有一种不良副作用，故在临床上往往配合半夏、陈皮同用，以防止发生恶心呕吐等症的反应。

【处方用名】常山、炒常山、鸡骨常山(用麸皮同拌炒至黄色)。

【一般用量与用法】一钱至三钱，煎服。

【附药】蜀漆：又名甜茶。即常山的苗叶。性味、功效、用量均同常山。根据现代研究，它的抗疟作用较常山为强。

【方剂举例】截疟七宝饮(杨氏家藏方)：常山、草果、槟榔、青皮、厚朴、陈皮、甘草。治疟疾。

【文献摘录】《本经》：「主伤寒寒热，热发温疟……，胸中痰结，吐逆。」

《本草纲目》：「常山、蜀漆，有劫痰截疟之功。」又云：「常山、蜀漆，生用则上行必吐，酒蒸炒熟用则气稍缓，少用亦不至吐也。」

## 瓜蒂

【科属与药用部分】本品为葫芦科植物甜瓜的果柄。

【性味与归经】苦，寒。有小毒。入胃经。

【功效】涌吐痰食。

【临床应用】用于痰涎雍盛，宿食停聚等症。

瓜蒂苦寒有毒，用于痰涎、宿食停聚胃中而宜于涌吐者，用本品与赤小豆为末，香豉煮汁，温服以催吐。

此外，本品研末搐鼻，有退黄疸的作用。

【处方用名】瓜蒂、苦丁香(洗净，晒干用)。

【一般用量与用法】一分至三分，宜作散剂。本品有毒，用量不可过大。

【方剂举例】瓜蒂散(金匱要略)：瓜蒂、赤小豆。治胸痞，上脘有宿食者。

【文献摘录】《本经》：「咳逆上气，及食诸果，病在胸腹中，皆吐下之。」

《别录》：「疗黄疸。」

《本草纲目》：「吐风热痰涎，治风眩头痛，癲病喉痹，头目有湿气。」

《本草便读》：「苦寒通于胃腑，吐隔上蓄聚之热痰。」

## 藜芦

【科属与药用部分】本品为百合科植物黑藜芦的根茎与根。

【性味与归经】苦、辛，寒。有毒。入肝、肺、胃经。

【功效】吐风痰，杀虫。

【临床应用】1、用于风痰壅盛及缠喉风。

本品涌吐作用较强，如欲涌吐痰涎，作为急救，可用防风、瓜蒂、藜芦三味，研细末，取少量，温水送服以催吐。对于癲病痰涎壅盛，或缠喉风见痰涎壅塞者，可偶一用之。本品有毒，用时宜慎。

2、外用治疥癣。

本品有杀虫之功，用治疥癣，可用藜芦研为细末，加生油调成软膏，外涂。

【处方用名】藜芦(洗净，晒干，切片用)。

【一般用量与用法】一分至三分，宜作散剂。外用适量。有毒，用量不可过大。

【方剂举例】通顶散(圣惠方)：藜芦、黄连。外治诸风头痛。

【文献摘录】《本经》：「蛊毒璵逆，泄痢肠璞，头疡疥瘙恶疮，杀诸虫毒，去死肌。」

《别录》：「疗哕逆喉痹不通，鼻中衄肉，马刀烂疮，不入汤用。」

《图经本草》：「吐上隔风涎，暗风癲病，小儿[鼻葭]齁痰疾。」

## 辣蓼

【科属与药用部分】本品为蓼科植物辣蓼的全草。

【性味】辛，温。

【功效】温中化湿。

【临床应用】用于痢疾，泄泻，小儿疳积等症。

本品具辛辣之味，有温中化湿的作用。配合马齿苋、[地锦草](#)、[青木香](#)等药，可以治疗痢疾、泄泻、腹痛；配合[麦芽](#)等药，可以治疗小儿疳积。

此外，本品又有化湿解毒作用，还可用以熏洗湿疹、顽癣等症。蛇犬咬伤，亦可用鲜草洗净，捣烂外敷。

【处方用名】辣蓼、辣蓼草(洗净，晒干，切碎用)。

【一般用量与用法】五钱至一藜，煎服。外用适量。

## [附] 具有肾毒性的中药

某些中药确实具有肾毒性，过量或是肾功能不全者，要谨慎使用。

常见的有[苍耳子](#)、鸭胆子、[常山](#)、[白果](#)、蓖麻子、马钱子、半夏、雷公藤、斑蝥、铅粉、铅丹、密陀僧、[雄黄](#)、砒霜、白降丹、[轻粉](#)、水银等。

上述药物可直接损害肾小管上皮细胞，甚至发生广泛的近曲小管坏死。(资料引自实用毒性中药学扬芬明 1992 科学技术文献出版社)

(以身试百药当心肾衰竭)中提到红丹(红丹)此药为由水银、火硝、[白矾](#)、皂矾、[雄黄](#)、[朱砂](#)炼制而成的汞制剂。主要成分为螻化汞(HgO)，及少量二硫化砷(As<sub>2</sub>S<sub>2</sub>)有毒，仅可外用，急性中毒者可见肾肿大、皮质增厚肾小管上皮肿大坏死。