素問標本病傳論篇(65)

標本逆從的意義及臨床運用

黃帝問曰:病有標本，刺有逆從，奈何？岐伯對曰:凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標 ，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標而求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。

夫陰陽逆從標本之為道也。小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本，人有客氣有同氣，大小不利治其標，大小利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者並行，甚者獨行。先小大不利而後生病者，治其本。

疾病傳變及其預後轉歸

夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脅支痛，五日閉塞不通，身痛體重;三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脅支滿痛，一日身痛體重，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩，脅支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日少腹腰脊痛，脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛，脛痠;三日背梠?筋痛，小便閉;十日不已死。冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛，骨行酸，三日背月呂筋痛，小便閉;三日腹脹;三日兩脅支痛;三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛，骨行酸，三日背月呂筋痛，小便閉;五日身體重，六

日不已死，冬夜半後，夏日昳。膀胱病小便閉，五日少腹脹，腰脊痛，骨行酸，一日腹脹，一日身體重，二日不已死。冬雞鳴，夏下晡。諸病以次是相傳，如是者皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。