

## 卷第十一

## 治霍亂方第一

《病源論》云：霍亂者，由人溫涼不調，陰陽清濁二氣有相干亂之時。其亂在於腸胃之間者、因遇飲食而變、發則心腹絞痛、其有先心痛者則先吐、先腹痛者則先利、心腹並痛者吐利俱發、挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐利、虛者但吐利心腹刺痛而已、亦有飲酒食肉腥膾生冷過度、因居處不節、或露臥濕地、或當風取涼、而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃、脾胃得冷則不磨、不磨則水穀不消化、亦令清濁二氣相干、脾胃虛弱便則吐利、水穀不消則心腹脹滿、皆成霍亂、霍亂有三名、一名胃反、言其胃氣虛逆反吐飲食也、二名霍亂、言其病揮霍之間便致繚亂也、三名走哺、言其哺食變逆者也、」

《養生方》云：七月食蜜，令人暴下，發霍亂也。

《千金方》云：論曰：原夫霍亂之為病也，皆因食飲，非關鬼神。夫飽食臃膾，複餐乳酪、陽氣欲升，陰氣欲降，陰陽永隔，變成吐利，頭痛如破，百節如解，遍體諸筋皆為回轉，論時雖小，卒病之中，最為可畏，雖臨深履危不足以喻之也。養生者宜達其旨趣，庶可免於夭橫者矣。

《極要方》云：得吐利者名濕霍亂，不得吐利者名乾霍亂。乾霍亂多殺人，往往有濕霍亂，不有性命之憂。

《集驗方》云：嘔而吐利，此為霍亂也。

《葛氏方》云：凡所以得霍亂者，多起於飲食，或飽食生冷物，雜以肥鮮酒膾，而當風履濕初得之便務令溫暖，以火炭布其所臥床下，大熱減並蒸被絮，若衣絮自抱，冷易熱者。

又方：可燒地，令熱水潑敷；蔣席臥其上，濃覆之。

又方：可作的爾熱湯，著瓮中漬足令至膝，並銅器若瓦器盛湯，以著腹上，衣藉之，冷復易

又方：可以熨斗盛火著腹上而不靜者，便急灸之。灸之但明按次第，莫為亂灸，須有其病，火下

《千金方》云：凡諸霍亂；忌米飲，胃得中米即吐不止，但得與濃朴葛根飲。（今按：《葛氏方》云：可備濃朴，每向秋月，便自隨之。）

又云：凡霍亂醫所不治方：童女月衣，合血燒，酒服方寸七，秘方。（今按：《短劇方》云

《范汪方》治霍亂吐下不止，理中湯方：

人參 乾薑 白朮 甘草（各一兩）

水三升，煮取一升半，分二服。

（今按：《短劇方》：藥各三兩，水六升，煮取三升，分三服。又《醫門方》：白朮三兩，人參三兩，甘草二兩，乾薑二兩。水七升，煮取二升半。若胸滿腹痛吐下者，加當歸、濃朴各二兩；若悸者、寒者、渴者，並主之。）

《錄驗方》治霍亂虛冷吐逆下利理中丸方：

人參 甘草（炙） 乾薑 白朮（各二兩）

凡四物，搗下蜜丸如彈丸，取一丸納暖酒中服之，日三。（今按：《本草蘇敬注》云：方寸七散為丸如梧子，得十六丸，如彈丸一枚。）

又方：單煮濃朴，飲一二升，有效。

又方：煮梨葉服之。（今按：《醫門方》云：取梨枝葉一大握，以水二升，煮取一升，頓服立瘥。）

《效驗方》治霍亂吐下，理中散方：

甘草（二兩，炙） 人參（二兩） 乾薑（二兩） 朮（二兩）

凡四物，治篩，酒服方寸七，日三。

《短劇方》云：扶老理中湯，治羸老冷氣惡心，食飲不化，腹虛滿拘急短氣，及霍亂嘔逆，人參（五兩） 乾薑（六兩） 朮（五兩） 麥門冬（六兩） 附子（三兩） 茯苓（三兩） 甘草（五

凡七物，下篩作散，臨病者三合，白湯和方寸七，一服不效，又服常將者，蜜丸酒服如梧子

又云：霍亂吐下汗出，肉冷轉筋，嘔逆煩悶，欲得冷水者方：可與濃朴葛根飲進，沾喉中而又方：取藿香一把，以水四升，煮取一升，頓服立愈。（今按：《本草》云：一把重二兩為正。）

又方：煮青木香汁飲，至佳。

又云：治卒道中得霍亂，無有方藥，危急方：蘆蓬茸大把，煮令味濃，頓服二升即瘥，有效

《醫門方》治霍亂吐下不止者方：煮百沸湯，細細添生水，熱飲之。（今按：《刪繁論》云

又方：或煮高良薑或煮木瓜汁飲之。

《通玄經》云：治霍亂方：木瓜煮作飲服之（今按：《本草陶注》云：若子並枝煮飲。）

《救急單驗方》療霍亂方：桂三兩，煮汁取一盞頓服，驗。

《陶景本草注》云：霍亂吐下方：楠材削作 煮服之。

## 治霍亂心腹痛方第二

《病源論》云：霍亂而心腹痛者，是風冷之氣客於腑臟之間，冷氣與真氣相擊，或上攻心，或下攻腹，故心腹痛也。

《葛氏方》治霍亂若心腹痛、急似中惡者方：搗生菖蒲根飲汁，少少令下咽即瘥。

又云：卒得霍亂先腹痛者方：灸臍上一夫十四壯，名太倉。若繞臍痛者，灸臍下三寸四壯，《極要方》療霍亂心腹激痛方：

當歸（三兩） 桂心（三兩） 乾薑（三兩） 甘草（一兩）  
上，以水七升，煮取二升，分三服。

《短劇方》治心腹暴痛，及宿食不消，或宿冷煩滿成霍亂方：作鹽湯三升，使極鹹，熱飲一《

又云：霍亂腹痛吐下方：取桃葉，冬天用皮，絞取汁，一服一杯，立愈。亦可濃煮，飲三升

《耆婆方》治霍亂先腹痛方：煮生薑熱飲之。

又方：濃朴汁飲之。

《僧深方》治霍亂腹痛而煩方：高良薑四兩，以水五升，煮取二升，分二服。

《蘇敬本草注》霍亂絞痛方：粟米泔汁，飲數升，立瘥。

《廣濟方》療霍亂心腹痛煩嘔不止方：

濃朴(四兩) 橘皮(二兩) 人參(二兩) 當歸(二兩) 藿香(一兩) 高良薑(四兩，切)

以水七升，煮取二升五合，分溫三服，忌生冷、粘食。

《通玄方》治霍亂先腹痛方：好醖酢細細飲一盞許。

又方：用火灸腹及背，得汗即愈。

### 治霍亂心腹脹滿方第三

《病源論》云：霍亂而心腹脹滿者，是寒氣與臟氣相搏，真邪相攻，不得吐利，故令心腹脹

《葛氏方》治霍亂心腹脹痛，煩滿短氣未得吐下方：生薑若干，薑一二升，以水五六升，煮三沸，頓服，若不即愈，更可作。

又方：桂屑半升，以暖飲和之，盡服。

又方：以鹽納臍中，灸上二七壯。

又云：治苦煩悶脹滿者方：灸心二七壯。

又云：治煩嘔腹脹濃朴湯方：

濃朴(四兩) 桂(二兩) 枳實(五枚) 生薑(三兩)

以水六升，煮取二升，分三服。

《耆婆方》治霍亂煩悶脹滿方：濃朴二兩，炙，以水三升，煮取一升半，分三服，老人小兒

《范汪方》治霍亂腹中脹滿、惡毒悶絕不通氣，氣息急危方：

生薑（一累） 梔子（十四枚） 桂心（一兩） 香豉（五合）  
四物，搗，以酒二升解之，去滓頓服。（今按：《錄驗方》：生薑累數以其一支為累，取服

《短劇方》治霍亂腹痛脹滿短氣不得吐下，灸不效者，熱伏心臟中，煩悶鬱鬱者方：可取白無粉

《僧深方》治霍亂腹脹滿不得吐方：梁米粉五合，以水一升半，和如粥頓服，須臾吐，若不

#### 治霍亂心煩方第四

《病源論》云：霍亂而心煩者，由大吐大利，腑臟氣暴極，故心煩，亦有未經吐利而而煩者。

《醫門方》療霍亂心煩方：

香豉〔七合（綿裹）〕 梔子仁（三兩） 濃朴（三兩，炙）  
水五升，煮取二升，去滓，分溫二服，重者，不過再，必愈。

《通玄經》云：霍亂心煩悶不已方：用粟米汁飲之半升，即愈。

又方：服粟米粉，和水服一合，立愈。

又云：霍亂吐下已止，發熱心煩欲飲水方：可與少秫米粉汁佳，若不止，可與葛根薺（臍

#### 治霍亂下利不止方第五

《病源論》云：霍亂而下利不止者，是腸胃俱冷而挾宿虛，穀氣不消故也。

《短劇方》治霍亂洞下腹痛方：以艾一把，以水三升，煮得一升，頓服之良。

又云：霍亂卒吐下不禁者，人參湯主之，方：

人參(二兩) 茯苓(二兩) 葛根(二兩) 橘皮(二兩) 麥門冬(二兩) 甘草(二兩)

凡六物，以水五升，煮取二升，分三服。

《葛氏方》治霍亂下利不止者方：

灸足大指本節內一寸側白肉際，左右各七壯，名大都。

又云：霍亂吐下不止方：

乾薑 茱萸各一兩，水二升，煮取一升，一服。

又云：灸兩乳邊，裡外近腋白肉際各七壯。

今按：治霍亂吐利，理中湯、理中丸主之，在上條。

又云：先洞下者，灸臍邊一寸，男左女右，十四壯。又云吐而下不止者，臍下一夫約中七壯

## 治霍亂嘔吐不止方第六

《病源論》云：霍亂而嘔吐者，冷氣入於胃，胃氣變亂，冷邪既盛，穀氣不和，胃氣逆

上，《葛氏方》治霍亂嘔不止方：生薑五兩，水五升，煮取二升半，分三服。

《僧深方》治霍亂煩痛、嘔吐不止並轉筋方：

生香（一把） 桂心(二兩) 生薑(三兩)  
三物，以水七升，煮取二升，分二服，甚良。

又云：霍亂嘔吐，水藥不下茱萸湯方：

茱萸(一升) 黃連(二兩) 附子(一兩) 甘草(一兩) 生薑(三兩)  
凡五物，以水七升，煮取三升，分三服。

《短劇方》治霍亂嘔吐及暴下方：

半夏(三兩) 乾薑(四兩) 人參(三兩) 桔梗(三兩) 附子(四兩)  
凡五物，下篩，臨病和之，若吐下不止者，以苦酒和之，飲服二丸如梧子大。

《范汪方》治霍亂嘔吐附子湯方：

大附子(一枚) 甘草(六銖) 蜀椒(二百粒)  
三物, 水三升, 煮取一升半, 分再服。

### 治霍亂嘔噦(於越反)方第七

《病源論》云：霍亂而嘔噦者, 由吐利後胃虛而逆則嘔, 氣逆遇冷折之, 氣不通則噦之。

《范汪方》治霍亂嘔噦、氣厥不得息方：

香豉(一升) 半夏(一兩) 甘草(一兩) 生薑(二兩) 人參(一兩) 柴胡(一兩)  
六物, 以水五升, 煮取二升半, 服七合, 日三。

又方：半夏二兩, 生薑二兩, 水三升, 煮得一升二合, 分再服。

《葛氏方》：霍亂若 者, 灸手腕第一約理中七壯, 名心主, 當中指也。

《短劇方》治霍亂嘔噦吐逆, 良久不止方：

灸巨闕並太倉各五十壯。(今按：巨闕穴在去鳩尾骨端一寸; 太倉者中管穴, 在上管下一寸)

### 治霍亂乾嘔方第八

《病源論》云：霍亂而乾嘔者, 吐下後, 脾胃虛冷, 三焦不理, 氣痞結於心下, 氣時逆上, 《短劇方》治霍亂或引飲, 飲輒乾嘔方：生薑五兩, 以水五升, 煮令得二升半, 分再服良。

又云：治乾嘔逆噦, 手足厥冷橘皮湯方：

橘皮(四兩) 生薑(半斤)  
凡二物, 以水七升, 煮取三升, 一服一升, 湯下咽, 即愈。

《葛氏方》霍亂乾嘔者方：灸手腕後三指(寸)大兩筋間, 左右各七壯, 名間使。

又方：取薤一虎口(一握也), 以水二升, 煮令得一升半, 服之, 不過三作。

## 治霍亂煩渴方第九

《病源論》云：霍亂煩渴者，大利則津液竭，津液竭則臟燥，臟燥則渴也。煩渴不止則引飲，引飲則利亦不止。

《葛氏方》治霍亂吐下後大渴多飲則殺人方：

可以黃粱米五升，水一斗，煮得三升，澄，稍稍飲之，勿飲餘飲之。

《醫門方》霍亂熱心煩渴者方：以糯米水漬研之，以冷熟水混，取米泔汁，恣意飲之即定，《僧深方》霍亂吐後煩而渴方：紫蘇子一升，水五升，煮取二升，分二服。無子取生蘇一把

《短劇方》治霍亂煩渴者方：粳米汁泔，飲數升，立瘥。

又方：取新汲冷水飲之。

《集驗方》云：治霍亂而渴者，理中湯主之。

## 治霍亂轉筋方第十

《病源論》云：霍亂而轉筋者，由冷氣入於筋故也。

《葛氏方》霍亂轉筋者方：灸趾心下五六壯，名湧泉。

又方：灸大指上爪甲際，七壯。

又方：苦酒和粉塗痛上。

又云：轉筋入腹痛者方：令四人捉手足，灸臍左一寸，十四壯。

又云：若轉筋入腹中如欲轉者方：燒編席索三指撮，酒服之。

又云：釜底墨末，酒服之。

又云：腹中已轉筋者方；當倒檐，病患頭在下，勿使及地，腹中平乃止。

又云：若兩臂腳及胸脅轉筋者方：取鹽一升半，水一斗，煮令熱，漬手足，在胸脅者湯洗之

《千金方》霍亂轉筋方：蓼一把，去兩頭，水二升，煮取一升，頓服之。

又方：納鹽臍中，灸二七壯，並治腹脹。

又方：以車穀中脂塗足心下。又方：灸足踵取筋上白肉際七壯，立愈。又方：灸少腹橫骨中

又云：轉筋在兩臂及胸中方：灸手掌白肉際七壯。

又灸臆中、中府、巨闕、胃脘。

《短劇方》治霍亂轉筋方：以苦酒煮青布裹□（音奄，漬也，又作踏，徒合反）之，冷復易。

又方：可以白（側吏反）煮粉及熱洗之。

《龍門方》治霍亂轉筋方：取木瓜子、根、莖煮湯服，驗。

《醫門方》治霍亂轉筋方：取熱灰，以驗醋和令微溫，炒令極熱，以青布裹，及熱熨筋上

又云：霍亂遍身轉筋入腹不可奈何方：多作鹽湯內船槽（昨營反）中令溫暖，漬足之佳。

《小

《極要方》霍亂轉筋方：

生薑（一斤）

上，水七升，煮取二升，分三服。

《刪繁論》云：霍亂轉筋方：取絮巾若綿，灸暖以敷筋上。（今按：《范汪方》：轉筋在腳

《范汪方》治霍亂轉筋方：鼠壤土，水和塗其上，愈。

又方：取□合粉小溫之，塗手摩之。

《廣利方》治霍亂轉筋入腹方：取鹽三合，以水五升，煮取三升，以青布浸湯中，用拭轉筋

《陶景本草注》云：治霍亂轉筋者，但呼木瓜名，及書上作木瓜字，皆愈。

### 治霍亂手足冷方第十一

《病源論》云：霍亂大吐下，其腸胃俱虛，乃至汗出，其脈欲絕，手足皆冷，名為四逆者，《葛氏方》先手足逆冷者方：灸足內踝上一夫，兩足各七壯。

又云：治下不止手足逆冷方：椒百枚，附子一枚，水三升，煮取一升，一服。

《醫門方》霍亂吐利不止，心煩，四肢逆冷方：

濃朴 甘草 人參 白朮(各二兩) 生薑(三兩)  
以水六升，煮取二升，分二服。

《短劇方》霍亂多寒，手足寒厥，脈絕，茱萸四逆湯主之，方：

吳茱萸(二升) 當歸(三兩) 芍藥(二兩) 桂心(四兩) 細辛(二兩) 生薑(半斤) 通草(凡八物，以水四升，清酒四升，合煮取三升，分四服。

《錄驗方》：霍亂吐下而汗出，小便復利，或下利清穀，裡外無熱，脈微欲絕，或惡寒，四

人參(三兩) 乾薑(三兩) 附子(二兩) 甘草(三兩)  
凡四物，以水六升，煮取二升半，分三服，轉筋肉冷汗出、嘔者良。(《短劇方》同之。)

### 治霍亂不語方第十二

《葛氏方》治霍亂欲死不能語方：生薑一斤，切，水七升，煮取二升，分三服。

又方：飲竹瀝少許。

又方：蘆蓬茸大把，濃煮飲二升即瘥。

又方：乾薑(三兩) 甘草(一兩) 附子(一兩)  
水三升，煮取一升，分三服。

### 治霍亂欲死方第十三

《病源論》云：霍亂而欲死者，由飲食不消，冷氣內搏，或未得吐利，或雖吐利，冷氣未歇

《極要方》療霍亂嘔而煩悶，脹喘垂死，經日不解方：

濃朴(四兩) 桂心(四兩) 枳實(三兩) 生薑(十兩)  
以水八升，煮取三升，分三服。

《葛氏方》治霍亂眾治不瘥，煩躁欲死，脹氣急方：燒童女月經衣血末，以酒服少少，立瘥

又云：治霍亂神秘起死灸法：以物橫度病患口中，屈之從心鳩尾度以下，灸度下頭五壯，橫度左右，復灸五壯，此三處、並當先灸中央畢，更橫度左右也。

又方：灸脊上，以物圍令正心厭。又夾脊左右一寸各七壯，是腹背各灸三處也。

又云：華佗治霍亂已死，上屋喚魄者，諸治皆至而猶不瘥者方：捧病患覆臥之，伸臂對，以即

又云：注利不止而轉筋入腹欲死方：生薑三累，拍破，以酒升半，煮三四沸，頓服之。

### 治中熱霍亂方第十四

《短劇方》治中熱暴下利霍亂變熱心煩脈數者方：飲新出井水一升，立愈。飲多益善，此治

又云：薺湯治先有石熱，因霍亂，吐下，服諸熱藥，吐下得止，因空虛仍變煩，手足熱，悶，

薺(二兩) 人參(二兩) 濃朴(二兩) 知母(二兩) 栝萸(二兩) 葛根(二兩)  
枳實(二(二兩) 黃芩(二兩) 甘  
凡十四物，以水八升，煮取三升，分五服。

### 治欲作霍亂方第十五

《耆婆方》治人腹脹欲作霍亂方：

濃朴(二兩，炙) 以水三升，煮取一升半，分三服即瘥，小兒最喜，老人亦佳，夏秋月，恆置此藥在家，有急

《醫門方》療心腹脹滿堅痛，煩悶不安，雖未吐下，欲霍亂方：取鹽五合，水一升，煮令消  
煮取二升，頓服。)

《葛氏方》治霍亂心腹脹痛、煩滿短氣，未得吐下方：生薑若乾薑一二升，以水五六升，煮三沸，頓服。

《短劇方》治霍亂煩擾、未得吐下方：煮香 汁，熱飲之。(今按：《葛氏方》云：取蓼若

### 治霍亂後煩躁方第十六

《病源論》云：霍亂之後而煩躁臥不安者，由吐下後腑臟虛極、陰陽未理，血虛氣亂，血氣

《葛氏方》治霍亂後煩躁臥不安方：

蔥白(二十枚) 大棗(二十枚)  
水二升，煮取一升，頓服之。

### 治霍亂止後食法第十七

《醫門方》云：若霍亂吐利定後，胃氣虛弱，不可強食，便更作病，候待須食，仍微與稀飲

《千金方》云：凡此病定已一日，不食為佳，仍須三日，少少與粥，三日以後，乃恣意食息也，仍七日勿雜食為佳。

又云：諸霍亂忌米飲，胃中得米即吐不止，但得與濃朴葛根飲。

### 治下利方例第十八

《千金方》云：論曰，凡利有四種，論冷熱甘蠱。冷則白，熱則赤，甘則赤白而雜，蠱則純

又云：古今利方千萬，不可具載此中，但撮其效者七八而已，雖然，弘之在人，何則陟厘愈也？

《醫門方》云：辨曰：比見下利者，因多觸熱飲水，或夜露坐臥冒霜雪，風寒邪氣客於皮膚，而又云：下利欲飲者，為有熱；利而不渴，其臟有寒；下利後更煩，按其心下軟者，為虛煩也

又云：下利有不欲食者，有宿食，宜下；下利瘥，時時復發，此為不盡，宜下；下利腹滿不下利

又云：下利甚者，手足痺不仁；下利而反發熱、身形汗出者，自愈；下利，脈數而渴欲間 A 又云：下利，手足無脈，灸之不溫，微喘者，死；下利後，脈絕，手足厥冷，卒時脈還，手

又云：凡人久下利或熱，暴下兩日即有 蟲，口唇生瘡，口中舌上唇並生瘡如粟，瘡劇者之

《葛氏方》云：下利，手足逆冷，灸之不暖，或無脈，微喘者，死；下利，舌萎，煩躁而不

今按：下利人可食物：

赤小豆（孟詵云：止痢。）小麥（《本草》云：止利。）青粱米（《本草》云：止泄。）黃粱米（《本草》云：止泄。）丹黍米（《本草》云：止泄。）粳米（《本草》云：止泄。）橘（《本草》云：止泄。）柚（《本草》云：止泄。）梅（《本草》云：止下利。）柿（《本草陶注》云：火熏者性熱，斷下。）石榴（《本草》云：殼療下利。）通草（崔禹云：止 云：止 禹云：主 魚（崔禹 禹云：主止下名：之多多美。下利人可忌物：

《千金方》云：凡利病，通忌生冷、酢滑、豬、雞、魚油、乳酪、酥、干脯、醬、粉、鹼，《養生要集》云：腹中有冷患，飲乳汁，令腹痛泄利。

《七卷食經》云：杏仁不可多食，令人熱利。

## 治雜利方第十九

《病源論》云：雜利謂利色無定，水穀或膿或血，或青或黃，或赤或白，變雜無常，或雜色熱不

《短劇方》治雜下方，第一下赤，二下白，三下黃，四下青，五下黑，六固病下，下如瘀赤 如舍水，十四下已則煩，十五息下一作一止，十六而不欲食，十七食無數但下者，十八下但 欲飲

黃連(一兩) 黃柏(一兩) 熟艾(一兩) 附子(一兩) 甘草(一兩) 乾薑(二兩) 烏梅(二

凡七物，合搗下篩，蜜和丸如大豆，飲服十丸，漸至二十丸，日三。(今按：《葛氏方》云

《范汪方》烏梅丸，治萬種下利方：

乾薑 黃連 黃柏(炙) 黃芩 艾(各一兩) 烏梅(二十枚，取肉)  
上六物，丸如梧子，服十丸，日三，老少半，良驗。

又云：治下利日百行、師所不治方：曲末服一方寸匕，日三，以食愈為度，當以粟米粥服

《令李方》治下利一日百起、黃連散方：

黃連(二兩) 甘草(二兩)  
凡二物，治篩，酒服方寸匕，日三，立愈。

《極要方》療冷熱不調，或滯或水、或五色血者方：醋石榴五枚合殼、子搗，絞取二升汁，《廣濟方》療百千種雜痢黃連湯方：

黃連(一兩) 乾薑(一兩) 熟艾(一兩) 附子(一枚，炮) 蜀椒(十四粒) 阿膠〔如手(指)切，以水五升，煮取二升五合，絞去滓，納膠更上火煎膠烊，分溫三服。忌生冷豬魚蒜。

《傳信方》云：一切利神效方：

黃連(二兩半) 黃柏(一兩半) 羚羊角(半兩) 茯苓(半兩)  
上四味，為散，蜜和丸，用薑蜜湯下。

灸諸利方：

《經心方》云：灸臍中，稍至二三百壯。

又灸關元三百壯，並治冷腹痛。（關元臍下三寸是也。）

《新錄方》云：灸脊中三百壯。（脊中，從大椎度至窮骨中折，則是也。）

又方：灸脾俞百壯。（第十一椎兩旁名脾俞。）

又方：灸大腸俞百壯。（第十六椎兩旁名大腸俞。）

今按：《石論》云：金液丹，十種水穀赤白等利，此丹皆治療。

## 治冷利方第二十

《病源論》云：腸胃虛弱，受於寒氣，腸胃虛則泄，故為冷利也。凡利色青白黑皆為冷也，《千金方》駐車丸，主大冷洞利，腸滑下赤白如魚腦，日夜無節度腹痛方：

黃連（六兩） 乾薑（二兩） 當歸（三兩） 阿膠（三兩）

四味，以大酢五合，烱膠，和之，並手丸如大豆服之，大人服三十丸，小兒百日以還，三丸，《葛氏方》下色白食不消者，為寒下，方：乾薑、赤石脂分等末，以白飲和丸如梧子，日服

又方：酸石榴皮燒末，服方寸匕。

又方：生薑汁二升，蜜合煎取二升，頓服。

又方：豉一升，薤白一把，水三升，煮取二升，及熱頓服之，有大棗肉七枚良。

又云：有止患冷者，淳下白如鼻涕，治之方：龍骨、乾薑、附子分等搗蜜丸，服如梧子五丸

《范汪方》治寒冷下利方：

乾薑（四兩） 人參（三兩） 桔梗（四兩） 附子（四枚，炮） 半夏（三兩，洗）

凡五物，下篩和丸，平旦服五丸如梧子，日再，漸加，勿熱食。

又云：四順湯治逆順寒冷凍飲料食不調下利方：

甘草(三兩) 人參(二兩) 當歸(二兩) 附子(一兩) 乾薑(三兩)  
凡五物，水七升，煮取二升半，分三服。(今按：《僧深方》加龍骨二兩。)

又云：四逆湯治下利清穀，身反惡寒，手足逆冷，此為四逆，四逆湯主之，相視病患與方相

甘草(二兩) 附子(一枚) 乾薑(一兩半)  
凡三物，以水三升，煮取一升二合，分二服。

《短劇方》黃連湯，治春月暴熱解脫飲冷，或眠濕地，中冷腹痛，下青黃汁，疲極欲死方：

黃連(四兩) 當歸(三兩) 乾薑(三兩) 濃朴(二兩)  
凡四物，切，以水七升，煮取三升，分三服。(今按：《經心方》無濃朴，有石榴皮。)

《私跡方》溫中湯，治寒下飯臭出方：

甘草(一兩，炙) 乾薑(半兩) 蜀椒(八十枚，去閉者) 附子(一枚)  
凡四物，以水二升，煮取一升，分再服，若嘔，納橘皮半兩，老少者皆取服良。

《廣濟方》療冷痢青白色、腹內常鳴，行數疏出即大多，調中散方：

龍骨(一兩) 人參(一兩) 黃連(一兩) 阿膠(一兩) 黃柏(一兩)  
搗篩為散，煮米飲服。忌豬、魚、蒜、炙肉、粘食等。

《集驗方》治久新寒冷下利，腹內不安，食輒注下，令人生肉烏梅丸方：

烏梅(三百六十枚，去核，熬令可搗) 附子(四兩，炮) 黃連(十二兩) 乾薑(四兩)  
凡四物，搗，下篩蜜丸，飲服如梧子十丸，日再，補方。

## 治熱利方第二十一

《病源論》云：腸胃虛弱，風邪挾熱乘之，腸虛則泄，故為熱利也，其色黃，若熱甚，黃而《錄驗方》青要結腸丸，治熱毒下不絕，不問久新，悉治之方：

苦參 橘皮 阿膠(炙) 獨活 夕藥 黃連 藍青(一方乾薑四分代) 鬼臼 黃柏 甘草(凡十物, 合搗下篩, 蜜烱膠和之, 並手捻作丸如梧子, 干以飲服十丸, 日三, 不知稍增。)

《經心方》烏梅湯, 治熱毒下有濕方:

黃連(二兩) 烏梅(三十果) 阿膠(一兩) 梔子(三十枚) 黃柏(一兩) 五味, 以水五升, 煮取二升半, 分再服。

《新錄方》熱利者方:

干棗四十枚, 水三升, 煮取一升, 頓服。

又方: 豉二升, 水三升, 煮取一升半, 二服。

《耆婆方》黃連丸, 治中熱下利方:

黃連(十二分) 乾薑(八分) 當歸(八分)  
上三物, 搗篩蜜和丸如梧子, 服二丸, 不知加之。

《葛氏方》: 下色黃者, 挾毒熱下也, 治之方: 梔子十四枚去皮, 搗, 蜜丸如梧子, 服三丸

又, 挾熱者多下赤膿或雜血, 治之方: 黃連, 灶突中塵末, 酒服二方寸匕, 日三。

又方: 薤一把, 煮鯽魚, 納秫米食之, 多善。

《千金方》治久利熱諸治不瘥方:

烏梅肉(一升, 熬) 黃連(一斤金色者)  
二味, 蜜和如梧子, 服二十丸, 日三夜一, 神良。《僧深方》同之。

《廣濟方》療熱毒痢甚數, 出不多, 腹中刺痛方:

生犀角末(三兩) 酸石榴皮(三兩, 熬) 枳殼(三兩, 熬)  
搗為散, 飲服兩方寸匕, 日再, 忌熱食。

《病源論》云：腸胃虛弱，為風邪所傷，則挾熱，熱乘於血，血流滲入腹，與利相雜下，故為赤利。

《醫門方》療赤利，腹中絞痛，下部疼重方：

黃連 當歸 黃柏 乾薑（各二兩）  
上，搗篩為散，煮烏梅汁，服方寸匕，日二。

《如意方》治下赤利術：

金色黃連（一升，去毛）黃柏（一斤）犀角（二兩）  
凡三物，切，以水五升，煮取三升，去滓，納白蜜一升，又煎三升，平旦服，至日中令盡，勿間食也。

《救治單驗方》治赤利方：

黃連（三兩）黃柏（三兩）梔子仁（二兩）  
凡三物，以水九升，煮取三升分三服。

又方：搗黃連末，和水服一匕，以瘥為度。

### 治血利方第二十三

《病源論》云：血利者，熱毒折於血，入大腸故也，身熱者死，身寒者生。

《千金方》治大熱毒純血利治不可瘥者方：

黃連六兩，一味，以水七升，煮取二升半，夜露著日星下，旦空腹頓服之，臥息。

《極要方》療血痢方：

真生犀角末（五兩）阿膠（四兩，炙）乾薑（三兩）艾葉（三兩，熬）黃柏（四兩）

上五物，搗篩為散，服方寸匕。

《廣利方》理血痢方：酸石榴一顆，和皮搗取汁，蜜一大匙和，暖頓服之。

### 治赤白利方第二十四

《病源論》云：其利而赤白者，是熱乘於血，血滲（所禁反）腸內則赤也，冷氣入腸間，搏腸脈薄

《本草經》治赤白利方：鯽魚作膾食之。

《錄驗方》臘蜜丸，治赤白利方：

朴硝（二兩）黃芩（一兩）大黃（一兩）代甘草（一兩）黃連（一兩）豉（一兩）臘巴豆（上七物，丸如梧子，空腹服三丸，日三。

又云：赤白痢赤多熱方：

犀角（六分，屑多個）黃芩（六分）地榆（六分）黃連（八分）甘草（四分，炙）切，以水二大升，煎取八合，去滓，空腹分三服。

《千金方》治赤白利黃連湯方：

黃連（三兩）甘草（一兩）當歸（二兩）黃柏（三兩）乾薑（二兩）石榴皮（三兩）阿膠（七味，水七升，煮取二升，分二服。

《集驗方》治暴下赤白方：

香豉（一升）薤白（一把）  
凡二物，以水三升，煮取二升，頓服之。

《傳信方》療赤白痢如鵝鴨肝方：

黃芩 黃連（各八分）  
上二味，以水二升，煎取一升，分二分。

《廣利方》治赤白痢白多冷痛方：

黃連（八分）濃朴（五分，炙）當歸（四分）茯苓（六分）乾薑（三分）切，以水一大升七合，煎取七合，去滓空腹分兩服。忌豬肉生冷。

又云：赤白痢赤多熱方：

犀角（六分，屑）黃芩（六分）地榆（六分）黃連（八分）甘草（四分，炙）切，以水二大升，煎取八合，去滓，空腹分三服。

《醫門方》療赤白利腹中絞痛無問遠近方：

黃連(八分) 五色龍骨(十分) 黃芩(六分)  
上，為散，以清飲空腹服方寸七。

《崔禹食經》赤白利方：、雲雀、鶉等任意食之。

又方：通草子食之。

《龍門方》治赤白痢方：煮韭，空腹頓服一碗，不過再，驗。

又方：手熟 烏豆服一大抄，不過二三。

又方：取鼠尾草花，曝乾末，服方寸七，驗。

## 治久赤白利方第二十五

《病源論》云：赤白利是冷熱不調，熱乘於血，血滲腸間，與腸間津液相雜而下，甚者，腸

《千金方》治下久赤白連年不止，及霍亂冷實不消溫脾湯方：

大黃(四兩) 人參(二兩) 甘草(二兩) 乾薑(二兩) 附子(一枚大者)  
五味，水六升，煮取二升半，分三服。

又云：治積三十年常下神方：赤松樹皮去上蒼皮一升為散，面粥和一升服之，日三，不過服一

《錄驗方》治久赤白下利蒲黃二錢七方：

蒲黃(二錢七) 乾薑(二錢七)  
二物，合以酒一升熱服，不過四五服，斷，良有驗。

《極要方》三十年痢不止方：

黃連(五兩) 濃朴(二兩) 乾薑(二兩) 阿膠(二兩) 石榴皮(二兩) 艾葉(三兩)  
上，以水七升，煮取二升，分二服。

《隨時方》治赤白痢連年不瘥，腹中如刀攪，或血行下，無問赤白谷痢，並主之：

白茯苓(四大兩) 黃連(四大兩) 黃柏(四大兩) 羚羊角屑(三兩，熬) 上，搗篩，蜜和丸如梧子，冷酒服之五十丸，漸至百丸，日再。

## 治白滯利方第二十六

《病源論》云：腸虛而冷氣客之，搏於腸間，津液凝滯成滯白，故為白滯利也。

《千金方》治白滯利方：

倉米三升，水六升，煮取三升，米爛絞取稠汁，服二升。

《范汪方》治赤白滯下晝夜數十行方：

烏梅〔(割取皮)三兩，火熬令乾〕 黃連(三兩)

凡二物，治合下篩，和蜜丸如梧子，晨服十丸，不知稍增，可至二三十丸，晝夜可六七服，《短劇方》治冷微赤白滯下不斷，變成赤黑血汁如爛魚腸，腹痛枯瘦不能飲食方：

黃連(四兩) 吳茱萸(三兩) 當歸(三兩) 石榴殼(二兩)

凡四物，以水三升漬

黃連一夕，《僧深方》治赤白滯下久不斷，穀道疼痛不可忍方：宜服溫藥，熬鹽熨之。

又方：炙枳實熨之。

《葛氏方》治赤白雜滯下方：

赤石脂(一升) 烏梅(三十枚) 乾薑(三兩)

合粳米一升，水七升，煮取米熟，去滓，一服七合。

又方：鼠尾草濃煮，煎如薄飴，服五合至一升，日三。赤下用赤花者，白下用白花者，佳。

## 治膿血利方第二十七

《病源論》云：夫春陽氣在表，人運動勞役，腠理則開，血氣虛者，傷於風，至夏又熱氣乘

《范汪方》治膿血利黃連丸方：

黃連(三兩) 黃芩(三兩) 龍骨(四兩) 黃柏(三兩) 升麻(三兩)  
凡五物，搗下篩，蜜和丸如梧子，白飲服三十丸，日三。

又云：治下利赤白膿血桃花湯方：

赤石脂(二兩，搗篩) 乾薑(二兩) 附子(一兩)  
凡三物，以水五升，煮得三升，服一升，日三(一方有粳米，無附子。)

《廣濟方》療白膿痢方：

甘草(六分，炙) 濃朴(十二分，炙) 乾薑(八分) 枳殼(八分，炙) 茯苓(八分)  
切，以水五升，煮取一升六合，分溫二服，忌生冷、油膩、小豆、粘食、海藻。

## 治水穀利方第二十八

《病源論》云：由體虛腠理開，血氣虛，春傷於風，邪氣留在肌肉之內，後遇脾胃大腸虛弱

《葛氏方》治水下積久不瘥、腸垢已出者方：

赤石脂 桂 乾薑 附子  
分等搗末，蜜丸如小豆，服三丸，日三。

又方：石榴皮一枚，黃柏一兩，乾薑二兩半，以水三升，煮取一升二合，納膠頓服。

《醫門方》療水穀利、腹痛久不瘥方：

濃朴(炙) 黃連(炙，三兩)  
水三升，煮取一升，空腹服之。

《救急單驗方》治水利方：煮韭，空腹頓服一熱碗，不過再，驗。

## 治休息利方第二十九

《病源論》云：冷熱氣調，其飲則靜，而利亦休也，腸胃虛弱，易為冷熱，其邪氣或動或靜

《僧深方》治休息下方：煮小豆一升，和臘三兩，頓服，驗。

又方：煮韭，空腹一碗熱服，不過再，驗。

《范汪方》治息下、休下方：酸石榴合皮搗取汁服之。

《陶景本草注》：柿，火熏者食之。

又方：櫟樹皮煮汁服之。

《葛氏方》若久下經時不愈者，名息下休下，治之方：龍骨四兩，搗如小豆，水五升，煮取

又方：黃連如鴨子大一枚，膠如掌大一枚，熟艾一把，水五升，煮二物，取二升，去滓，納

又方：常煮忍冬飲之。

## 治泄利方第三十

《集驗方》云：黃帝曰：人苦溏泄（達郎反，思引翼逝二反）下利者何？對曰：春傷於風，夏 論曰：泄凡有五種，各不同。胃泄者，飲水不化，色黃，言所食飲之物皆完出不消也；脾泄 腸 故下

《范汪方》治腹痛消谷止利服大豆方：取大豆擇貌好者服一合所，日四五服，一日中四五合 難，《醫門方》治泄利或白赤不止，腸滑洞泄困極欲死方：

酸石榴皮（三兩） 乾地黃（二兩） 黃柏（三兩） 阿膠（二兩，炙）  
水五升，煮取二升，去滓分溫二服。

《千金方》健脾丸：主虛勞羸瘦，體重，胃冷弱不消飲食、雷鳴腹脹、泄利不止方。

鐘乳(二兩) 赤石脂(二兩) 好曲(二兩) 大麥蘖(二兩) 當歸(二兩) 黃連(二兩) 人 斛(二兩) 桂心(二兩)

凡十五味，白蜜丸如梧子，酒服十五丸，日三，稍加至四十丸，弱者飲服。此方通治男女，《短劇方》云：泄利食不消，不作肌膚，(灸脾俞，隨年壯)；泄注便膿血、五色重下，(灸云：

### 治重下方第三十一

《葛氏方》云：重下，此謂今赤白滯下也，今人下部疼重，故名重下，去膿血如雞子白，日

又方：烏梅二十枚，打破，以水二升，煮取一升，頓服。

又方：赤石脂一升，烏梅三十枚，乾薑三兩，合粳米一升，水七升煮，取米熟去滓，一服七合

《龍門方》治重下方：取鼠尾草花，曝乾末，服三方寸七，驗。

又方：末黃連和水服之。

《令李方》治下利重下方：

乾薑(二兩) 蜀椒(二兩) 桂心(二兩)

凡三物，治下篩，以如棗許從下部中納半，亦治毒。

《范汪方》治重下方：蓼滿一虎口，以水三升，煮取一升，頓服，不過再，神良。

《錄驗方》治下腹中絞痛重下，下赤白當歸散方：

當歸(二兩) 黃連(二兩) 黃柏(二兩) 乾薑(一兩)

凡四物，合下篩，以烏梅汁，服方寸七，日三。若腹中絞痛，加當歸；下赤加黃柏；重下增

### 治痢方第三十二

《病源論》云：甘是人嗜甘味多，而動腸胃間諸蟲，致令侵食腑臟，此猶是蟲也，從腸

《要急方》治赤白痢方：頭髮灰如雞子大，水服立驗。

《龍門方》治蚘利積年出無禁止者：韭，兩手握，細切，豉一升，酒三升，煮取一升，頓服

### 治蠱注利方第三十三

《病源論》云：歲時寒暑不調，則有濕毒之氣傷人，隨漸至於臟腑。大腸虛者，毒瓦斯乘之，雞肝

《短劇方》治時歲蠱蛀毒下，諸湯煎不能治欲死者方：

乾薑(二兩) 附子(二兩，炮) 黃連(二兩) 礬石(二兩)  
凡四物，為散，酒服方寸匕，日三。亦可以飲服。

又方：黃連一分，面二分，治末，蜜丸，水服如梧子。

《葛氏方》若時歲蠱注毒下者方：黃連、黃柏分等，搗，藍汁丸如梧子，服六七丸至十四五

又方：秫米一升，燒成炭，水三升，和飲之。

### 治不伏水土利方第三十四

《病源論》云：夫四方之氣，溫涼不同，隨方嗜欲，因以成性，若移其舊土，多不習伏，必

《僧深方》治諸下利，胡虜之人不習食穀下者方用：

白頭公(二兩) 黃連(四兩) 秦皮(二兩) 黃柏(二兩)  
凡四物，以水八升，煮取二升半，分三服。

《本草拾遺》云：舊著鞋履下土，主人適他方，不伏水土，刮取末，和水服之，不伏水土與

### 治嘔逆吐利方第三十五

《病源論》云：嘔逆吐利者，腸胃虛，邪氣並之，臟腑之氣自相克也。

《新錄方》治利兼吐逆及嘔者：蔥白、豉各一升，水五升，煮服一升六合，分二、三服。

又方：乾薑末方寸七，飲日二。

《僧深方》治胸脅有熱，胃中支滿，嘔吐下利方：

黃芩(二兩) 人參(一兩) 甘草(一兩) 桂心(一兩)  
凡四物，水八升，煮取四升，分四服，日三夜一。

### 治利兼渴方第三十六

《病源論》云：夫水穀之精化為血氣津液以養臟腑，臟腑虛受風邪，邪入於腸胃，故利，利

《僧深方》治少陰泄利不絕、口渴不下食、虛而兼煩方：

附子(一枚) 乾薑(半兩) 甘草(二分) 蔥白(十四枚)  
凡四物，以水三升，煮取一升，二服。先渴後嘔者，心有停水，一方加犀角一兩。

又方：濃朴，炙，搗末，酒服方寸七，日五六。

### 治利兼腫方第三十七

《病源論》云：利兼腫者，是利久脾虛，水氣在於肌肉之間所為也。

《新錄方》治利兼腫者：

桑根白皮切一升，水四升，煮取一升，去滓，納糖三合，和烱分二服。

又方：大麻子三升，水一斗，研取白汁，煮赤小豆爛，啖豆飲汁，良。

### 治利後虛煩方第三十八

《病源論》云：利後虛煩者，由腑臟尚虛而氣內搏之所為也。

《短劇方》大烏梅湯治被下之以後，虛煩燥不得眠，劇者顛倒心中懊懣(奴道反)方：

大烏梅(十四枚, 擘) 好豉(七合)  
凡二物, 以水四升, 煮梅令得二升半, 納豉令四、五沸, 得一升半, 分二服。

《千金方》治下後煩, 氣暴上, 香蘇湯方 :

香豉(五兩) 生蘇(一把, 冬用子三兩)  
凡二物, 水五升, 煮取二升, 頓服。

《僧深方》治大下後虛煩不得眠, 劇者顛倒懊懣欲死方 :

梔子(十四枚, 擘) 好豆豉(七合)  
凡二物, 水四升, 先煮梔子, 令餘二升半汁, 乃納豉, 二三沸, 去滓, 服一升。  
一服安者,

### 治利後不能食方第三十九

《病源論》云：利後不能食者, 由脾胃虛弱、氣逆胸間之所為也。

《千金方》治大下後腹中空竭, 胸中虛滿不得食方 :

夕藥(一兩) 甘草(一兩) 當歸(二兩) 生薑(五兩) 桂心(三兩) 濃朴(二兩)  
半夏(一兩)  
凡七物, 水八升, 煮取三升, 分三服。

### 治利後噦方第四十

《病源論》云：下斷之後, 脾胃虛, 氣逆, 遇冷折之, 其氣不通則令噦。

《范汪方》治大下之後, 下止, 嘔噦、胸中滿塞、水漿不下方 :

橘皮(一兩) 人參(一兩) 香豉(一升, 一方一兩) 桂心(二兩) 生薑(五兩)  
半夏(三兩) 甘草(一兩)  
凡七物, 切, 以水九升, 煮豉取七升, 去滓, 納諸藥, 微火上煮取二升半, 分三服。

### 治利後逆滿方第四十一

《病源論》云：利後而心下逆滿者, 猶臟虛, 心下有停飲, 氣逆乘之所為也。

《范汪方》治中寒下以後，心下逆滿上冲胸中、起欲頭眩方：

茯苓(四兩) 桂(三兩) 白朮(二兩) 甘草(二兩)

凡四物，以水六升，煮取三升分三服。

#### 治利後穀道痛方第四十二

《病源論》云：利久腸虛，邪客於肛門，邪氣與真氣相搏，故令疼痛也。

《新錄方》利穀道疼痛方：炒鹽熨下部。

又方：燒蒜去皮，納下部，良。

《范汪方》利穀道痛方：炙枳實熨之。

《集驗方》治赤白滯下久不斷、穀道疼痛不可忍：宜服溫藥，熬鹽熨之。

## 卷第十二

## 治消渴方第一

《病源論》云：消渴者，渴而不小便是也。由少服五石諸丸散，積經年歲，石熱結於腎中，水而《千金方》云：論曰：凡積久興酒，未有不成消渴。然則大寒凝海而酒不凍，明其酒性酷熱由己。飲啖無度，咀（才與反）嚼酢醬，不擇酸（蘇官反，酢也）鹹，積年長夜，酣興不□，遂使三焦（

《短劇方》云：說曰：少時服五石諸丸散者，積經年歲，人轉虛耗（呼到反）。石熱結於腎中消渴之興終不痿弱，液自出；亦作□疽之病。凡如此等，宜服豬腎齋（臍欄二音）湯，製其腎中石勢，將

又云：鉛丹散治消渴止小便方：

鉛丹〔（一名鉛華，和名多爾，《本草》云：朱雀精也）二分〕 栝萋（十分） 澤瀉〔（音昔 五分）

凡八物，治下篩，酒服方寸匕，日三。不知，稍增，年壯服半匕。得病一年服藥一日，二

又云：治日飲一石許，小便不通，栝（古活反）樓丸方：

栝萋（三分） 鉛丹（三分） 葛根（三分） 附子（一分，炮）

凡四物，治下篩，蜜（在本書）丸如梧子，飲服十丸，日三。

又云：治消渴方：

取活螺三斗，以江水一石養之，頓取冷汁飽飲之。經曰：放去，更取新者漬之。

又云：灸消渴法：灸關元一處。又；俠兩旁各二寸二處，各灸三十壯，五日一報，至百五十壯

《千金方》治消渴方：

飲鼓汁，任性多少。

又方：濃煮竹根汁，飲之。

又方：煮青粱米汁，飲之。

又云：栝萋粉治大渴秘方：

深掘大栝萋，濃削皮至白處止，寸切之，水浸，一日一易水，經五日出，取搗，以絹袋碎之

《葛氏方》治卒消渴小便多方：

多作竹瀝飲恣口，數日愈。

又方：破故屋瓦煮之，多飲汁。

又方：石膏半斤，搗碎，以水一斗，煮取五升，稍服。

又方：栝萋根，薄切，炙，五兩，水五升，煮取四升，飲之。

《錄驗方》治消渴日飲六七斗，小麥湯方：

小麥（一升）栝萋根（切，一升）麥門冬（一升）

上三物，以水三斗，煮取一斗半飲之。

《新錄方》治消渴方：

臭泔恣意飲之，取瘥止。

又方：搗生葛汁飲之。

《龍門方》療消渴方：

生胡麻油一升，頓服之，立驗。

又方：爛煮葵汁，置冷露中，每渴即飲之。

《僧深方》治消渴唇乾口燥枸杞湯方：

枸杞根（五升，銼皮）石膏〔一名細石）一升〕小麥（三升，一方小豆）

凡三物，切，以水加上沒手，合煮，麥熟湯成，去滓，適寒溫，飲之。

《極要方》療渴、身體微腫方：

茅根三斤，捶(丁回反)破，以水二斗，煮取二升，一日服盡，可日服一劑。

《經心方》黍米湯治渴神方：

乾黍米一升，以水三升，煮取一升，去滓，服一升，日再服，良。

《耆婆方》治人渴方：

栝萋(十兩) 白粱米(五小升)

上，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服。

《范汪方》治消渴湯方：

麥門冬(一兩) 土瓜根(二兩) 竹葉(一把)

凡三物，咀，水七升，煮取令得三升半，分再服，神有驗。

《陶景本草注》治消渴方：

煮 草汁及生汁服之。

又方：搗冬瓜，絞服汁。

《蘇敬本草注》治消渴方：

食大麥面良。

又，單食桑椹良。

又方：粟米臭泔汁飲之，立瘥。

《孟詵食經》消渴方：

麻子一升，搗，水三升，煮三四沸，去滓，冷服半升，日三，五日即愈。

今按：渴家可食物：

蘇蜜煎(治消渴，補內)；寒水石(一名白水石，《本草》云：主止渴)；石膏(一名細石，《本草》云：主止消渴)；大麥(《本草》云：主消渴，和名不止牟支)；青粱米

《本草》云：主；獼猴桃（崔禹云：主消渴，和名已久波）；烏芋（《本草》云：主消渴，和名久和烏）；菰根（《本草陶注》云：消渴，和名加毛宇利）；葵菜（崔禹云：主消渴，和名阿不比）；菘菜藜藿（《七卷食經》：主消渴，和名波久倍良）；（《本草》云：主消渴，和名奴奈波）；骨蓬（《本草》云：主消渴，和名加波保欄）；石（崔禹云：治消渴，和名右毛）；紫苔（崔禹云：止渴 海月（云：主消 寄居（崔禹 草》云：止 渴家可忌物：

《千金方》云：所慎者（物）有三，一則酒炙；二則房室；三則鹹食及面。

《養生要集》云：小麥合菰米食，複飲酒，令人消渴。

《短劇方》云：忌食豬肉。

## 治渴利方第二

《病源論》云：渴利者，隨飲隨少便是也。由少時（或無時字）服乳石，石熱盛時，房室過度液，故隨

《葛氏方》治大渴利日飲數斛小便亦爾者方：

栝藹 黃連 防己 鉛丹（一名鉛華）

分等搗末，以苦酒一合，水一合，和作漿，服方寸匕，日三。

《范汪方》治渴，日飲一斛，小便亦如之，栝藹湯方：

栝藹（二兩） 黃連（一升） 甘草（二兩）

凡三物，水五升，煮取二升半，分三服。

《集驗方》治渴日飲一斛者方：

入地三尺取桑根白皮，炙，令黃黑，細切，以水令相淹煮之，以味濃為度，熱飲之。勿與鹽

## 治內消方第三

《病源論》云：內消病者，不渴而小便多是也。由少服五石，石熱結於腎內也熱之所作也。

《短劇方》云：夫內消之為病，皆熱中所作也。小便多於所飲，令人虛極短氣。內消者，食物皆消作小便去而不渴也，治之枸杞湯：

枸杞枝葉（一斤）冬根（三兩）栝萋根（三兩）石膏〔（一名細石）三兩，一方無〕黃連（凡五物，切，以水一斗，煮取三升，一服五合，日三。

又云：治小便多，晝夜數十起方：

小豆生藿（一把）

凡一物，搗絞平，取汁，頻飲三升便愈。亦治小兒利。

《令李方》治小便利多秦膠散方：

秦膠（一分）陳芥子（二分）

凡二物，治下篩，酒服方寸七，日三。

#### 治諸淋方第四

《病源論》云：諸淋者，由腎虛而膀胱（音旁）熱故也。其狀小便出少起數，小腹弦急

《葛氏方》治卒患淋方：

灸足大指前節上十壯，良。

又方：灸兩足外踝中央，追年壯，有石即下。

又方：但服草汁一升，不過三升。亦治石淋。

又方：豉一升，水三升，漬少時，以鹽一合納中，頓服。（今按：《經心方》：豉半升 A 水

《極要》云：療淋方：

上，煮石燕汁飲之良驗，以水煮之。

《范汪方》治淋滑石散方：

葵子（一升）滑石（一兩）通草（二兩）

凡三物，治篩，酒服方寸七，日三。

又云：治淋栝萋散方：

石韋(二分) 通草(一分) 栝萋(二分) 葵子(四分)  
凡四物，治篩，先食以麥粥，服方寸七，日三，無不愈。

又方：常以冬葵根作飲，良。

《短劇方》治淋病不得小便，陰上絞痛方：

灸足太冲五十壯。(在足大指本節後二寸。)

又方：灸懸泉，一名中封，十四壯。(中封在足內踝前一寸。)

《廣利方》理諸淋小便卒不通方：

麻根(二七枚，切)  
上，以水二大升，煎取八九合，去滓，分溫三服。

《集驗方》卒得淋方：

取牛耳中毛，燒服半錢七，立愈。

又方：以比輪錢三百文，以水一斗，煮得三升，飲之。千金秘不傳。

《錄驗方》治淋瞿麥散方：

瞿麥(四兩) 石韋(四兩，去毛) 滑石(四兩，碎) 車前子(四兩) 葵子(四兩)  
凡五物，搗篩，冷水服方寸七，日三，增至五七，慎酒、面。

《新錄方》治淋方：

馬莧莖葉搗汁一升，二三服。

## 治石淋方第五

《病源論》云：石淋者，淋而出石也。腎主水，水結則化為石，故腎容沙石。腎虛為熱所乘 甚者

《短劇方》治石淋神方：

車前子二升，以絹囊盛，以水八升煮取三升，盡服之，日移一丈，石子當出。宿不食飲之。

又方：生 莖葉合搗取汁，服一升，日三。

又：病石淋，臍下三十六種病不得小便方：

灸關元三十壯（《千金方》同之）。又方：灸大敦三十壯（在足大指端，去爪甲如韭葉。）

又方：

《錄驗方》石淋方：

取車前草，煮，多飲汁。

又方：石韋（三分）滑石（三分）

凡二物，下篩，合以米汁若蜜，服刀圭七，日三，已效。

《葛氏方》石淋者方：

取燕矢，末，以冷水服錢五七，清旦服，至食時（辰也）當尿石。

又方：取故甑蔽燒，三指撮，服即通。

又方：石首魚頭中石一升，貝齒一升，合搗，細篩，以苦酒和，分為三分，宿不食，明旦服 呼

《千金方》石淋方：

浮石取滿手，下篩，水三升，酢一升，煮取二升，澄清服一升，三服石出。

《本草拾遺》云：有以病為藥者，淋石主石淋，水磨服之。當碎石，隨尿出也。人患石淋或

《新錄方》治石淋方：

生葛根汁，服五六合。

又方：蔥白三升，水六升，煮取二升五合，三服。

《陶景本草注》煮麻根飲之。

《蘇敬本草注》搗烏芋根汁一升，服之。

《崔禹食經》煮葵子服汁。

### 治氣淋方第六

《病源論》云：氣淋者，腎虛膀胱熱氣脹所為也。其狀膀胱少腹皆滿，尿澀，常有餘瀝是也

《千金方》療氣淋方：

灸關元五十壯。又灸夾玉泉相去一寸半三十壯。

又方：水三升，煮船底苔如鴨甲大，取二升一服。

又方：搗葵子末，湯服方寸七。

《廣利方》理氣淋臍下切痛方：

以鹽和少醋填臍中，鹽上灸二七壯，立瘥。

### 治勞淋方第七

《病源論》云：勞淋者，謂勞傷腎氣而生熱成淋也。腎氣通於陰，其狀尿留莖內，數起不出

《千金方》療百淋寒淋熱淋勞淋，小便澀，胞中滿，腹急痛方：

栝萋(三兩) 滑石(二兩) 石韋(二兩)  
三味，大麥粥飲服方寸七，日三。

### 治膏淋方第八

《病源論》云：膏淋者，淋而有肥，狀似膏，故謂之膏淋。亦曰肉淋。此腎虛不能製其肥液

《千金方》云：膏淋之為尿，似膏自出，療之一如氣淋也。  
搗草汁二升，酢二合，和，空腹服之。

## 治血淋方第九

《病源論》云：血淋者，是熱淋之甚者，則尿血謂之血淋。心主血，血行身，通遍經絡，修

《廣濟方》治血淋方：

車前葉，搗取汁，半升，和蜜一匙，攪令消，頓服之，立瘥。（《廣濟方》同之。）

《龍門方》治血淋方：

取刺薊根，勿見風大一握，淨洗，搗取汁半升，服之。極者不過三，良。

《千金方》療血淋方：

石韋 當歸 蒲黃 夕藥

四味，分等，酒服一錢七，日二。

又方：水五升，煮麻根十枚，取二升，頓服。

又方：水四升，煮大豆葉一把，取二升，頓服。

又方：灸丹田，隨年壯。在臍下二寸。今按：《明堂》云：石門一名丹田。

## 治熱淋方第十

《病源論》云：熱淋者，三焦有熱，氣搏於腎、流入於胞而成淋也。其狀小便赤澀。亦有宿

《葛氏方》熱淋方：

取白茅根四斤，銼（子臥反，破也、折傷也）之，水一斗五升，煮令得五升汁，服日三。（《又方：末滑石屑，水服一二合。

《錄驗方》治熱淋方：

蘆心，切，三升，水五升，煮取二升，三服。

《千金方》治熱淋方：

常煮冬葵根作飲服之。

又方：灸亦與氣淋同之。

又方：葵根一升(冬用子) 大棗(二七枚, 去核)

二味, 水三升煮取一升二合, 分二服, 熱加黃芩一兩, 出難加滑石二兩。

《龍門方》療熱淋方：

服冷水三升, 行一裡即下癢。

又方：灸兩足外踝中央, 隨年壯, 有石下。

《廣濟方》療熱淋小便澀痛方：

車前(切, 一升) 通草(三兩) 葵根(切, 一升) 芒硝(六分)

湯成, 切, 以水七升, 煮取二升, 去滓, 納芒硝, 分溫三服, 忌藥食。

### 治寒淋方第十一

《病源論》云：寒淋者其病狀, 先寒戰然後尿是也。由腎氣虛弱, 下焦受於冷氣, 入胞(補

《新錄方》：治寒淋少腹下冷, 手足亦冷方：

葵子(一升) 曲末(一升)

水六升, 煮取三升半, 三服。

又方：葵子一升, 小麥一升, 水六升, 煮取三升, 三服。

### 治大小便不通方第十二

《病源論》云：關格, 大小便不通也。大便不通, 謂之內關; 小便不通, 謂之外格; 二便俱

《千金方》治關格大小便不通芒硝湯方：

芒硝〔(一名石脾)五兩〕 大黃(八兩) 夕藥(四兩) 杏仁(四兩) 麻仁(三兩) 烏棲樹根

凡六味, 以水七升, 煮取三升, 分三服。

又方：灸臍下一寸三分壯。

又方：灸橫紋百壯。

又方：甌帶煮取汁，和蒲黃方寸匕，日三服。

又方：葵子一升，榆皮切一升，水五升，煮取二升，分三服。

《葛氏方》：治卒關格大小便並不通支滿欲死，二三日則殺人方：

取鹽，以苦酒和塗臍中，乾復易之。

又方：自取手十指爪甲燒末，以酒漿服。

又方：葵子二升，水四升，煮取一升，頓服之。納豬膏如雞子一丸亦佳。

《集驗方》治久不得大小便方：

豬脂如雞子，著一杯酒中，煮之令沸，頓服。

又方：煮葵根汁，服，彌佳。

《范汪方》治大小便不出方：

豆醬納下部中，令人吹則通小便，以鹽納莖中則利，良。

《經心方》滑石散治大小便不通方：

滑石(二兩) 榆皮(一兩) 葵子(一兩)

凡三物，作散，濃煮麻子一升，半取一升，以兩匕和服，不過二，大小便通。(《千金方》同之。)

《廣利方》：理氣壅、關格不通、小便淋結、臍下妨悶兼痛方：

冬葵子二大合，生茅根一握，以水一大升半，煎取六大合，去滓，分溫二服。

又云：關隔不通、胞脹妨悶、大小便不通方：

冬葵子(三大合, 綿裹, 碎) 滑石(十二分, 碎) 芒硝(十分, 湯成下) 切, 以水二大升, 煎取八大合, 去滓, 空腹分溫再服, 服別如人行四五裡。忌肉、面。

### 治大便不通方第十三

《病源論》云：大便不通者，猶(由)三焦五臟不和，冷熱之氣不調，熱氣偏入腸胃，津液竭燥，故令糟粕(並格反，糟酒滓也)痞結壅塞不通也。

《葛氏方》治大便不通方：

研麻子，以米雜為粥食之，亦可直煮麻為飲服之。

又方：剝烏梅皮，以漬醬豆中，導下部。

《范汪方》治大便不通方：

用豆醬納下部中則通。

又方：醬中瓜，切，令如指長三寸，納大孔中。

《秦承祖方》不得大便數日方：

作熱湯著盆中，人居其中，湯未冷則瘥。

又方：灸下部後五分三十壯瘥，大良。

《千金方》治大便不通方：

桑根(一把, 去赤皮) 榆根(一把, 去赤皮) 水三升, 煮服一升半, 分二服。

又方：恆煮麻子取汁飲之。

《龍門方》療大便不通方：

取膠，廣二寸，長四寸，蔥白一握，以水三升和煮，消盡去滓，一服驗。

又方：熬葵子半升，搗末，以水一升煮服之。

《醫門方》：療下部閉塞大行(謂大便也)不出方：

取烏梅四十枚拍碎，湯中浸少時，去核，搗之如渾丸大一枚納下部中，立通。

《短劇方》大便閉塞氣結心滿方：

灸石關百壯。（今按：《明堂》：在幽門下二寸，幽門在巨闕旁半寸。）

又方：灸足大都隨年壯。

《經心方》夕藥湯治脹滿大行不通方：

夕藥（六分）芒硝〔一名石脾）六分〕黃芩（五分）大黃（八分）杏仁（八分）凡五味，丸如梧子，飲服十五丸，日三。

《華佗方》云：有病日食二斗米，至二百日不大便，亦無所病苦，何以爾名？為何等病也？此

葛根（五斤）豬肪（三斤）

凡二物，葛根細銼洗之，以水三斗並煎之得一斗半，去滓，複煎其汁得七升已，取豬肪，切禁。服此藥，開六腑，當下。

#### 治大便難方第十四

《病源論》云：大便難者，由五臟不調，陰陽偏有虛實，三焦不和，則冷熱並結故也。

又云：渴利之家，大便亦難，為津液枯竭，致令腸胃乾燥。

《葛氏方》云：脾胃不和，常患大便堅強難者：

大黃（三兩）夕藥（三兩）濃朴（三兩）枳實（六斤）麻子仁（五合）搗篩，蜜丸如梧子，服十丸，日三，稍增，以通利為度，可恆將之。

《千金方》治大便難方：

單用豉、清醬、清羊酪、土瓜根汁，並單灌之，立出。

又方：醬清漬烏梅，灌下部中。

又方：麻油二升，納蔥白三寸，煮令黑，去滓，待冷頓服。

又方：灸承筋三壯。

又方：夾玉泉相去各二寸灸之。

《新錄方》大便干骨立者方：

灸胃腕穴千炷。

又方：生地黄切三升，韭切三升，以水一斗，煮取二升五合，分三服，相去十裡。

又方：單服馬莧汁一升，癢止。

又方：搗蒜為泥，酒服如棗，日三。

又方：燒魚為灰，酒服方寸匕，日二三。

又方：服甑帶汁五六合，日二。

《承祖方》治大便難腹熱連日欲死方：

甘遂 芫花 黃芩

凡三物，分等，搗，蜜丸如小豆，服五丸，不通，更服三丸。

《華佗方》治大便堅，數清不能得出方：

皂莢末，下篩，以豬脂和合，葦管長一寸，以指排納穀道中齊指一節，須臾則去。

又云：二車丸主臨飯腹痛不能食，複又大便難方：

大黃(十三兩) 柴胡(四兩) 細辛(二兩) 茯苓(一分) 半夏(一兩)

凡五物，治篩，丸以蜜，飲服如梧子五丸，日再。

《集驗方》治大便難，腹熱連日欲死方：

白蜜三升，於微火上煎之，使如強 以投冷水中，須臾當凝出丸，丸如手指大，長六寸七寸

又云：不得大便十日或一月煩滿欲死方：葵子二升，水以四升，煮取一升，去滓，頓服之。

### 治大便失禁方第十五

《病源論》云：大便失禁者，由大腸與肛門虛冷滑故也。肛門，大腸之侯也，俱主行糟粕。

《千金方》治老人小兒大便失禁：

灸大指奇間三壯，兩腳。

又方：灸兩腳大指去甲一寸三壯。

### 治大便下血方第十六

《病源論》云：此由五臟傷損所為。臟氣既傷，則風邪易入，熱氣在內，亦大便下血。其前

《短劇方》云：諸下血者，先見血後見便，此為遠血，宜服黃土湯。若先見便後見血，此是赤小豆散方：

赤小豆（三升，熬） 當歸（三兩）

凡二物，治篩，服方寸匕，日三。（今按：《令李方》：黃連二兩酒服。）

黃土湯方：

灶中黃土（半升，綿裹） 甘草（三兩，炙） 乾薑（二兩） 黃芩（三兩） 阿膠（三兩） 乾地黃

凡六物，以水一斗，煮取三升，分三服。（今按：《集驗方》有芎、熟艾，無黃芩、乾地

《葛氏方》治卒下血方：

鼓一升，以水三升，漬，煮三沸，去滓，頓服汁一升，日三。冬天每服輒溫。

又方：鼓二升，以酒六升，合煮得三升，服一升，日三。

又方：煮香極令濃，去滓，服一升，日三。

又方：亂髮如雞子大，燒末，水服之，不過三。

又方：三指撮鹽，燒，向東服之。

又方：灸兩足大指回毛中，追年壯即愈。

《僧深方》治卒下血蒲黃散方：

甘草(一分) 乾薑(一分) 蒲黃(一分)

凡三物，下篩，酒服方寸七，日三。

又方：治卒注下並下血，一日一夜數十行方：

灸臍中及臍下一寸各五十壯。(今按：《葛氏方》：以錢掩臍上，灸錢下際五十壯。)

《醫門方》治卒下血或因吃熱物而發方：

生葛根汁 生地黃汁 生藕根汁

各飲一升，日二，瘥。

又方：小豆末和水服方寸七，日二服，立瘥。

《范汪方》治下血方：

乾地黃(五兩) 膠(三兩，炙)

凡二物，治篩，分三服。(《葛氏方》同之。)

又方：乾地黃下篩，以酒服方寸七，日三。

又云：治大便血諸血衄血方：

烏賊魚骨(五分) 桑耳(一分)

凡二物，治篩，酒服方寸七，日三。

《千金方》下血日夜七八十行方：

黃連(四兩) 黃柏(四兩)

二味，淳酢五升，或煮取一升半，分再服。

《枕中方》治人下血方：

取雞蘇絞取汁，多少任意服之，愈，（今按：《集驗方》：治吐血，下血並婦人漏下。）

《新錄方》治卒下血兼血痔方：

梔子及皮一升，以水三升，煮取一升三合，分二服。

又方：桃奴，樹上死桃子也。取一升，以水三升，煮取一升三合，分二服。

又方：取敗船茹（音如）二升，以水三升，煮取一升二合，分二服。

又方：荊葉切三升，以酒五升，煮取一升六合，分二服。

又方：赤小豆三升，以水五升，煮取一升六合汁，渴飲汁，飢啖豆。

又方：以水三升煮蔥白一升半，取一升二合汁，分三服。

又云：食熱物下血方：

搗生葛根，取七八合汁，飲之。

又方：搗生地黃取汁，飲七八合。

又方：搗生藕取汁，飲七八合。

又方：生荷根汁，飲六七合。

又方：酒三升，煮大棗二十一枚，取汁分二三服。

又方：一（以）水服石榴皮末方寸七，日二。

又方：搗薊，無問大小貓虎羊等，取汁飲之，煎取，若冬月無生者，掘取根或乾者切二升，

### 治小便不通方第十七

《病源論》云：小便不通者，由膀胱與腎俱有熱故也。腎主水，膀胱為津液之腑，此二經為便不

《葛氏方》治小便不通方：

熬鹽令熱，納囊中，以熨少腹上。

又方：以鹽滿臍，灸上三壯。（以上《短劇方》同之。）

又方：末滑石，水服方寸七。

又方：以衣中白魚蟲納小孔中。

《千金方》治小便不通方：

水四升，洗甌帶，取汁，煮葵子，取二升半，分三服。

又方：葵子、車前子，水五升，煮取二升半。三服。

又方：鯉魚齒灰末，酒服方寸七，日三。

又方：魚頭石末，水服方寸七，日三。

《新錄方》治小便不通方：

水漬石，迭熨少腹下出，或燒石熱熨少腹，以出為度。

又方：車前子一升，以水三升，煮取一升二合，再服。

《短劇方》小便不通及關格方：

取生土瓜根，搗取汁，以少水解之於筒中，吹納下部即通。秘方。

又云：治小便閉方：

豉半升，水四升，煮一沸，去滓，一服立愈通。

《醫門方》療小便不通方：

取亂髮如拳大，燒作灰、末、篩，酒服方寸七，立愈。

又云：療小便不通、小腹滿悶，不急療殺人方：

蔥白切一合，鹽少許，搗絞取汁，灌三五豆粒許入水道中，水便出。極效。

《集驗方》：治淋、小便不利、陰痛，石韋散方：

石韋(二兩) 瞿麥(一兩) 滑石(五兩) 車前子(三兩) 葵子(二兩)  
凡五物，下篩，先食服方寸匕，日三。

《令李方》治淋，胞滿不得小便滑石散方：

滑石(一兩) 通草(半兩) 石韋(一兩)  
凡三物，治篩，酒服方寸匕，日三。

《范汪方》治小便不通方：

取陳葵子一升，淳酒三升，煮之服盡。

## 治小便難方第十八

《病源論》云：小便難者，此亦是腎與膀胱熱故也。

《錄驗方》治小便難淋瀝方：

通草(二兩) 茯苓(二兩) 葶藶子(二兩，熬)  
凡三物，下篩，以水服方寸匕，日三。

《新錄單方》治小便不出、腹滿氣急者方：

灸關元穴，在臍下三寸，依年壯。

又方：車前草切三升，以水五升，煮取二升，分二服，日一。

又方：甌帶一枚，以水五升，煮取一升六合，再服。

又方：大麻子三升，以水五升，煮麻子腹破，分二服。

又方：煮滑石取汁，飲之立下。

又方：葵子二升，以水四升，煮取一升六合，分三服。

又方：茅根切二升，煮服依前，兼去渴，最妙。

《醫門方》療小便難方：

以少鹽納莖孔中即通。

### 治小便數方第十九

《病源論》云：小便數者，膀胱與腎俱虛，而有客熱乘之故也。

《范汪方》治小便一日一夜數十行方：

菖蒲 黃連

二物，分等，治篩，酒服方寸匕。

又方：石膏半斤，咀，以水一斗，煮取五升稍服。（以上《葛氏方》同之。）

《千金方》治小便利複非淋方：

榆白皮二斤，水一斗，煮取五升，服三合，日三。

又方：三年重鵲巢燒末，服之。

《葛氏方》：治小便卒太數複非淋，一日數十過，令人疲瘦方：

灸兩足下第二指本節第一理七壯。

又方：不中水豬膏如雞子者一枚灸，承下取肥汁盡服之，不過三。此二方並治遺尿也。

又方：雞腸草一把，熟搗，酒一升漬一時，絞去滓，分再服。

《醫門方》療小便數日夜出無節度方：

小豆苗葉，搗絞取汁，飲一二升，立止，極效。

### 治小便不禁方第二十

《病源論》云：小便不禁者，腎氣虛，下焦受冷也。腎主水，其氣下通於陰，腎虛下焦冷，《新錄方》治小便不禁方：

柏樹白皮切三升，以水三升，煮取一升二合，分再服，相去十裡。

又方：故甌帶，以水三升，煮取一升二合，分二服。

又方：露蜂房灰，酒服方寸七，日二。

又方：石榴皮子灰，酒服方寸七。

又方：榆白皮切二升，水四升，煮取一升六合，二服。

《令李方》：小便不禁數行方：

當歸(二兩) 甘草(五分)

凡二物，治下篩，酒服半錢七，日三，一月瘥。夏月納茯苓，陰腫痛納黃 分等。

《極要方》療小便不禁或如血色方：

麥門冬(八兩，去心) 蒺藜子(二兩) 甘草(一兩，炙) 乾薑(四兩) 桂心(二兩)  
乾地黃

上，水一斗，煮取二升半，分三服。

### 治小便黃赤白黑方第二十一

《僧深方》治膀胱急熱、小便黃赤滑石湯方：

滑石(八兩，碎) 子芩〔(一名黃芩)三兩] 車前子(一升) 葵子(一升) 榆皮(四兩)

凡五物，以水七升，煮取三升，分三服。

《龍門方》療人小便白稠方：

取蜂房燒作灰，和水一服一七，瘥。

《范汪方》治小便利多而或白精從尿後出方：

栝藿(三分) 滑石(二分) 石韋(一分)

三物，為散，麥粥服方寸七，日三。

又云：治小便白濁而多方：

桑茸(三分) 甘草(五分) 二物，為散，以酢漿服方寸七，日三。

又云：治虛羸，少(小)便青黃白黑，白如米汁方：

白善〔一名白玉〕六分 龍骨（五分） 牡蠣（二分） 小豆（三兩，熬） 土瓜根（二分）

凡五物，治篩，以酒服一方寸七，日三。

## 治小便血方第二十二

《病源論》云：心主於血，與小腸合，若心家有熱，結於小腸，故小便血也。

《養生方》云：人食甜酪，勿食大酢，變為尿血也。

《新錄方》治尿血方：

車前草，搗絞取汁，服五合，旦空腹服之。

又方：棘刺二升，水四升，煮取二升，分三服。

《范汪方》治小便血方：

烏芋根五升，搗取汁，服一升。

《千金方》治尿血方：

豉二升，酒四升，煮取一升，頓服。

又方：生大麻根十枚，水五升，煮取二升，分三服。

又方：龍骨細末，溫酒服方寸七。

又方：熬鹽熱熨少腹，並主淋。大良。

又方：刮滑石屑，水和塗少腹繞陰際，佳。

又方：灸大敦穴，隨年壯。

又云：治房損傷中尿血方：

牡蠣 車前子 桂心 黃芩

四味，下篩，飲服方寸七，日三，加至二七。

又云：治虛勞尿血淋方：

葵子一升，水三升，煮取一升半，日三。

《葛氏方》治小便血方：

茅根一把，切，煮，去滓，數飲之。

又方：搗蔥白取汁服一升。

《短劇方》治生地黃湯治小便血方：

生地黃(半斤) 柏葉(一把) 黃芩(二兩) 膠(二兩) 甘草(二兩)  
凡五物，以水七升，煮取三升，絞去滓，納膠令烊，取二升半，分三服。

《博濟安眾方》療小便出血方：

地黃汁一升，薑汁一合，相和頓服。未瘥，再服。

### 治遺尿方第二十三

《病源論》云：遺尿者，此由膀胱虛冷，不能約(求俱反，救也)於水故也。

防己 防風(各三分) 葵子(二分)  
治，末，服方寸匕。一方防己三升。

又方：礬石、牡蠣分等，冶合，以黍粥服方寸匕，日三。

《令李方》治遺尿夕藥散方：

白薇(一兩) 夕藥(一兩)  
凡二物，冶合，下篩，酒若水服方寸匕，日三。

《龍門方》治遺尿不禁方：

取燕巢中蓐(乳屬反，茲也，席也)燒灰。服一錢匕，日三，七日瘥。

今按：《本草拾遺》云：水進方寸匕，亦主噦。

《錄驗方》治遺尿龍骨散方：

桑茸(三兩) 礬石(二兩) 牡蠣(二兩) 龍骨(三兩)  
凡四物, 合治, 下篩, 服方寸匕, 日三。

《千金方》治遺尿、小便澀方：

木防己(二兩) 葵子(二兩) 防風(二兩)  
三味, 水五升, 煮取二升半, 分三服, 散亦服佳。

《短劇方》治遺尿灸穴：

灸遺道, 在俠玉泉五分, 隨年壯。

又方：灸陽陵泉、陰陵泉, 隨年壯。在膝下一寸。

#### 治尿床方第二十四

《病源論》云：人有於眠睡不覺尿出者, 是其稟質陰氣偏盛, 陽氣偏虛者, 則膀胱腎氣俱冷, 不能溫製於水, 則小便偏多, 或不禁而遺失。

《新錄方》治尿床方：

大麻根皮切三升, 以水五升, 煮取一升八合, 去滓, 分二服, 小兒減之。

又方：大豆葉三升, 水五升, 煮取二升, 分三服。

## 卷第十三

## 治虛勞五勞七傷方第一

《病源論》云：虛勞者，五勞六極七傷是也。五勞者，一曰志勞，二曰思勞，三曰心勞，四極六精 腎（是按：虛勞陰痿

《千金方》云：三人九子丸主五勞七傷補益方：

酸棗仁 柏子仁 薏苡仁 枸杞仁 蛇床子 五味子 菟絲子 菊子 子 荊子 地膚

十五味，加菴蓉三兩，餘各二兩，酒服如梧子二十丸，日二。

《范汪方》開心薯蕷腎氣丸，治丈夫五勞七傷，髓極不耐寒，眠即臚脹，心滿雷鳴，不欲飲 不發 去冷，

肉菴蓉（一兩，一方無） 山茱萸（一兩，一方無） 乾地黃（六分，一方代乾薑） 遠志（六分） 菟絲子（六分） 凡十二物，搗下篩，蜜丸如梧子，服十丸至二十丸，日二夜一。若煩心即停減之。只服十丸 十五夜 獨 寢不寒，止 服一劑。

又云：六生散治五勞七傷五緩六急，治寒熱脹滿，大腹中風垂曳，消 逐血，補諸不足，令人肥白方：

生地黄根（二斤） 生薑（一斤） 生菖蒲根（一斤） 生枸杞根（一斤） 生烏頭（一斤） 生章

凡六物，合七斤，熟洗之，停令燥□切之，美酒二斗都合漬三四日，出爆之，暮輒還著酒中

《煎藥方》云：酥蜜煎治諸渴及內補方：

酥（一升） 蜜（一升） 地黃（煎，一升） 甘葛（煎，一升） 大棗（百枚） 茯苓人參 薯蕷

上八物，先蜜酥入合攪，烱後甘葛煎入，烱棗膏，以絕絞入，然後茯苓、人參、薯蕷等散入

今按：酥蜜煎方有數首，或藥種多少不同，或分兩升合各異，仍取當今名醫增損之法以備俗酥（小一升）蜜（小一升，煎去滓沫，無用甘葛煎）甘葛（煎，大三升）地黃（煎，大二合 五十枚，取肉篩）

凡十物，先以酥入生薑煎煎之，令相得，次入蜜，次以甘葛煎和大棗，煉胡麻絞去滓入，次 火 少

《雜酒方》枸杞石決明酒治除腰腳疾疝癰，諸風痺惡血，去目白膚翳赤膜痛眨淚出瞽盲輕

石決明（乾者一大斤，洗，炙）枸杞根白皮（小一斤）

上二物，細切，盛絹袋，以清酒四斗五升漬之。春五日、夏三日、秋七日、冬十日去滓，始

《太清經》五茄酒治五勞七傷，心痛血氣乏弱，男子陰痿不起，囊下恆濕，小便餘瀝而陰癢耐老 用雄 一升 物，渴，四肢拘攣，膝痛，不可屈伸，傷中少氣，陰消腦疼，憂患驚邪恐悸，心下結痛，煩滿，咳逆，口焦舌乾，好唾，膈中痰水，水腫，陰下癢濕，小便餘瀝，腳中酸痛，不欲踐地。身中不足，四肢沉重，時行嘔噦，折跌絕筋，積聚，五勞七傷，目暗清盲，熱赤痛，補虛羸，除寒熱，益氣力，長肌肉，止腰痛，充五臟，利小便，益精氣，止瀉精，久服耳目聰明，陰氣長強，堅筋骨，填腦髓，養神安魂，令人身輕。能跳越峰谷，不老而長生也。

枸杞根切，大一石，以水大三斛，入煮取五斗汁，去滓，加薯蕷、藕根各二大升，煮取一大斗，黃煎 如糖

《錄驗方》生地黃煎補虛除熱，將和取利也。散石癰疽瘡癤痔熱皆宜之方：

生地黃根隨多少春絞取汁，複重春絞取之，盡其汁，乃除去滓也。以新布重絞其汁，去滓碎濁，令清淨，置□ 中置釜湯上煮□，勿塞全邊，令湯氣得泄不沓也。煎地黃汁竭減半許，後煎下，更以新布絞去粗碎結濁滓穢，去複煎竭之，令如飴糖成煎。北方地黃 味濃，作煎甘美；東南地黃堅細，味薄，作煎咸苦不美，然為治同耳。能多作則美好也，少作則易竭，

## 治虛勞羸瘦方第二

《病源論》云：夫血氣者，所以榮養其身也。虛勞之人，精髓萎竭，血氣虛弱，不能充盛肌

《錄驗方》枸杞丸治勞傷虛損方：

枸杞子(三升) 乾地黃(切, 一升) 天門冬(切, 一升)  
凡三物, 細搗曝令乾, 以絹羅之, 蜜和作丸, 大如彈丸, 一服一丸, 日二。

《范汪方》云：補養湯主虛勞羸瘦, 食已少氣方：

甘草(一兩, 炙) 朮(四兩) 牡蠣(二兩) 大棗(二十枚) 阿膠(三兩) 麥門冬(四兩, 去  
凡六物, 咀, 水八升煮取二升, 盡服, 禁生冷。

《千金方》甘草湯主虛羸 氣欲絕方：

甘草(二兩) 生薑(二兩) 人參(一兩) 五味(二兩) 吳茱萸(一升)  
五味, 水四升煮茱萸令如蟹目沸, 去滓, 納藥煮取一升六合, 分再服。

又云：小鹿骨煎主治一切虛羸皆悉服之方：

鹿骨(一具, 碎) 枸杞根(切, 一升)  
二味, 各以水一斗別器煎, 各取汁五升, 去滓, 澄乃合一器共煎, 取五升, 二  
日服盡。好將

《本草拾遺》云：鯽魚肉主虛羸, 熟煮食之。

《耆婆方》治人瘦, 令人肥健、肥白、能行陰陽, 並去風冷、虛瘦無力, 神驗方  
：

取楓木經五年以上樹皮, 去上黑皮, 取中白皮五斗, 細銼微曝令水氣去, 以  
清美酒於白 瓦器 經數

《極要方》云：枸杞子酒療虛羸黃瘦, 不能食, 服之不過兩劑, 必得肥充, 無  
禁斷方：

枸杞子(五大升, 乾者碎) 生地黃(三大升, 切) 大麻子(五大升, 碎)  
上, 於甑中蒸麻子使熟, 下著按上攤去熱氣, 冷暖如人肌, 納地黃、枸杞子,  
熟 使三物相 微有

《明堂經》云：脾輸二穴灸三壯, 主腹中氣脹引脊痛, 食飲多, 身羸瘦, 名曰  
食晦。注云：

### 治虛勞夢泄精方第三

《病源論》云：腎虛為邪所乘，邪客於陰，則夢交接，令腎虛弱不能製於精，故因夢感動而《短劇方》別離散治男女風邪，男夢見女，女夢見男，悲愁憂恚，怒喜無常，或半年或數月

楊上寄生(三兩) 朮(三兩) 桂心(一兩，一方三兩) 茵芋(一兩) 天雄(一兩，炮) □ 根 薑(一兩)

凡十物，合搗下篩，酒服半方寸七，日三。合藥勿令婦人、雞、犬見之，又無令見病者，病

又云：龍骨散治男子失精百術不治方：

龍骨(大如指赤理錦文者) 薰草(二兩) 桂肉(二兩) 乾薑(二兩)

凡四物，下篩酒服方寸七，日三，神良。

又云：韭子湯治失精方：

韭子(一升) 龍骨(三兩) 赤石脂(三兩)

凡三物，以水七升煮取三升半，分三服。

《集驗方》治夢泄精方：

韭子(一升，熬) 一物，搗篩，酒服一方寸七，日再，神效。

《醫門方》療夢交接泄精，暫睡即出，身體枯燥骨立者方：

白龍骨(八分，研) 韭子(一升半) 為散，酒服方寸七，日二。加至一七半，日二。

《極要方》云：小便失精及夜夢泄精方：

韭子(一升，熬) 麥門冬(二兩) 菟絲子(二合) 車前子(二合) 芎 (二兩) 龍骨(二兩)

以上，以水八升煮取二升，為四服，日三。

《玉房秘訣》云：治數夢交失精方：

龍骨 牡蠣 甘草 桂(各三兩) 大棗(一枚)  
水六升，煮取二升半，分三服。

《僧深方》云：禁精湯主失精羸瘦，酸消少氣，視不明，惡聞人聲方：

韭子(二升) 生粳米(一升) 二物，合於器中熬之，米黃黑及熟，急以淳佳酒一斗投之，絞取七升，服一升，日三，二劑便愈。

《新錄方》治失精方：

取韭根搗取汁服五合，日二。

又方：石榴皮搗為散，飲服方寸匕，日二。

又方：韭子一升，桑螵蛸十四枚，水五升，煮取二升，三服，亦為散酒服。

《葛氏方》云：治男女夢與人交接，精便泄出，此內虛積滯，邪氣感發，治之方：

韭子(一升) 粳米(一升)  
水四升，煮取升半，一服。

又方：龍骨二分，朮四分，桂二分，天雄一分，搗末酒服五分匕，日三。

又方：兩足內踝上一夫，脈上名三陰交，灸二十一壯，夢即斷。

又方：合手掌並大拇指令兩爪相近，以一炷灸兩際角令半入爪上三壯。

又云：治男女精平常自出，或聞見所好感動便已發，此腎氣乏少不能禁製方：

巴戟天 石斛 黃 分等，搗，酒服方寸匕，日三。

又方：鹿茸一兩，桂一尺，韭子一升，附子一枚，澤瀉三兩，搗末服五分匕，日三。

又方：牡丹灸令變色，搗末服方寸，日三。

又方：雄雞肝、鯉魚膽，令塗陰頭。

#### 治虛勞尿精方第四

《病源論》云：腎藏精其氣通於陰。勞傷腎虛，不能藏於精，故因小便而精液出。

《千金方》治虛勞尿精方：

韭子(一升) 稻米(二升)  
水一斗七升，煮如粥，取汁六升，分三服。

《葛氏方》治男子溺精如米汁及小便前後去精如鼻涕，或尿有餘瀝污衣，此皆內傷令人虛絕 栝蒌(二分) 滑石(二分) 石韋(一分)  
搗末，以麥粥服方寸匕。

又方：甘草、赤石脂分等搗末，服方寸匕，日三。

《醫門方》云：療失精無故自泄，或因尿精出方：

韭子 白龍骨 菟絲子(各二十分) 麥門冬(去心) 車前子 澤瀉(各十二分)  
人參(十分) 為散，空腹以酒服方寸匕，日二，加至一七半。

《錄驗方》淮南王枕中丸治陰氣衰，腰背痛，兩脛(於緣反)疼，小便多瀝，失精，精自出 石斛 巴戟天 桑螵蛸 杜仲  
凡四物，分等合搗下篩，蜜丸如梧子，酒服十丸，日二。令強陰、氣充、補諸虛，神良。

#### 治虛勞精血出方第五

《病源論》云：腎藏精，精者血所成也，虛勞則生七傷六極，氣血俱損，腎家偏虛，不能藏

《葛氏方》云：治失精、精中有血方：

父蛾二七枚，陰乾之，玄參稱半分，合搗末，以米汁向旦日一服，令盡之。

#### 治虛勞少精方第六

《千金方》治虛勞少精方：

鹿角白末，蜜和，服如梧子七丸，日三，三十日大效。

又方：生地黃根五升，以清酒漬，少少飲之。

又方：漿煮蒺藜令熟，洗陰，日二，十日知。

《雜酒方》云：桑樹東南枝白皮一把，細切，以酒一升漬之，經宿去桑皮，多少飲之，精如

### 治虛勞不得眠方第七

《病源論》云：邪氣客於臟腑，則衛氣獨營其外，行於陽，不得入於陰。行於陽則陽氣盛，《千金方》云：千裡水湯治虛煩不眠方：

半夏(三兩) 秫米(一升) 茯苓(四兩) 酸棗(二升) 麥門冬(三兩) 甘草(二兩) 桂心(薑(四兩) 十二味，以千裡水一石，煮米令蟹沸，揚之萬過，澄取清一斗煮諸藥，取二升半分三服。

又方：療虛勞不得眠方：

酸棗 榆葉 分等，丸如梧子，一服五丸。

又方：末乾薑四兩，湯和，頓服，覆取汗愈。

又云：酸棗湯主虛勞煩擾，奔氣在胸中，不得眠方：

酸棗(五升) 人參(二兩) 石膏(四兩) 茯苓(三兩) 桂心(二兩) 生薑(二兩) 甘草(一八味，以水一斗先煮酸棗，取七升，去棗，納餘藥煎取三升，分三服。

《葛氏方》云：治卒苦連時不得眠方：

暮以新布火灸熨目，並蒸大豆，囊盛枕之，冷複易，終夜常枕，立愈。

《崔禹錫食經》云：蠶治夜不眠，志意不定。

《本草經陶景注》云：榆初生葉，人以作糜羹輩，令人睡眠。嵇公所謂榆令人眠。

《短劇方》流水湯主虛煩不能眠方：

半夏(二兩) 秫米(一升) 茯苓(四兩)

凡三物，以流水二斗揚之三千過，令勞煮三物，得五升，分服一升，日三夜再。

《僧深方》小酸棗湯治虛勞臟虛，恚不得眠，煩不寧方：

酸棗(二升) 母(二兩) 乾薑(二兩) 甘草(一兩) 茯苓(二兩) 芎(二兩)  
凡六物，切，以水一斗煮棗，減三升，分三服。

### 治昏塞喜眠方第八

《病源論》云：嗜眠者，由人有腸胃大，皮膚澀者，則分肉不開解，其氣行在於陰而遲留，《葛氏方》治嗜眠喜睡方：

父鼠目一枚燒作屑，魚膏和，注目外則不肯眠，兼又取兩目，絳帛裹帶之。

又方：麻黃、朮各五分，甘草三分，日中向南搗末，食後服方寸七，日三。

又方：孔公孽末五兩，通草三兩，茗葉一斤，水一斗煮取五升，向暮服之，即一夕不睡眠。

《龍門方》療嗜睡眠方：

馬頭骨燒作灰，服方寸七，日三夜一，瘥。(今按：《陶潛方》：馬發燒作灰末，服方寸七)

又方：苦參三兩，朮二兩，大黃一兩，搗末蜜丸如梧子，每食後服三十丸，驗。

### 治邪傷汗血方第九

《病源論》云：肝藏血，心之液為汗。言肝心俱傷於邪，故血從膚腠而出也。

《醫門方》治汗血、吐血方：

青竹茹(三兩) 生地黃(五兩) 人參(一兩) 桔梗(一兩) 芎(一兩) 當歸(一兩) 桂心

上，切，以水九升煮取三升，去滓，分溫三服，甚神效。

《短劇方》治吐血、汗血、大小便血，竹茹湯方：

竹茹(二升) 甘草(六分) 當歸(六分) 芎 (六分) 黃芩(六分) 桂心(一兩)  
朮(一兩)

凡九物，以水一斗煮取三升，分四服。

## 治虛汗方第十

《病源論》云：諸陽主表，在於腠理之間，若陽氣偏虛，則津液發泄，故為汗，汗托 h 損於

《短劇方》治汗出如水漿及汗血、衄血、吐血、小便血、殆死，都梁香散方：

都梁香(二兩) 紫菀(一兩) 桂肉(一兩) 人參(一兩) 生竹茹(一兩) 肉蓯蓉(一兩) 乾

凡七物，治篩，以水服方寸匕。

《千金方》治汗出方：

豉一升，酒二升，漬三日，服之。不過三劑，瘥。

《范汪方》治汗粉藥方：

牡蠣(二兩) 乾薑(二兩) 附子(一兩，炮)

凡三物，搗下，以藥一合，白粉二合和合，摩汗出處。

《僧深方》治大虛，汗出欲死，若白汗出不止方：

麻黃根(二兩)

凡一物，以清酒三升，微火煮得一升五合，去滓，盡服之。

《效驗方》治人汗勞不止麻黃丸方：

麻黃根(二分) 石膏(一分)

凡二物，治篩，和蜜丸，大人服小豆三丸，日三，小兒以意增損。

《錄驗方》治腋下汗出作瘡方：

橘皮(三兩) 黃連(三兩) 甘草(三兩) 米粉(四兩)  
凡四物, 治篩成粉, 汗出時粉之。

又云：止汗石膏散方：

石膏(四兩) 甘草(四兩)  
合搗, 先食漿服方寸七, 日三。

《陶景本草注》云：麻黃節及根, 夏月雜粉用之。

### 治風汗方第十一

《經》云：凡熱者欲汗出為通氣也, 而皮膚致密不汗出也。風者欲汗不出為身疲也, 而皮膚

《范汪方》治風汗出方：

防風(一兩) 牡蠣(一兩) 乾薑(一兩)  
凡三物, 治篩一升, 白粉三升合攪, 以粉之。欲粉時, 於銅銚中熬令小溫, 良。

《僧深方》治風汗出少氣方：

防風(十分, 一方三兩) 白朮(六分, 一方三兩) 牡蠣(三分, 一方三兩)  
凡三物, 治篩, 以酒服方寸七, 日三。

### 治陽虛盜汗方第十二

《病源論》云：盜汗者因睡眠而身體流汗也, 此由陽虛所致。久不已令人羸瘦。

《千金方》牡蠣散治臥即盜汗、頭痛方：

牡蠣(三兩, 熬) 朮(三兩) 防風(三兩)  
上三味, 酒服方寸七, 日一, 止汗之驗無出於此, 一切泄汗皆愈。

《錄驗方》止汗石膏散方：

石膏(四兩) 甘草(四兩)  
合搗篩，先食漿服方寸七，日三。

《極要方》療盜汗方：

麻黃(三兩) 牡蠣粉(二兩) 蒺藜子(二兩) 熟米粉(半兩) 白米粉(六合)  
以上為粉，生絹袋盛，臥汗出，敷之。

《范汪方》治盜汗麻黃散方：

麻黃根(三分) 故敗扇燒屑(一分)  
凡二物，治篩，以乳服三分七，日三，大人方寸七，日三。

### 治傳尸病方第十三

《玄感傳尸方》云：夫傳尸之病，為蠹(當戶反)實深大，較男夫多以 癖及勞損為根，女人 所 □，小兒乃曰無辜，因虛損得名為勞極。骨中熱者號為骨蒸，微嗽者稱曰肺痿(力朱 反，曲

又云：論曰：大都男女傳尸之候，心胸滿悶，背膊(補各反，《說文》肩甲也)煩疼，兩目精 多臥小起 微熱，面好 與鬼交，或 而精神尚好 沉羸，猶如

又云：論曰：傳尸之疾本起作無端，莫問老少男女皆有斯疾。大都此病相克而生，先內傳毒瓦斯，周遍五臟，漸就羸瘦至於死，死訖復易(羊益反，轉也)親一人，故曰傳尸；亦名轉注；以其初得半臥半起，號 □；內傳五臟名之伏練。不解療者，乃至滅門。假如男子因虛損得酸疼，腰脊次傳於心 無滋□心既受 聞香臭 刺痛，或 血色，常睡還不著。肝既受已，次傳於脾，脾初受氣，兩脅膚脹，食不消化，又時渴利，熟食生出，有時脇痛，赤黑汁，至

又云：傳尸、骨蒸、伏練、□ 相染滅門神秘方：

柴胡(三兩) 桑根白皮(五兩) 甘草(二兩，炙) 桔梗(三兩) 續斷(三兩) 紫菀(四兩) 赤小豆(一升，小) 青竹茹(三兩) 五味子(三兩) 乾地黃(五兩，無者以生十兩代之) 若熱更加石膏三兩(末)，若不下食更加生麥冬二兩(去心)。

凡九物，切，以水九升煮取二升五合，絞去滓，分溫三服，服去如人行七八裡，重者服五六

又云：主傳尸、骨蒸、例(力製反，皆也)多盜汗粉身方：

麻黃根(三分) 牡蠣粉(三分) 蒺藜子(二兩) 熟米沙(半兩, 末) 白朮粉(六分) 胡燕脂

凡六物, 搗篩, 絹袋子盛之, 夜臥汗出敷之。

又云: 主傳尸、骨蒸、鬼氣, 惡寒壯熱, 諸風虛疥癬瘙癢方:

直用桃、柳、槐、蒟 四種枝葉, 各銼一大升, 以水九大斗煮取五大斗, 去滓, 加鹽二大升

又云: 主傳尸、伏練、□、骨蒸、癰、鬼氣、惡寒、悒悒(於急反, 憂也), 或如瘡等, 大椎上穴。又兩旁才下少許對椎節間各相去一寸半二穴(名大杼。)又兩肋(魯得反, 脅骨也) 合七穴, 日別取, 正午各灸七壯, 滿一百五十壯, 即覺漸瘥。

又云: 主傳尸、□、喜厭(一琰反) 夢者, 灸商丘二穴。(在足內踝下微前陷者中, 灸七壯

《廣濟方》療瘦病、伏練、諸鬼氣惡注, 朱砂丸方:

光明朱砂(一大兩, 碎) 桃仁(七十枚, 去皮) 麝香(三分, 碎)

上, 研朱砂、麝香令細末, 後用桃仁、香砂為丸。如其和不斂, 以蜜少許合成訖, 清飲 服一

又云: 療傳尸、骨蒸、□、肺痿、疰、忤、鬼氣、卒心痛、霍亂、吐痢、時氣、鬼魅、瘡癩、赤白暴痢、瘀血、月閉、癰、疔腫、驚癇、鬼忤中人、吐乳、狐狸吃力伽丸 方:

吃力伽(白朮是) 光明砂(研) 麝香 當門子 訶黎勒皮 香附子 沉香(重者) 青木香 腦香(以

上, 研搗篩極細, 白蜜前志沫和為丸, 每朝取井花水服如梧子四丸。於淨器中研破服之, 老不

### 治骨蒸病方第十四(三)

《病源論》云: 夫蒸病有五: 一曰骨蒸, 二曰脈蒸, 三曰皮蒸, 四曰肉蒸, 五曰內蒸。

又云: 有二十三蒸。一胞蒸; 二玉房蒸; 三腦蒸; 四髓蒸; 五骨蒸; 六筋蒸; 七血蒸; 八脈蒸, 脈不調; 九肝蒸, 眼黑; 十心蒸, 舌幹; 十一脾蒸, 唇焦; 十二

肺蒸，鼻幹；十三腎蒸，兩耳焦；十四膀胱蒸，右耳偏焦；十五膽蒸，眼白失色；十六胃蒸，舌下痛；十七小腸蒸，下唇焦；十八大腸蒸，鼻右孔幹痛；十九三焦蒸，亦雜病乍寒乍熱；二十肉蒸；二十一膚蒸；二十二皮蒸；二十三氣蒸，遍身熱。

《玄感傳尸方》云：論曰：凡人唯知有骨蒸名而不知亦有心腎等蒸，云云。

又云：五蒸病者，附骨毒之氣，療之通用生地黃汁，不限日數，此方神驗，云云。

又云：一曰骨蒸者，其根在腎，旦起體涼，日晚即熱，煩躁，寢不能安，食無味，小便赤黃，忽忽煩亂，細喘無力，腰疼，兩足逆冷，手心常熱。蒸盛過，傷內則變為疴，食人五臟。二曰脈蒸。其根在心。日增煩悶，擲手出腳，翕翕思水，口唾即浪言，或驚恐不定，脈數。若蒸盛之時，或變為疴，臍下悶；或暴利不止。

苦參(二兩) 青箱(二兩) 艾葉(一兩) 甘草(一兩，炙)

切，以水四升煮取一升半，分為二分，羊胞中盛，灌下部，若不利，服芒硝方寸匕。

三曰皮蒸。其根在肺。必大喘鼻乾，口中無水，舌上白，小便赤如血。蒸盛之時，胸滿，或自稱得注熱，兩脅下脹，大嗽，徹背連脾疼，眠寐不安。或蒸毒傷臟，口內唾血。急與芒硝一兩，日不過三，服之訖，冷水浸手，以熨脅間及腋上，自下第三脅間下腋下空中七壯灸之。

四曰肉蒸。其根在脾。體熱如火，煩躁無汗，心腹臃脹，食即欲嘔，小便如血，大便秘澀。蒸盛之時，身腫目赤，寢臥不安。

水一 任意

曰肉蒸，亦名血蒸。所以名內蒸者，必外寒而內熱，把手附骨而肉熱甚。其根在五臟。其人必因患後得之，骨肉自消，飯食無味，或皮燥而無光澤。蒸盛之時，四肢漸細，足趺腫起。上 必

又云：主丈夫因虛勞損，夢泄、盜汗、小便餘瀝、陰濕弱欲成骨蒸者，名曰勞極，黃耆大補

黃耆(三兩) 生薑(三兩) 人參(三兩) 大棗(二十枚, 擘) 牡蠣(二兩) 夕藥(三兩) 桂 兩) 橘皮(三兩) 磁石(三

凡十四味, 切, 以水一斗二升煮取三升, 絞去滓, 分溫三四服, 服如去八九裡, 複取微潤, 又云: 主骨蒸、肺痿、手足煩熱兼湯或不能食, 蘆根飲方:

蘆根(切, 十兩) 麥門冬(十兩, 去皮) 地骨白皮(十兩) 生薑(十兩, 切) 茯苓(五兩)

兼服石, 人骨中寒、虛脹痛者, 加吳茱萸八兩。

凡六味, 切, 以水二斗煮取八升, 絞去滓, 分溫五服, 晝三服夜二服。忌如藥法。

又云: 主骨蒸、肺痿、四體煩熱不能食, 口乾者, 麥門冬飲方:

麥門冬(三升, 去心, 生者二升) 地骨白皮(二升) 小麥(一升)

凡三味, 以水一斗三升, 先煮小麥取一升, 去麥門二味, 更煮取三升, 絞去滓, 分溫三服, 又云: 小龍膽丸療骨蒸身熱, 手足煩, 心中懊懣羸瘦不能食方:

龍膽(五分) 黃連(去毛) 夕藥 甘草 黃柏 大黃 黃芩 人參 梔子仁(各四分)

凡九味, 搗篩, 蜜丸, 飲服三丸, 丸如梧子, 稍加, 以知為度, 日二三服, 忌如法。

又云: 骨蒸之病, 無問男女, 特忌房室、舉動勞作, 尤不宜食陳臭鹹酸難消粘食, 牛、馬、並不並

又云: 主骨蒸 癰氣等灸方:

兩肩井、上廉、下廉, 灸七壯。

又方: 夾臍兩旁各相去一寸二分, 兩乳下一夫肋間。灸如前法。

《廣濟方》療骨蒸單方: 肺氣每至日晚即惡寒壯熱, 顏色微赤, 不能下食, 日漸羸瘦方:

生地黃(三兩, 切) 蔥白(二兩, 切) 香豉(二兩) 童子小便(二升) 甘草(二兩, 炙)

上，地黃等於小便中浸一宿，平晨煎兩沸，絞去滓，澄去澱，取一升二合，分溫二服。忌食

又云：療瘦病方：

靈天蓋（一大兩，死人頂骨）麝香（半臍）桃仁（一大抄，去皮）生朱砂（一兩半，光明者）

上五味，各別搗篩訖，然後總和合調，每晨空腹以小兒小便半升，和散方寸一七服。忌生血

《廣利方》理骨節熱積漸黃瘦方：

鱉甲（六分，炙）知母（四支）大黃（六分）蔥白（五莖）豉（十二分）桑根白皮（八分）

切，以童子小便一大升三合煎取八合，去滓，食後良久分溫三服，服相去如人行七八裡。頻

又方：大黃四分，切，以童子小便五合煎取四合，去滓，空腹分溫兩服，服相去如人行四五

#### 治肺痿方第十五（四）

《病源論》云：肺主氣，為五臟上蓋。氣主皮毛，故易傷於風邪。風邪傷於肺臟，而血氣虛，氣，能咳

《廣利方》療肺痿唾膿血腥臭，連連嗽不止，漸將羸瘦，形容枯 方：

紫菀頭（二十一枚，鬚子充）桔梗（十二分，微炙）天門冬（八分）茯苓（十二分）生百合

切，以水二大升煮取九合，食後良久分溫三服，服如人行五六裡，進一服，要利，加芒硝八

《玄感傳尸方》主肺痿咳嗽，上氣不得臥，多粘唾等瀉肺湯方：

葶藶子（三兩，微火熬令紫色，搗如泥之）大棗（二十枚，破）桑根白皮（三兩，切）

凡三味，以水三升煮棗及桑皮，取一升，去滓，納葶藶子泥如彈丸許，攪令消散，更煮三分 生冷

又云：肺痿、骨蒸、氣，若吐血、聲破，或多唾、或口乾兼渴不能食，單服小便方：

單服自身及他人小便百日即瘥。日四服，一服一升。

《集驗方》治肺痿咳吐涎沫不止，咽燥而不渴方：

生薑(五兩) 人參(三兩) 甘草(四兩，炙) 大棗(十五枚，擘)

凡四物，以水七升煮取三升，分三服。(今按：《千金方》：甘草三兩，大棗十枚。)

## 卷第十四

## 治卒死方第一

《病源論》云：卒死者，由三虛而遇賊風所為也。三虛，謂乘年之衰，一也；逢月之空，二也；失時之和，三也。人有此三虛，而謂為賊風所傷，使陰氣偏竭於內，陽氣阻隔受於外，二氣壅閉，故暴絕如死。若腑臟氣未竭者，良久乃蘇。

《葛氏方》治卒死，或先有病痛，或居常倒仆奄忽而絕，皆是中惡。治之方：

令二人以衣壅口，吹其兩耳，極則易人，亦可以竹筒吹之，並側身遠之，莫臨死人上。

又方：以蔥葉針其耳，耳中、口中、鼻中血出者莫怪，無血難治，有血是治候也。

又方：以綿漬好苦酒中，須臾出，置死人鼻中，手按令汁入鼻中，並持其手足莫令驚。

又方：以人小便灌其面數回，即能語，此扁鵲法也。

又方：末皂莢如大豆，吹其兩鼻孔中，遷則氣通。

又方：搗女青屑以重一錢匕，開口納喉中，以水若酒送之，立活。

又方：灸臍中百壯。

又方：灸其頤下宛宛中名承漿十壯。

又方：灸心下一寸。

《集驗方》治卒死方：

取牛馬矢汁飲之，無新者，水和乾者取汁。

又方：取灶突中墨如彈丸，漿水和飲之，須臾三四服之。

又方：取梁上塵如大豆粒，著竹筒中吹鼻中，與俱一時吹之。

又方：灸臚中穴。

又方：取竹筒吹其兩耳，不過三。

《新錄方》治卒死方：

韭根搗取汁，服六七合。

又方：桃白皮，切，一升，水二升，煮取八合，一服之十裡，久不瘥，更服之。

《僧深方》治卒中惡雷氏千金丸方：

大黃(五分) 巴豆(六十枚) 桂心(二分) 朴硝(三分) 乾薑(二分)  
凡五物，治下篩，和白蜜治三千杵，服如大豆二丸，老小以意量之。

《枕中方》治卒忤惡鬼魍魎欲死者，書額上作“鬼”字即愈。

《龍門方》療卒死方：

取繩圍死者臂腕，男左女右，以繩當大椎伸繩向下，當繩頭灸脊上五十壯。

又方：糞汁灌鼻。

又方：以蔥黃心刺鼻中入七八寸，男左女右，立驗。

又方：搗韭汁灌鼻即活。

又方：桂屑著舌下即活。

## 治中惡方第二

《病源論》云：中惡者，是人精神衰弱，為鬼邪之氣卒中之也。其狀卒然心腹刺痛，悶亂欲

《廣濟方》云：卒中惡心腹刺痛去惡氣方：

麝香(一分，研) 生犀角(二分) 青木香(二分) 為散，空腹以熱水服方寸匕，立愈。

《范汪方》治卒死，及心痛腹滿，魘忤中惡三物備急丸方：

巴豆(一分，去心皮) 大黃(二分) 乾薑(二分)

凡三物，共搗巴豆，治合丸，以蜜丸如大豆，有急取二三丸，以水和服之。口噤者絞開令藥

又方：取杯水，以刀三七刺中，飲之良。

《集略方》備急散，治卒中惡，心痛腹滿，欲吐短氣方：

大黃(二兩，金色者) 桂心(四分) 巴豆(一百枚)

凡三物，治合下篩，取一錢，以水七合服之。

《千金方》治卒死中惡方：

取牛馬屎汁飲之，無新者，水和乾者亦得。

又方：蔥心黃刺鼻孔中，血出愈。

又方：灸兩脅下。

又方：灸胃脘十五壯。

《集驗方》治中惡方：

大豆二七枚，以雞子中黃、白酒半升合和，頓服之。

又方：用釜底墨、鹽三指撮，和水服之。(《醫門方》同之。)

又方：以度度其兩乳中央，屈之從乳頭向後肋間，灸度頭，隨年壯。

又方：灸胃脘五十壯。

《廣利方》療中惡客忤垂死方：

麝香錢重，研，和醋二合服之，即瘥。

《葛氏方》華佗治卒中惡短氣欲死者方：

韭根(一把) 烏梅(十枚) 茱萸(半升)

以勞水一斗煮之，以病患櫛納中三沸，櫛浮者生，沉者死。煮得三升飲之。

又方：灸足兩拇指上甲後叢毛中各十四壯即愈。

《新錄方》治卒中惡方：

豉(一升) 鹽(七合) 水(四升)

煮取一升二合，分再服。

又方：桃白皮，切，一升，水二升，煮取八合，一服之。

又方：生菖蒲根，切，三升，搗絞取汁，服四五合。

又方：酒服桃仁末方寸匕。杏仁末亦佳。

又方：伏龍肝末，水服二方寸匕。

又方：取竹木中蟲屎，水服方寸匕。

又方：鹽一升，水二升，煮臨消二服，取吐。

### 治鬼擊病方第三

《病源論》云：鬼擊者，謂鬼厲之氣擊著於人也。得之無漸，卒著如人以刃旁刺狀，胸脅腹鬼觸免，重者多死也。

《葛氏方》治鬼擊病方：

以淳苦酒吹納兩鼻孔中。

又方：灸臍上一寸七壯。

又方：灸鼻下人中一壯，立愈。不愈可加壯數也。

又方：灸鼻。

又云：治諸飛尸鬼擊走馬湯方：

巴豆(二枚) 杏仁(二枚)

合綿裹椎令碎，投熱湯二合，中指捻令汁出正白，便與飲之。如食頃下便瘥，老小量之。

《僧深方》治鬼擊方：

鹽一升，水二升和之，攪令□作汁，飲之令得吐則愈，良。

《新錄方》治鬼擊病方：

搗薤汁灌鼻中如杏仁許，須與瘥好。

《千金方》治鬼擊病方：

艾如鴨子大三枚，水五升，煮取二升，頓服之。

又方：吹酢少許鼻中。

又方：灸臍上一寸七壯。

又灸臍下一寸三壯。

#### 治客忤方第四

《病源論》云：卒忤者，亦名客忤，謂邪客之氣，卒犯忤人精神也。此是鬼厲之毒瓦斯、中惡

《葛氏方》：客忤死者，中惡之類也，喜於道間門外得之，令人心腹絞痛，脹滿，氣衝心胸

以水漬粳米，取汁一二升飲之，口已噤者，以物強發，納之。

又方：銅器若瓦器盛熱湯，先以衣三重藉腹上，乃舉湯器著衣上，湯轉冷者去衣，器親肉，又方：搗書墨，水和服一錢七。

又方：以繩橫度其人口，以度度臍，去四面各一處，灸各三壯，令四火俱起。

又方：灸鼻下人中三十壯，令切鼻柱下。

又方：橫度口中，折之，令上頭著心下，灸下頭五壯。

又云：已死者搗生菖蒲根，絞取汁含之，立愈。

《千金方》治客忤方：

鹽八合，水三升，煮取一升半，分二服，得吐即愈。若小便不通，筆頭七枚燒末，水和服之。

又方：灸巨闕百壯。

《范汪方》治客忤方：

搗牛子矢半杯，以酒三升煮服之。

《新錄方》治客忤方：

搗生艾心，取汁，灌口中五合。

又方：水浣甑帶服之。

## 治魘不寤方第五

《病源論》云：人睡眠，則魂魄外游，為鬼所魘，屈其精神，弱者魘則久不得寤，乃至氣暴。

《集驗方》治卒魘欲死方：

搗生韭汁灌鼻孔中，劇者並灌兩耳。

《徐伯方》治魘喚不寤方：

取蔥葉針鼻中，慎勿火照。

《葛氏方》云：臥魘不寤，勿以火照之，照之殺人。但痛嚙其踵及足拇指甲際，而多唾其面。

末皂莢，以管吹納兩鼻孔中，即起。已三四日猶可吹之。

又方：末灶中黃土，吹納兩鼻孔中。

又方：取韭菜搗，以汁吹其鼻孔中，冬月掘根可絞。

又方：以筆毛刺鼻孔，男左女右，可展轉進之。

又方：以牛若馬臨魘人上二百息，青牛尤佳。

又方：末菖蒲吹鼻中，末桂納舌下。

又方：令一人坐頭首，一人於戶外呼病者姓名，坐人應曰人諾，在便即得蘇也。  
(今按

《救

又云：喜魘及惡夢者方：

枕真射香一子於頭邊。

又方：帶雄黃，男左女右。

又方：作犀角枕佳。

又方：以虎頭為枕。

又方：以青木香納枕中，並帶之。

《千金方》治魘不寤方：

雄黃如棗大，系左腋下，令人終身不肯魘。(《集驗方》同之。)

又方：伏龍肝末，吹鼻中。

《養性志》云：人魘勿燃火喚之，魘死不疑。暗喚之，吉，但得遠喚之，不得近而急喚，喜

《救急單驗方》療魘死方：

引牛臨鼻，少時即活。

又方：嚙其足拇指爪甲際，活。

《范汪方》治魘死符法，魘死未久故可活方：

書此符燒令黑，以少水和之，置死人口，懸鏡死者耳前，擊鏡呼死人，不過半日即生。“□□”丹書之。

《新錄方》若斃不悟者方：酒服髮灰一撮許。

又方：搗菟根莖，取汁一升服之。

## 治尸厥方第六

《病源論》云：尸厥者，陰氣逆也。由陽脈卒下墜，陰脈卒上升，陰陽離居，營衛不通，真如

《葛氏方》云：尸厥之病，卒死而脈猶動是也。  
以管吹其左耳，自極三過，複吹右耳三過，即起。

又方：搗菖蒲以如棗核大，著耳舌下。

又方：灸鼻下人中七壯。

又方：灸臆中穴二七壯。

又方：灸陰囊下去大孔一寸百壯，若婦人者灸兩乳之中間。

又方：以菖蒲屑著鼻兩孔中，吹之令入，以桂屑著舌下。雲扁鵲治楚王法也。  
(以上二方《

《集驗方》治厥死如尸，不知人，心下餘氣，扁鵲灸法：

以繩圍病患臂腕，男左女右，伸繩從大椎上度下之，灸繩頭脊上五十壯。

《范汪方》治尸厥方：

以梁上塵如豆者著筒中，吹鼻中與耳，同時吹之。

又方：生韭汁灌口中。

《新錄方》治尸厥方：

取蔥白一升，水二升，煮取一升，頓服之。

又方：酒服桃仁末方寸匕。

《救急單驗方》尸厥死方：

灸兩足大指甲後叢毛內七壯。華佗云：二七壯。

## 治溺死方第七

《病源論》云：人為水所浸溺，水從孔竅入，灌注腑臟，其氣壅閉，故死。若早拯救得出，又云：經半日及一日，猶可活；氣已絕，心上暖亦可治之。

《短劇方》治溺水死已經二宿者可活方：

搗皂莢作末，以綿裹，納死人下部中，須臾牽出，即活也。

又云：治溺水死方：

以灶灰布著地，令濃五寸，以甑倒覆灰上，以溺人覆伏甑上，口中水當出也，覺水出，複更小時

又方：令二健人抱溺人，倒臥瀝溺人，水出盡便活也。

《葛氏方》：溺死一宿者尚可活。治之方：

倒懸死人，以好酒灌其鼻，立活。（《龍門方》同之。）

又云：身尚溫者，取灶中灰二石餘埋人，從頭至足，即活。

又方：便脫暖釜覆之，取溺人伏其上，腹中水出便活。

《千金方》治落水死方：

酢灌鼻。

又方：裹鍛石納下部中，水盡出即活。

又方：但埋死人暖灰中，頭足俱沒，唯開七孔。

《錄驗方》治溺死方：

灸臍中。

《集驗方》治溺水死方：

熬沙以覆死人，使上下有沙，但出鼻口，中沙溫濕，須易之。

## 治熱死方第八

《病源論》云：夏月炎熱，人冒涉途路，熱毒入內，與五臟相並，客邪熾盛，郁瘀（依倨反）擊，真

《葛氏方》凡中熱死，不可使卒得冷，得冷便仍死矣。治之方：

以泥作●。繞人臍，使三四人更溺其中。

又方：亦可屈草帶，亦可扣瓦碗底若脫車，以著人臍上，取令溺，不得流去而已，此道又方：

乾薑、橘皮、甘草末，少少納熱湯中，令稍稍咽，勿頓多，亦可煮之。

《短劇方》治中熱方：

取路上熱塵土，以壅其心上，小冷復易之，氣通乃止。

又方：偃臥人，以草帶圍臍上，令人溺臍中即。

又方：濃煮蓼，飲之至一二升，良效。

《千金方》治熱方：

張死人口令通，以暖湯徐徐灌口中，小舉死人頭身，令湯入腸，須臾即蘇。

又方：灌地漿一杯即愈。

又方：抱枸子若雞，著心前熨之。

又方：地黃汁一杯，服之。

又方：但以熱土及熬灰土壅其心上，佳。

## 治凍（東貢反）死方第九

《病源論》云：人有在於途路，逢淒風苦雨，繁霜大雪，衣服沾濡，冷氣入臟，致令陰氣閉

又云：凍死一日，猶可治，過此則不可治也。

《葛氏方》治冬天墮水，凍四肢直，口噤，才有微氣方：

以大器多熬灰，使暖，囊盛，以薄甚心上，冷復易。心暖氣通，目則轉，口乃得開。溫酒《千金方》、《救急單驗方》皆同之。）

### 治自縊死方第十

《病源論》云：人有不得意志者，多生忿恨，往往自縊，以繩物系頸，自懸掛致死，呼為自縊。若覺早，雖已死，徐徐捧下，其陰陽經絡雖暴壅閉，而臟腑真氣故有未盡，所以猶可救療，故有得活者。若見其懸掛，便忽遽截斷其繩，舊云則不可救。此言氣已壅閉，繩忽暴斷，其氣雖通，而奔迸運悶故，則氣不能還，即不得複生。

又云：自經死，且至暮，雖已冷，必可治；暮至旦，則難治。此謂其晝則陽氣盛，至(其)氣

又云：夏則夜短又熱，則易治。

又云：氣雖已斷，而心微溫者，一日以上，猶可治。

又方：用衣覆其口鼻，兩人吹其兩耳即生。

《短劇方》治自縊死方：

旁人見自經者，未可輒割繩，必可登物令及其頭，即懸牽頭髮，舉其身起，令繩微得寬也；別使一人，堅塞兩耳，勿令耳氣通；又別使一人，以蔥葉針其鼻中，吹令通；又別使一人，嚙死人兩踵根，待其蘇活乃止也。

又方：治自經死，慎勿割繩也。繩卒斷，氣頓泄去便死，不可複救也。徐徐抱死人，漸漸揉之，取血，

《千金方》治自經死方：

凡自經死，勿截繩，徐徐抱解之。心下尚溫者，氈毼覆口鼻，兩人吹其兩耳。  
（《救急單驗》）

又方：藍青汁服之。

又方：梁上塵如大豆，各納筒中，四人各捉一筒，同時吹兩耳兩鼻即治。

又云：五絕方：一曰自經，二曰牆壁，三曰溺水，四曰魘魅，五曰產乳絕。皆以半夏一兩，《集驗方》治自經死方：搗皂莢、細辛屑，取如胡豆，吹兩鼻孔中止。單用皂莢亦好。

《葛氏方》云：自經死，雖已久，心下尚微溫，猶可治也。治之方：

末皂莢，以蔥葉吹納其兩鼻孔中。

又方：以蘆管吹其兩耳，極則易人，取活乃止。若氣通者，少以桂湯稍稍咽，徐徐乃以少少

《龍門方》療自經死方：

皂莢末如胡豆許，吹兩鼻中，嚏即活。

## 治注病方第十一

《病源論》云：凡注之言住也，謂邪氣俱住人身內，故名為注。此由陰陽失守，經絡空虛，端

《僧深方》云：西王母玉壺赤丸，備急治尸注卒惡水陸毒螫（丑略反）萬病方：

武都雄黃（一兩，赤如雞冠）八角大附子（一兩，炮，稱）藜蘆（一兩）上丹砂（一兩，不稱之。一方有

凡六物，悉令精好。先治巴豆 3 千杵；次納礬石，治 3 千杵；次納藜蘆，治 3 千杵；次納雄黃，治 3 千杵；次納附子、治 3 千杵；次納白蜜，治 3 千杵；若不用丹砂而納真朱 2 兩，勿令泄氣。

方別 乃更 無雲 治萬

腹以下病者，宿勿食，明旦服二丸。不知者，飲暖米飲以發之令下，下不止飲冷水飲止之。

病在膈上吐，膈下者下，或但噫氣而愈，或食肉不消，腹堅脹，或痛。服一丸立愈。

風疝、寒疝、心疝、弦疝，每諸疝發腹中急痛，服二丸。

積寒熱老痞、蛇痞，服二丸。

腹脹不得食飲，服一丸。

卒大苦寒熱往來，服一丸。

卒關格，不得大小便欲死，服二丸。

瘕結，服一丸，日三服。取愈。若微者射丸甚良。下利重下服一丸便斷。或複天行，下便

瘡未發服一丸，已發服二丸便斷。

小兒百病痞，寒中及有熱，百日半歲者，以一丸如黍米，著乳頭與服之；一歲以上服如麻子亦

傷寒軟（絡代反，勞也）色及時氣病，以溫酒服一丸，濃覆取汗即瘥，若不汗複酒服一丸，要苦淋路

婦人產生餘疾，及月水不通，及來往不時，服二丸，日二。

卒霍亂，心腹痛，煩滿吐下，手足逆冷，服二丸。

注病，百種病不可名，將服二丸，日再。

若腹中如有蟲欲鑽脅出，狀急痛，一止一作，此是風氣，服二丸。

若惡瘡不可名 疥疽，以膏若好苦酒和藥，先鹽湯洗瘡去痂，拭令燥，以藥塗之即愈。

惡風游心不得氣息，服一丸即愈。

耳出膿血汁及卒聾，以赤□裹二丸，塞耳孔中即愈。

癰腫瘞（昨示反）癰（音節）瘰癧及欲作，以苦酒和藥塗之。

齒痛，以小丸綿裹著齒孔中咋之。

若寒熱往來，服二丸。

若蛇蝮蜂蠍螫所中傷也，及犬狂馬所咋，以苦酒和塗瘡中，並服二丸即愈。

卒中惡欲死，不知人，以酒若湯水和二丸，強開口灌喉中，捧坐令下。

若獨宿止林澤之中若塚墓間，燒一丸，百鬼走去不敢近人。

癖飲、留飲、痰飲，服一丸，以臘和一丸如彈丸。著絳囊中以系臂，男左女右。山精鬼魅皆中溪水毒，服二丸。

已有瘡在身，以苦酒和三四丸塗瘡上。

憂患之氣結在胸中，苦連噫及咳，胸中刺痛，服如麻子三丸，日三愈。

婦人胸中若滯氣，氣息不利，小腹堅急，繞臍絞痛，漿服如麻子一丸，稍增之如小豆。

心腹常苦切痛及中熱，服一丸如麻子，日三服，五日愈。

男女邪氣，鬼交通，歌哭無常；或腹大經絕，狀如妊娠，皆將服三丸如胡豆大，日三夜一。

又將

腹中三蟲，宿勿食，明平旦進牛羊肉，炙三臠，須與便服三丸如胡豆，日中當下蟲。過日中

小兒寒熱，頭痛身熱及吐，一服一丸如麻子，小兒瘦，丁奚不能食，食不化，將服二丸

又苦酒和如飴塗，塗兒腹良。

風目赤或癢，視漠漠，淚出爛，以蜜解如飴，以塗注目。

頭卒風腫，以苦酒若膏和塗之即愈。

風頭腫以膏和塗之，以絮裹之。

若為蝮毒所中，吐血，腹內如刺，服一丸如麻子，稍益至胡豆；亦以塗鼻孔中；以膏和通塗

治鼠，以脂和塗瘡，取駁舌狗子舐之即愈也。

《千金方》治一切注無新久方：

先仰臥，灸兩乳兩邊斜下三寸第二肋間，隨年壯，可至三百壯。

又，心下三寸，灸六十壯。

又，兩手大指頭，各灸七壯。

又云：十注丸主十種注：氣注、勞注、鬼注、冷注、生人注、死人注、尸注、水注、食注、雄黃（一兩）巴豆（二兩）人參（一兩）甘草（一兩）本（一兩）桔梗（一兩）附子（一十味，空腹服一丸如小豆，日二，以知為度，有驗

《葛氏方》云：注病即是五尸中之尸注，又狹諸鬼邪為害也。大略令人寒熱淋瀝，沉沉嘿嘿 此疾

桃核仁五十枚，研之。以水一斗，煮取四升，一服盡當吐病，病不盡，二三日更作，若不吐

《集驗方》治注病方：

取桑根白皮切二斗，曝燥，燒作灰，湯淋取汁，浸小豆二斗，如此取灰汁盡，蒸豆熟作 羊鹿

又云：治鬼注病相染易盡門方：

獺肝一具乾之，下篩，水服方寸匕，日三，神方。（《千金方》同之。）

《極要方》療惡疰，入心欲死，無問遠近年月皆愈方：

安息香半兩為末，酒服即愈。（《救急單驗方》同之。）

又云：療疰氣發無恆處方：

白芥子，搗為丸服之；又酢和塗，隨手為驗。

《龍門方》療惡疰入心欲死方：

獨頭蒜一枝，書墨如棗大，並搗以醬汁一小合，頓服，立瘥。

又方：取鹽如雞子，布裹燒赤末，酒服吐即驗。

又方：取椒，布裹，薄布疰上，以熨斗盛火熨之，令汗出驗。

《新錄方》云：惡疰方：

鹽五合、灶突墨三合，水三升，煮鹽消去滓，頓服，吐瘥。

又方：桃枝切三升，水四升，煮取一升六合，二服。

《范汪方》治尸注毒痛往來方：

燒髮灰 杏子中仁（熬令紫色）

凡二物，分等，膏和，酒服梧子三丸，日三。

《救急單驗方》療惡疰方：

阿魏藥服二分，和酒立瘥。

又方：桂心三兩，酒三升煮取一升，分再服瘥。

## 治諸尸方第十二

《病源論》云：人身內自有三尸諸蟲，與人俱生，而此蟲忌惡，能與鬼靈相通，常接引外邪引腰

《葛氏方》云：雖有五尸之名，其例皆相似，而小有異者：一飛尸（變作無常；）二遁尸（聞

又云：凡五尸，即是身中尸鬼接引外邪，共為病害。經術其有消滅之方，而非世徒能用，今

雄黃（一兩） 大蒜（一兩）

搗令相和如彈丸者，納二合熱酒中，服之須臾瘥。未瘥更一服便止。有尸疹（敕忍反）者常宜

又方：桂、乾薑分等，末之。鹽三指撮，熬令青，末合，水服二方寸七。

《新錄方》治飛尸方：

灸脊中及兩旁相去三寸，各五十炷。

又方：桃白皮切二升，水四升，煮取一升六合，分三服。

又云：治遁尸方：

牛蹄下土三指撮，酒一盞下。（亦治風尸。）

又方：鹽墨湯頓服。

又方：炒艾熨之。

又方：熬艾以青布裹，更熨。

又方：熬大豆裹，更熨。

又云：治沉尸方：

灸太倉（中管也）七壯。

又灸乳下一寸，七壯。

又方：髮灰、杏仁、蜜和丸如梧子，一服七丸，日二。

《千金方》治遁尸尸注方：

桂心（一兩） 乾薑（二兩） 巴豆仁（二枚）  
三味，下篩，上酢和，和如泥，塗病上，乾即易。

又：芥子薄主遁尸飛尸方：

芥子一升，蒸熟搗下篩，以黃丹二兩攪之，分作兩分，疏布袋盛之，更蒸使熟，薄痛上，當

### 治諸瘡方第十三

《病源論》云：夏日傷暑，秋必病瘡。瘡其人形瘦皮栗，以月一日發，當以十五日愈。設不

《通玄》云：瘡病多種，各不同形，有溫瘡，有寒瘡，有（於禁反）瘡，有勞瘡，有鬼瘡。宿汁，《集驗方》云：黃帝曰：夫□（音皆）瘡皆生於風，夏傷於暑，秋為痰瘡。間日瘡先寒而後熱，後熱也。其但熱而不寒者，夫瘡必從四末始，先其發時一食頃，用細左索繩堅束其手足十指，過時乃解。

又方：取大蜘蛛一枚，納蘆管中，密塞管口，繩系以縮頸，過發時乃解去。（《葛氏方》同之。）

又方：桃葉二七枚，安心上，艾灸葉上十四壯。（《僧深方》同之。）

《千金方》治瘡方：

未發前，抱雄雞一頭著懷中，時時驚動，令雞作大聲，無不瘥。

又方：故鞋底去兩頭，燒灰，井花水服之。

又方：未發前預灸項大椎尖頭，漸灸過時止。

《葛氏方》治瘡病方：

又方：多煮豉作湯，飲數升，令得大吐便斷。

又方：破一大豆去皮，書一片作“日”字，一片作“月”字。左手持“日”右手持“月”，吞之立愈。向日服，勿令人知之。

又方：灸螿甲搗末，酒服方寸匕，至發時令三服，兼用火灸無不斷。

《龍門方》療一切瘡方：

取恆山、甘草等分，搗末和水，服方寸匕。吐即瘥。

又方：取蓮搗末三指撮，以酒和，欲發前服之，驗。

《范汪方》治瘡方：

臨發時，搗大附子下篩，以苦酒和之，塗背上。

《廣濟方》療瘡方：

恆山(三兩)

以漿水三升，浸經一宿，煎取一升，欲發前頓服之。微吐瘥止。無所禁忌。

《短劇方》斷瘡先大寒後大熱者方：

小麥(一升) 淡竹葉(一虎口) 恆山(三兩)

凡三物，以水五升，宿漬，明旦煮取二升半，分三服。

《僧深方》治一切諸瘡無不斷恆山丸方：

大黃(一兩，一方二兩) 附子(一兩，炮) 恆山(三兩) 龍骨(一兩)

凡四物，治合下篩，蜜和，平旦服梧子七丸；未發中間複服七丸；臨發服七丸。若不斷，至後後日複發，更服如此法，甚神良。

《本草經》云：治瘡，煮草汁及生汁服之。

《本草稽疑》云：治瘡，燒貓屎為末，酒服方寸匕。

## 治鬼瘡方第十四

《范汪方》治鬼瘡方：

丹書額言：“戴九天”；書臂言：“抱九地”；書足言“履九江”；書背言：“南有高山，上 有大樹，下有不流之水，中有神蟲，三頭九尾，不食五穀，但食瘧鬼，朝食三千，暮食三百，急急如律令。”書胸言：“上高山，望海水，天門亭長捕瘧鬼，得便斬，勿問罪，急急如律令。”（《產經》同之。）

又云：平旦發者，市死鬼，恆山主之，服藥訖持刀；  
食時發者，縊死鬼，蜀木主之，服藥訖持索；  
日中發者，溺（奴歷反）死鬼，大黃主之，服藥訖持盆水；  
晡時發者，舍長鬼，麻黃主之，服藥訖持磨衡；  
黃昏發者，婦人鬼，細辛主之，服藥訖持明鏡；  
夜半發者，厭死鬼，黃芩主之，服藥訖持車軟；  
雞鳴發者，小兒鬼，附子主之，服藥訖持小兒墓上折草木；  
凡七物，各一分，治下篩，發時加所主病藥一分，當發日從旦至發時，溫酒服方寸匕，三服服訖，必持所主病物，甚良，有效。

又云：平旦作者，客民鬼也，先作時，令病者持衣如辭去，言欲遠出立愈；  
食時作者，客死鬼也，先作時，令病者辭言欲歸之，大道上橋梁下逃之；  
禺中作者，市死鬼也，先作時，令病者因結械，北向吐營以支以□。  
日中作者，溺死鬼也，先作時，令病者取盆水中著庭，南向坐營□；  
日跌作者，亡死鬼也，先作時，令病者人言吏捕汝庭中；  
晡時作者，自經死鬼也，先作時，令病患當棟下臥以繩索 病者頭；  
日入作者，人奴舍長死鬼也，先作時，令病者磨碓間逃之；  
黃昏作者，盜死鬼也，先作時，令病者逾去遠亡，無令人知其家；  
人定作者，小兒鬼也，先作時，病者取小兒墓上折草木立愈；  
夜過半作者，囚死鬼也，先作時，取司空械笞，令病者持之，因從出可榜笞汝者；  
夜半作者，寒死鬼也，先作時，令病者溫衣營以□，持桃枝飲食逃內中，無人知見紫此次上；  
雞鳴作者，乳死鬼也，先作時，令病者把（古老反）席之，菇目應令持桃枝營以□。

《如意方》治鬼瘧方：

發日早旦，取井花水丹書額作“天獄”字；書胸作“胸獄”字；書背作“背獄”字；左手作 似 急

又方：計發日，今夕可食，雞鳴起，著衣履 屐，隨意出戶，脫之途，出勿顧，入幽閑隱 斷也

《通玄》云：鬼瘧者，或間日，或頻日發作無時者，此為鬼瘧，任避之，及用飲食送遣，如

恆山(三兩) 豉(一升) 秫米(百粒) 蒜(七斤)  
研，清酒二升，漬之一宿，早旦服之。得大吐則止。

### 治溫瘧方第十五

《病源論》云：夫溫瘧與寒瘧安舍？溫瘧者，得之冬，中於風寒，氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，骨髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出。此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣。衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣。故先熱而後寒，名曰溫瘧。

《通玄》云：溫瘧者，吸吸發熱而少寒，心悶面赤發自心方：

石膏(半斤，研，綿裹) 知母(三兩) 地骨皮(三兩) 玄參(三兩) 淡竹葉(一升)  
豬苓(水九升，煮取三升，分三服，相去如六七裡。

### 治寒瘧方第十六

《病源論》云：寒瘧，此由陰陽相並，陽虛則陰勝，陰勝則寒，發於內而並於外，所以內外俱寒，故病發但戰慄而鼓頷頤也。

《通玄》云：寒瘧者澀澀而惡寒毛豎，發則引溫而少熱方：

朱砂(四分，研) 雄黃(五分，研) 人參(四分) 恆山(五分) 牡蠣(四分，熬)  
蜜丸如梧子，一服七丸，日再，空腹服之，用粥飲之。

### 治痰實瘧方第十七

《病源論》云：謂病患胸膈先有停痰結實，因感瘧病，則令人心下支滿，氣煩嘔之。

《范汪方》治瘧痰實不消恆山湯方：

恆山(六分) 甘草(四分) 知母(三分) 麻黃(三分) 大黃(四分)  
凡五物，切，以水五升，煮取二升，分三服。至發時令盡。

## 治勞瘡方第十八

《病源論》云：凡瘡積久不瘥，則表裡俱虛，客邪未散，真氣不復，故疾雖系（暫）間，小勞

《集驗方》治勞瘡積時不斷，眾治無效，此方治之：

生長大牛膝一大虎口，切，以水六升，煮取二升，分再服。第一服取未發前一食頃；第二服

《葛氏方》云：老瘡久不斷者方：

末龍骨方寸七，先發一時以酒一升半，煮三沸，及熱盡服，溫覆取汗立愈。

又方：炙鱉甲搗末，酒服方寸七，至發時令三服，兼用火灸，無不斷也。

《僧深方》治勞瘡桃葉湯方：

桃葉（十四枚） 恆山（四兩）

凡二物，酒二升，漬一宿，露著中庭，刀著器上，明旦發日凌晨漉去滓，微溫令暖，一頓服

## 治嶂瘡方第十九

《病源論》云：山嶂瘡，此病生於嶺南，帶山嶂之氣也。其狀寒熱休作有時，皆由挾溪源嶺

《耆婆方》治瘡瘡要方：

蜀恆山（三兩） 甘草（二兩） 光明砂（一兩）

三種搗篩，以蜜和丸如梧子，未發前服三丸，發時服二丸，發後服一丸，於後三日更一服，三日慎食。

《錄驗方》治瘡及嶂氣方：

恆山（二兩） 甘草（二兩）

切，以白酒大一升浸一宿，去滓分二服，未發前一服，臨發又一服，任吐。慎生冷、酢滑酒

## 治間日瘧方第二十

《病源論》云：間日瘧，此由邪氣與衛氣俱行於六腑，而有時相失不相得，故邪氣內薄五臟

《集驗方》治瘧或間日發或夜發者方：

秫米(百粒) 石膏(八兩，碎) 恆山(三兩) 竹葉(三兩)  
凡四物，切，以水六升漬藥，覆一宿，明旦煮取取二升，分三服，取未發前一食頃第一服；用餘

《短劇方》斷瘧恆山酒方治 瘧先寒戰動地，寒解壯熱，日日發、間日發並斷方：

鱉甲(一兩) 淡竹葉(切，三升) 恆山(三兩) 甘草(三兩) 久酒(三升)  
凡五物，以酒漬藥刀置上覆頭，安露地，明旦以水七升煮取三升，分五服，未發前令盡。當

## 治連年瘧方第二十一

《范汪方》治連年瘧不瘥牛膝酒方：

牛膝草(一把) 好酒(一升)  
凡二物，牛膝納酒中，漬一宿，明旦分三服。

《錄驗方》恆山湯治瘧十歲二十歲方：

恆山(二兩) 甘草(一兩) 大黃(二分) 桂心(六銖)  
凡四物，切，以恆山酒漬一夜，諸藥以酒三升，水二升，煮取七合，頓服，下吐愈。

《僧深方》治三十年瘧龍骨丸神方：

龍骨(四分) 恆山(八分) 附子(三分) 大黃(八分)  
凡四物，治篩，雞子和，發前服七丸如大豆，臨發服七丸。

《效驗方》治三十年瘧恆山散方：

恆山(五分) 干漆(四分) 牡蠣(二分) 杏子仁(二分)  
凡四物，下篩，酒服方寸七，日三。

## 治發作無時瘧方第二十二

《病源論》云：夫衛氣，一日一夜大會於風府，則腠理開，開則邪入，邪入則病作。當其時所

《葛氏方》治瘧發作無常心下煩熱方：

恆山(二兩) 甘草(兩半) 豉(五合)

以水六升煮取二升，分再服。當快吐仍斷，即飲食。

## 傷寒証候第二十三

《病源論》云：經云：春氣溫和，夏氣暑熱，秋氣清涼，冬氣冰寒，此四時正氣之序也。冬時嚴寒，萬類深藏，君子固密，則不傷受於寒。觸冒之者，乃為傷寒耳。其傷受於四時之氣，皆能為病，而以傷寒為毒者，以其最為殺厲之氣焉。即病者為傷寒；不即病者，為寒毒藏受於肌骨中，至春變為溫病。是以辛苦之人，春夏必有溫病者，皆由其冬時觸冒之所致也。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑。其冬複有非節之暖，名為冬溫之毒，與傷寒大異也。

又云：夫熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆六七日間，其愈皆以十日以上。

《葛氏方》云：傷寒、時行、溫疫，雖有三名，同一種耳，而源本小異。其冬月傷於暴寒，人骨 診候 此，致

《醫門方》云：凡傷寒病五六日而渴欲飲水，水不能多，未宜與也。所以爾者，腹中熱尚少，不能消之，便更為人作病矣。若至七八日大渴欲飲水者，猶當依証而與之，與之勿令極意也。言能飲一斗者與五升。若飲而腹滿小便澀，若喘若噦，不可與之。忽然大汗出者，欲自愈也，人得病能飲水，欲愈也。

## 傷寒不治候第二十四

《葛氏方》云：陽毒病，面目斑斑如錦文，喉咽痛，下膿血。五日不治，死。

陰毒病，面目青，舉體疼痛，喉咽不利，手足逆冷。五日不治，死。

陰毒病，發赤斑，一死一生。

熱病，未發汗而脈微細者，死。

內熱，脈盛躁，發汗永不肯出者，死。

汗雖出，至足者猶死。

已得汗而脈猶躁，盛熱不退者，死。  
汗出而 言，煩躁不得臥，目精亂者死。  
汗不出而嘔血者，死。  
汗出大下利不止者，死。  
汗出而寒不止，鼻口冷者，死。  
發熱而瘧，腰掣縱齒 者，死。  
不得汗而掣縱，狂走不食，腹滿胸背痛，嘔血者，死。  
喘滿 言直視者，死。  
熱不退，目不明，舌本爛者，死。  
咳而衄者，死。  
大衄不止，腹中痛，短氣者，死。  
嘔咳下血，身熱疹(恥刃反)而大瘦削者，死。  
手足逆冷而煩躁，脈不至者，死。  
大不利而脈疹及寒者，死。  
下利而腹滿痛者，死。  
下利，手足逆冷而煩躁不得眠者，死。  
腹滿，腸鳴下利，而四肢冷痛者，死。  
利止，眩冒者，死。  
腹脹，嗜飲食而不得大小便者，死。  
身面黃腫，舌卷身糜臭者，死。  
不知痛處，身面青，聾不欲語者，死。  
目眶陷，不見人，口乾謬語，手循衣縫，不得眠者，死。  
始得使一身不收，口乾舌焦者，死。  
疾始一日，腹便滿，身熱不食者，死；二日口身熱，舌乾者，死；三日耳聾陰縮，手足冷者 溺血  
脈若不數，三日中當有汗，若無汗者死。

《太素經》熱病死候九：

第一汗不出，出不大灌發者死；第二泄而腹滿甚者死；第三目不明，熱不已者死；第四老人嬰兒，熱而腹滿者死；五日汗不出，嘔下血者死；六日舌本爛，熱不已者死；七日咳而趣，汗不出，出不至足者死；八日髓熱者死；九日熱而瘧者死，腰折，德癥，齒噤齡也。凡此九者，不可刺也。

## 避傷寒病方第二十五

《靈奇方》避時氣疫病法：

正月未日夜以蘆炬火照井及廁臼中，百鬼走不入。

又法：正月朔日寅時，用黃土塗門扉，方二寸。

又法：用牛矢塗門戶，方圓二寸。

又法：正月旦若十五日，投麻子、小豆各二七枚入於井中，避一年溫病。

又法：正月旦吞麻子、小豆各二七枚，辟卻溫鬼。

又法：庚辰日，取雞犬毛於門外微燒煙之，避溫疫。

又法：五月十五日日中取井花水沐浴，避邪鬼。

又法：五月戊己日沐浴避病。

又云：使溫病不相易法：以繩度所住戶中，屈繩燒斷。

《醫門方》避溫疫法：

赤小豆五合，以新布五寸裹，納井中不至底，少許，三日漬之。平晨東向，男吞二七女吞

又云：療溫病轉相注易，乃至滅門，旁至外人，無有看服此藥，必不相易方：

鬼箭羽(二兩) 鬼臼(二兩) 赤小豆(二兩) 丹參(二兩) 雄黃(二兩，研，雞冠色者)

搗篩丸蜜，丸如梧子，服一丸，日二三。與病患同床傳衣不相染，神驗。

《千金方》云溫病時行令不相染方：

立春後有庚子日，溫蕪菁菹汁，合家大小並服，不限多少。(《極要方》同之。)

又方：常以月望日，細銼東行桃枝，煮湯浴之。

又方：常以七月七日，合家吞赤小豆，向日吞二枚。

又方：桃樹蠹矢末，水服方寸匕。

《集驗方》斷溫方：

二月旦取東行桑根大如指，懸門戶上，又人人帶之。

《得富貴方》云：欲至病患家，手中作“鬼”字。

《玉菴方》云：屠蘇酒治惡氣溫疫方：

白朮 桔梗 蜀椒 桂心 大黃 烏頭 菝 防風(各二分)

凡八物，細切，緋袋盛，以十二月晦日日中懸沉井中，勿令至泥。正月朔旦，出藥置三升溫裡無

《葛氏方》云：老君神明白散避溫疫方：

白朮(二兩) 桔梗(二兩半) 烏頭(一兩) 附子(一兩) 細辛(二兩)

凡五物，搗篩，歲旦以溫酒服五分七。一家有藥，則一裡無病。帶是藥散以行，所經過病氣

又云：度嶂散辟嶂山惡氣瘴，若有黑霧郁勃及西南溫風皆為疫癘之候，方：

麻黃(五分) 蜀椒(五分) 烏頭(二分) 細辛(一分) 防風(一分) 桔梗(一分) 乾薑(一

凡九物，搗篩，平旦以溫酒服一錢七。

又云：斷溫病令不相染著法：

斷汲水，綆長七寸，盜著病患臥席下。(《集驗方》同之。)

又方：密以艾灸病患床四角各一丸，勿令病患知之。

又方：以鯽魚密置病患臥席下，勿令知之。

又方：以附子三枚，小豆七枚，令女人投井中。

## 治傷寒困篤方第二十六

《葛氏方》治時行垂死者破棺千金湯方：

苦參一兩

咀，以酒二升煮，令得一升半，盡服，當吐毒。(《千金方》同之。)

《本草》蘇敬注云：人屎乾者燒之煙絕，水漬飲汁名破棺湯也，主傷寒熱毒。（今按：《葛氏方》：世人謂之為黃龍湯。）

《耆婆方》治熱病困苦者方：

生麥門冬小一升，去心搗碎，熬，納井花水絞取一升半，及冷分三服，熱甚者吐即瘥。

《集驗方》云：凡除熱毒無過苦酢之物。

《崔禹錫食經》云：梨除傷寒時行，為妙藥也。

《通玄經》云：梨雖為五臟刀斧，足為傷寒妙藥，云云。

### 治傷寒一二日方第二十七

《病源論》云：傷寒一日，太陽受病。太陽者，膀胱之經也，為三陽之首，故先受病。其脈

《葛氏方》云：傷寒有數種，庸人不能別。今取一藥兼治者，若初舉頭痛，肉熱，脈洪起一

蔥白（一虎口） 豉（一升）

以水三升，煮取一升，頓服取汗。（《集驗方》：小兒屎三升。）

又方：葛根四兩，水一斗，煮取三升，納豉一升，煮取升半，一服。

又方：搗生葛根汁，服一二升佳。

《千金方》傷寒時氣溫疫，頭痛，壯熱，脈盛，如得一二日方：

真丹一兩，以水二升，煮得一升，頓服之，覆取汗。

### 治傷寒三日方第二十八

《新錄方》治傷寒溫疫三日，內脈洪浮，頭痛，惡寒，壯熱，身體痛者方：

蔥白（一升） 豉（一升） 梔子（三七枚） 桂心（二兩，無，用生薑三兩）  
以水七升煮取二升，分三服之。

《千金方》治疫氣傷寒三日以後不解方：

以好豉（一升）蔥白（一升）小兒尿（三升）  
煮取二升，分再服，覆令汗，神驗。

### 治傷寒四日方第二十九

《玉菡方》傷寒四日方：

瓜蒂二七枚，以水一升煮取五合，一服當得吐之。

《葛氏方》三四日胸中惡汁欲令吐之：

豉（三升）鹽（一升）  
水七升，煮取二升半，去滓，納蜜一升。又煮三沸，頓服，安臥，當吐之。

### 治傷寒五日方第三十

《范汪方》治傷寒五六日，嘔而利者黃芩湯方：

黃芩（三兩）半夏（半升）人參（二兩）桂心（二兩）乾薑（三累）大棗（十二枚）  
凡六物，水七升，煮得二升，分再服。

《通玄》云：五日外肉涼內熱者瀉之，宜服升麻湯方：

升麻（二兩）黃芩（三兩）梔子（二兩）大青（二兩）大黃（二兩，別浸）芒硝（三兩）  
水八升，煮取二升半，分三服，如不利，盡服之。

### 治傷寒六日方第三十一

《范汪方》治傷寒六七日不大便有瘀血方：

桃仁（二十枚，熬）大黃（三兩）水蛭（十枚）虻蟲（二十枚）  
凡四物，搗篩為四丸，卒服，當下血，不下複服。

### 治傷寒七日方第三十二

《千金方》傷寒吐下後七八日不解，結熱在裡，表裡俱熱，時時惡風，大溫，舌上乾燥而煩

知母(六兩) 石膏(一升) 甘草(二兩) 粳米(六合)  
四味，水一斗二升，煮米熟，去滓，分服一升，日三。

《葛氏方》：若已六七日，熱盛心下煩悶，狂言見鬼欲走者方：

絞糞汁飲數合至一升，世人謂之為黃龍湯，陳久者彌佳。

### 治傷寒八九日方第三十三

《錄驗方》治傷寒八九日腹滿，外內有熱，心煩不安芫(音柴)胡湯方：

母(二兩) 生薑(三兩) 葳蕤(三兩) 芫胡(八兩) 大黃(三兩) 黃芩(二兩) 甘草(一

凡十物，切，以水一斗煮得三升，溫飲一升，日三。

### 治傷寒十日以上方第三十四

《千金方》治傷寒熱病十日以上，發汗不解，及吐下後諸熱不除，及下利不止皆治之方：

大青(四兩) 甘草(二兩) 阿膠(二兩) 豆豉(一升)

四味，以水八升，煮取三升，頓服一升，日三。

### 治傷寒陰毒方第三十五

《集驗方》云：陰毒者，或傷寒初病一二日便成陰毒，或服湯藥六七日以上至十日變成陰毒。身重背強，腹中絞痛，喉咽不利，毒瓦斯攻心，心下強，短氣不得息，嘔逆，唇青面黑，四肢厥冷，其脈沉細緊數，此陰毒侯。身如被打，五日可治，七日不治方。(《醫門方》同之。)

甘草(二分，炙) 升麻(二分) 當歸(一分) 蜀椒(一分) 鱉甲(四分)

凡五物，咀，以水五升，煮取二升半，分三服，行五裡複服，溫覆，中毒當汗，汗則愈，若不汗，病除重服。

### 治傷寒陽毒方第三十六

《集驗方》云：陽毒者，或傷寒一二日便成陽毒，或服藥吐下之後變成陽毒，身重，腰背痛，煩悶不安，面赤狂言，或走，或見鬼，或下利，其脈浮大數，面斑斑如錦，喉咽痛，下膿血。五日可治，七日不可治方(《醫門方》同之：)

甘草(二分, 炙) 當歸(一分) 蜀椒(一分, 去目) 升麻(二分) 雄黃(二分) 桂心(一分)

凡六物, 咀, 以水五升煮取二升半, 分三服, 行五裡須複服, 溫覆手足, 中毒則汗, 汗則解, 不解重作。今世有此病, 此二方實未經用。

### 治傷寒汗出後不除方第三十七

《集驗方》大汗出後, 脈猶洪大, 形如瘡, 日一發, 汗出便解方:

桂心(一兩十六銖) 夕藥(一兩) 生薑(一兩, 炙) 甘草(一兩, 炙) 大棗(十四枚) 麻黃(一兩, 去節) 杏仁(二十三枚)

凡七物, 切, 以水五升, 先煮麻黃再沸, 下諸藥, 煎得一升八合, 服六合。

### 治傷寒鼻衄方第三十八

《千金方》云: 傷寒鼻衄, 腎間有餘熱故也, 熱因衄自止, 不止者方:

牡蠣(十分, 左顧者) 石膏(五分)

上二味, 酒服方寸匕, 先食, 日三四。凡衄亦可用。一方以漿服之。(《集驗方》同之。)

《僧深方》治熱病鼻衄, 多者出血一二斛方:

蒲黃(五合)

以水和, 一飲盡即愈。不瘥別依諸衄方。

又方: 燒牛糞作灰, 服方寸匕。

又方: 以冷水洗佳。

### 治傷寒口乾方第三十九

《集驗方》治傷寒熱病口乾喜唾方:

乾棗(二十枚, 擘) 烏梅(十枚, 碎)

二物, 合搗蜜和, 含杏核大, 咽其汁。

### 治傷寒唾血方第四十

《范汪方》治熱病唾血方：

白茅根一物，搗下篩為散，服方寸匕，日三。亦可絞取汁飲之。

#### 治傷寒吐方第四十一

《集驗方》治傷寒吐虛羸欲死方：

雞子(十四枚)

以水五升煮取二升，乃納豉四合，複煮兩三沸，去豉，分再服。

#### 治傷寒噦方第四十二

《病源論》云：傷寒所以噦者，胃中虛冷故也。

《葛氏方》治傷寒噦不止方：

甘草(三兩) 橘皮(一升)

水五升，煮取一升，頓服之，日三四。

《短劇方》云：春夏時行寒毒傷於胃，胃冷方：

白茅根(切，一升) 橘皮(二兩) 桂心(二兩) 葛根(二兩)

凡四物，以水六升，煮取三升，分三服。

《救急方》云：天行後乾嘔若噦手足冷方：

橘皮(四兩) 生薑(半斤)

上，以水七升煮取三升，分四五服，立驗。

#### 治傷寒後嘔方第四十三

《集驗方》治傷寒後乾嘔不下食，蘆根飲方：

生蘆根(切，一升) 青竹茹(一升) 粳米(三合) 生薑(二兩，切)

以水七升，煮取二升，隨便飲，不瘥重作。

#### 治傷寒下利方第四十四

《葛氏方》治熱病不解而下利困篤欲死方：

大青(四兩) 甘草(二兩) 膠(二兩) 豉(八合)  
以水一斗，煮取三升，分三服盡。更作，日夜兩劑，愈。

又方：以水煮豉一升，梔子十四枚，蔥白一把，取二升，分三服。

又方：龍骨半斤，搗碎，以水一斗煮取五升，使極冷，飲其間或得汗則愈。

### 治傷寒飲食勞複方第四十五

《病源論》云：夫病新瘥，血氣尚虛，津液未復，因即勞動，使成病焉。若言語思慮則勞於

《醫門方》云：論曰：凡溫病新瘥及重病瘥後，百日內禁食豬肉及腸、血、肥魚、油膩，大下痢，醫不能治也。栗、諸果子及堅實難消之物，胃氣尚冷，大利難禁，不下之必死，下之後免，不可不慎也。

病新瘥後，但得食粥糜，寧少食令飢，慎勿飽食，不得輒有所食，雖思之勿與。引日轉久，可漸食獐、鹿、雉、兔肉等為佳。

療熱病新瘥，早起及多食發複方：

梔子十枚，水二升，煎取一升，去滓，頓服之。溫臥令微汗佳。通除諸複。

又方：燒龜甲，末，服方寸匕。(《葛氏方》同之。)

《葛氏方》治篤病新起，早勞及飲食多致複欲死方：

以水服胡粉少許。

又方：燒飯糶末，服方寸匕。

《短劇方》治食勞複方：

葛根五兩，以水五升煮取二升，冷分三服。

《千金方》治食勞方：

杏仁五枚，酢二升，煮取一升，服之取汗。

又方：燒人矢灰，水服方寸匕。

#### 治傷寒洗梳勞複方第四十六

《千金方》云：洗手足複者，飲手足汁一合；梳頭複者，吞頭垢如棗大者一枚。

《千金方》治或因洗手足或流頭勞複方：

取洗手足汁飲一合。

又方：取頭垢如棗大者吞一枚，大者一枚。

《醫門方》云：溫病瘥後當靜臥，勿早起，自梳頭澡洗。但非體勞，亦不可多言語用心使患

又云：若欲令病不發複者，燒頭垢如杏仁大服之。

#### 治傷寒交接勞複方第四十七

《醫門方》云：溫病新瘥，未滿百日，氣力未平複，而已房室，無不死者。（今按：《葛氏方》云：餘勞尚可，女勞多死。）又，療丈夫熱病瘥而交接，發或陰卵腫縮入腹中，絞痛欲死方：

取女人月經赤衣燒末，服方寸匕。

又方：取女人陰上毛燒，飲之極救急。

《僧深方》云：婦人時病，毒未除，丈夫因幸之，婦感動氣泄，毒即度著丈夫，名陰易病也 四枚

《葛氏方》云：男女溫病瘥後雖數十日，血脈未和，尚有熱毒，與之交接即得病，名曰陰易殺人。甚於時行，宜急治之。令人身體重，小腹急熱上腫胸，頭重不能舉，眼中生□，膝脛拘急欲死方。取婦人褲，親陰上者，割取燒末，服方寸匕，日三，小便即利，而陰微腫者，此當愈。得童女褲亦良，若女病亦可用男褲。

又方：刮青竹茹一斗，以水二升，煮令五六沸，去滓，一服。亦通治諸勞複。

《千金方》治交接勞方：

取所與交婦人衣，覆男子上一食久。《葛氏方》、《醫門方》同之。

又方：取女人手足爪十枚、女人中衣帶一尺，燒，以酒亦米汁飲之。

### 治傷寒病後頭痛方第四十八

《千金方》云：傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方：

服黃龍湯五合，日三。（《集驗方》同之。）

### 治傷寒病後不得眠方第四十九

《病源論》云：大病之後，腑臟尚虛，營衛未生，故成於冷熱。陰氣虛，衛氣獨行於陽，不

《千金方》溫膽（都敢反）湯療大病後虛煩不得眠，此膽冷故方：

生薑（四兩）半夏（三兩）枳實（二枚）橘皮（三兩）甘草（一兩）竹茹（二兩）六味，水八升煮取二升，分三服之。

《玉箱要錄》云：大病瘥後，虛煩不得眠，眼暗疼懊（烏浩反）方：

豉（七合）烏梅（十四枚）

水四升，先煮梅取二升半，納豉煮取一升半，分再服，無梅用梔子十四枚。

又云：千裡流水（一石，揚之萬過，取二斗）半夏（二兩）洗秫米（一升）茯苓（四兩）

合煮得五升，分五服。

### 治傷寒病後汗出方第五十

《病源論》云：大病之後，複為風所乘，則陽發泄，故令虛汗。

《葛氏方》治大病瘥後多虛汗及眠中汗流方：

龍骨 牡蠣 麻黃根

搗末，雜粉以粉身。

《錄驗方》治大病之後虛汗不可止方：

乾薑（三分）粉（三分）冶合以粉，大良。

《短劇方》治大病後虛汗出不禁方：

粢粉 豉

凡二物，分等，火熬令集，燒故竹扇如掌大，取灰合治，以絹囊盛，敷體，立止，最驗。當

又云：治大病之後虛汗不可止方：

杜仲 牡蠣

凡二物，分等，治之，向暮臥，以水服錢午上。汗止者不可複服，令人乾燥。

又云：治發汗後遂漏汗不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸，此為胃乾也，桂枝

大棗(十四枚，擘) 桂枝(三兩) 附子(一枚，碎之，八片)

凡三物，以水七升煮取三升，分三服。

### 治傷寒後目病方第五十一

《葛氏方》治毒病後毒攻目方：

煮蜂巢以洗之，日六七。(今按：《廣利方》云：蜂巢半大兩，水二大升云。又《僧深方》：治翳。)

又方：冷水漬青布以掩目。(《集驗方》治翳。)

又云：若生翳者燒豉二七枚，末納管中以吹。(《集驗方》同之。)

《耆婆方》溫病後目黃方：

麥門冬葉三握，以水一升煮取三升，去滓，少少飲之，自瘥。

《極要方》療傷寒病、溫毒、熱病、時行、疫氣諸病之後，毒充眼中，生赤脈、赤膜、白膚

秦皮(二兩) 升麻(二兩) 黃連(二兩)

上，以水洗去塵屑，然後以水四升，煮取二升半，分三合，眼仰，以綿繞箸，沾取湯以滴眼

### 治傷寒後黃膽方第五十二

《葛氏方》治時行病發黃方：

茵陳蒿(六兩) 大黃(二兩) 梔子(十二枚)

以水一斗，先煮茵陳，取五升，去滓，納二藥。又煮取三升，分四服之。

《千金方》治傷寒熱出表發黃臈方：

麻黃三兩，以清酒五升，煮得一升半，盡服之，覆取汗。

### 治傷寒後虛腫方第五十三

《千金方》治病後虛腫方：

豉(五升) 淳酒(一升)

煮三沸，及熱頓服，不耐酒者隨性，覆汗。

### 治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

《千金方》毒熱病攻手足腫痛欲脫方：

馬矢煮漬之。

又方：以稻穰灰汁漬之。又方：常思草絞取汁以漬之。

又方：削黃柏水煮漬之。

又方：煮豬蹄取汁，以白蔥、鹽少少著中以漬之。手足冷則易。

《集驗方》治毒熱病攻手足，腫，疼痛欲脫方：

濃煮虎杖根以漬手足。

又方：酒煮苦參漬之。

### 治傷寒後下利方第五十五

《短劇方》治濕熱為毒，及太陽傷寒，外熱內虛，熱攻腸胃，下黃赤汁及如爛肉汁及赤滯壯

梔子(十四枚) 豉(一升) 薤白(一虎口)

凡三物，切，以水四升，煮梔子、薤白令熟，納豉，煎取二升半，分三服。

《經心方》治熱病後赤白利痛不可忍方：

香豉(一升) 黃連(三兩) 薤白(三兩)

以稅米泔汁五升，煮取二升半，分三服。

《千金方》傷寒後下利膿血方：

黃柏(二兩) 黃連(四兩) 梔子仁(十四枚) 阿膠(一兩)

上四味，以水五升煮取二升，分三服。

《醫門方》療傷寒瘥後，下利膿水，不能食方：

黃連(三兩) 烏梅肉(二兩，熬，並末之) 蠟(一兩)

烱蠟和蜜合為丸，空腹如梧子服三十丸，日再，加至四五丸。

又方：取龍骨末，服方寸匕，佳。

## 治傷寒後下部癢痛方第五十六

《葛氏方》治大孔中猝癢痛如鳥喙方：

赤小豆(一升) 大豆(一升)

合搗，兩囊盛蒸之，令熱牙坐上。

《醫門方》熱病有匿上下食之方：

豬脂(一枚) 苦酒(一合)

上相和，煎之二三沸，滿口蝕缺從下。

又云：治毒病下部生瘡方：

熬鹽以深導之，不過三。

又方：煮桃皮煎如飴，以綿合導之。

《范汪方》治大孔中癢方：

取女萎治下篩，綿絮裹著大道中，癢絕乃出藥。

### 治傷寒豌豆瘡方第五十七

《病源論》云：夫表虛裡實，熱毒內盛，則多發瘡，重者周匝遍身，其狀如火瘡。若根赤頭白者，則毒輕；若色紫黑則毒重。

又云：傷寒熱毒瓦斯盛，多發瘡，色白或赤，發於皮膚，頭作癩漿，戴白膿者，其毒則輕，《千金方》治豌豆瘡方：

初覺欲作，則煮大黃五兩，服之愈。

又方：取好蜜，通身瘡磨上。

又方：以蜜煎升麻摩之。

又方：青木香二兩，水三升，煮取一升，頓服瘥。（以上《極要方》同之。）

又方：小豆屑，雞子白和敷之。

又方：婦人月布拭之。

又方：青木香湯：

青木香（二兩） 丁香（一兩） 薰陸香（一兩） 白礬石（一兩） 麝香（二分）  
上五味，以水四升，煮取一升半，分再服，熱毒盛者加一兩犀角，無犀角，升麻代。病輕去

《葛氏方》治時行瘡方：

以水濃煮升麻，綿沾洗拭之。又苦酒漬煮彌好。

《救急單驗方》療時患遍身 初覺出方：

即服三黃湯令利，即減。

又方：飲鐵漿一小升，立瘥。

又方：小豆末一合，和水服驗。

《新錄方》豌豆瘡滅癩方：

鷹矢粉上，若瘡乾和豬脂塗，日一二。

又方：胡粉敷上。

又方：桑白汁和雞子白塗之。

又方：用蜜塗之。

《千金方》云：芒硝和豬膽（都敢反）塗瘡上，勿動，痂落無痕。

今按：天平九年六月二十六日下諸國官府云：凡是疫病名赤斑瘡，初發之時，既似瘡疾，瘡必令汁溫冷任意可用；又糯粳以湯食之；又病愈之後雖經二十日不得輒吃鮮魚、肉、果菜並飲水及洗浴、房室、強行步、當風雨。又鯖及阿遲等魚並年魚不可食，但乾鰻堅魚等煎否皆良。

## 傷寒後食禁第五十八

《養生要集》云：凡溫病傷寒愈後，但宜食糜粥，唯少少，勿食大飽，引日轉久，可合羊

又云：凡傷寒毒病愈百日之內，禁食豬肉、腸、血、肥魚、膩（女利反）乾之難消之物。不禁

《養性志》云：諸病愈後勿食五辛，食之令人目失明。

《七卷食經》云：時行病愈，食禁葫、韭、蝦、鱧輩，不禁病複發則難治，後年輒發。

時行病後禁餅餌、魚膾、諸生果菜，難消之物，皆複發病。

時行汗解愈後勿飲冷水，損心胞，常虛不能伏。

時行病患不可食鯉鮪、小鯉及鱧，令病不愈。

又勿食生棗及羊肉，膈上乃為熱。

凡病患不得食熊肉，令作長病，終不除愈。

時行後禁飲酒、食生魚肉，令泄利，難治。

時病愈後未滿三月，食（以周反）魚複食諸菜，三年肌膚不充。

又食梅油脂物，令暴利難治。

又食瓜合魚膾，令病複發。

又食蒜膾，令人損胃消。

又未滿三月，食鱻 即複病。  
時行病後未強食青花菜，令人手足損重。

又飲酒合陰陽複，病必死。

又食生菜合陰陽，複必死。

### 治傷寒變成百合病方第五十九

《千金方》云：百合病者，是百脈一宗，悉致病也。其狀惡寒而嘔者，病在上焦也，（二十三日當愈。其狀，腹滿微喘，大便堅，三四日一大便，時複小溲者，病在中焦也，六十三日當愈。其狀，小便淋瀝難者，病在下焦也，四十三日當愈。）

百合之病，令人欲食複不能食，或有美時，或有不用聞飲及飯臭，如有寒其實無寒，如有熱其複無他，常默默欲臥，複不能眠，至朝口苦，小便赤澀，欲行複不能行也，諸藥不治，治

百合病（本無，同上），其脈微數，其候每溺時即頭覺痛者，六十日乃愈。

百合病（本無，同上），候之溺時，頭不覺痛者，淅淅如寒者，四十日愈。

百合病（本無，同上），候之溺時，覺快然，但覺頭眩者，二十日當愈。

百合病（本無，同上）証，或其人未病已預見其候者，或已病一月二十日，複見其候者，治之

治百合病已經發汗之後者方：

百合根取七枚擘之，洗，水二升，漬之一宿，當沫出水中，明旦去水取百合，以泉水二升煮一升

治百合病已經下之後者方：

滑石（三兩）代赭（一兩）

以水三升煮取一升，納百合汁如前法一升合和，複煎取一升半，分再服。

治百合病已經吐之後者方：

百合汁一升如前法，取雞子黃一枚，納汁中攪令調，分再服。

治百合病始不經發汗，不吐，不下，其病如初者方：

生地黄汁三升，和百合汁後煎取一升半，分再服。大便當去惡沫為候也。

治百合病經一月不解變如渴者方：

取百合根一升，水一斛漬之一宿，以汁洗病患身也。洗身竟，食白湯餅，勿與鹽豉也。渴不

治百合病變發熱者方：

滑石(三兩) 百合根(一兩)

上，燥之，飲服方寸匕，日三。當微利，利者止，勿複服也。

治百合病變腹中滿痛者方：

但取百合根隨多少，熱熬令黃色，飲服方寸匕，日三。滿消痛止。

### 治時行後變成瘡方第六十

《錄驗方》云：大五補湯治時行後變成瘡方：

枸杞白皮(一斤) 麥門冬(一升，去心) 生薑(一斤) 乾地黃(三兩) 當歸(三兩)  
黃耆(三兩) 人參(三兩) 甘草(三兩) 茯苓(三兩) 生竹葉(五兩) 遠志皮(三  
兩) 朮(三兩) 芎(二兩) 桂心(五兩) 大棗(二十枚) 桔梗(二兩) 夕藥(三兩)  
半夏(二兩，洗)

凡十八物，切，以水一斗五升煮取三升，分四服，一日令盡之。

## 卷第十五

## 說癰疽所由第一

《劉涓子方》云：九江黃父問於岐伯曰：余聞腸胃受谷，上焦出氣，以溫分肉，而養骨節，通腠理。中焦出氣如露，上注 谷，而滲孫脈。津液和調，變化而赤為血，血和則孫脈先滿，乃注絡脈，絡脈皆盈，注乃於經脈。陰陽已張，因息乃行，行有經紀，周有道理。與天合約，不得休止。切而調之，從虛法去實，瀉則不足，疾則氣留。去虛補實，補則有於，血氣已調，形神乃持。余已知血所之平與不平，未知癰疽之所從生，成敗之時，死生之期有遠近。何以度之，可得聞乎？

岐伯曰：經脈留行不止，與天同度，與地合紀，故天宿失度，日月薄蝕，地經失紀，水道流溢，草 不成，五穀不植，經絡不通，民不往來，巷聚邑居，別離異處，血氣猶然，請言其故。

夫血脈營衛，周流不休，上應星宿，下應經數。寒氣客於經絡之中，則血澀，血澀則不通，不通則氣歸之，不得複返，故癰腫焉。與寒氣化為熱，熱勝則肉腐，肉腐則不膿，膿不瀉則爛筋，筋爛則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，不得泄瀉，煎枯空虛，筋骨肌肉不相親，經脈敗漏，內熏(熱也)於五臟，五臟傷故死矣。

又云：黃父曰：夫子言癰疽，何以別之？岐伯答曰：營衛稽留於脈，久則血澀而不行，血澀不行則衛氣從之，從之不通，壅遏(於葛反，絕也)不得行也。大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐為膿。猶不能陷肌膚，枯於骨髓，骨髓不為焦枯，五臟不為傷，故為癰。

黃父曰：何謂疽？岐伯曰：熱氣淳盛，當其下筋骨，良肉無餘，故命曰疽。疽上皮咬以堅，狀如牛領之皮，癰者，其上皮薄以澤，此其候也。

黃父曰：乃知所說，未知癰疽姓名、發起處所、色診形候、治與不治、死活之期，願事事聞之。

岐伯曰：《癰疽圖》曰：赤疽發額，不瀉，十餘日死，其五日可刺也。其膿赤多血死，未有膿可治。人年二十五、三十一、六十、九十五，百神皆在額，不可見血，見血者死也。

禽疽發如疹者數十處，其四日腫，合牢核痛，其狀若攣，十日可刺。其內發身振

寒，齒如噤欲瘞，如是者，十日死也。

杼(除呂反)疽發項，若兩耳下，不瀉，十六死，其六日可刺。其色黑見膿而腐者死，不可治。人年十九、二十三、三十、三十五、三十九、五十一、五十五、六十一、八十七、九十九，神在兩耳，不可見血，見血者死。

疔疽發兩肩，此起有所逐惡血，結留內外，營衛不通，發為疔疽。三日身腫痛，甚口噤如狀，十一日一日可刺。不治，二十日死。

蜂疽發背，起心俞，若肩隅，二十日不瀉死，其八日可刺。其色赤黑，膿見青死，不治。

人年六歲、十八、二十四、四十、五十六、六十七、七十二、九十八，神皆在肩，不可見血，見血者死。

陰疽發髀(卑履反)腹外，若陰股，始發腰強而不能自止，數飲不能多，五日堅痛，如此不過三歲死。

刺疽起肺俞，若肝俞，不瀉，二十日死，其八日可刺。發而赤，其上肉如椒子者死，不可治。人年十九、二十五、三十三，三十九、五十七、六十、七十三、八十一、九十七，神皆在背，不可見血，見血者死。

脈疽發環頭(一方作頸)，如痛，身隨而熱，不欲動，或不能食，此有所大畏恐，躁而不精(靖)，上氣咳逆，氣絕，其發引耳，不可以動，二十日可刺。不刺，八十日死。

龍疽發背起胃俞(第十二椎下兩旁各一寸半)，若腎俞(第十四椎下社各一寸半)，二十日不瀉死，九日可刺。在刺，其上赤下黑，若青膿黑死，發血膿者不死。

首疽發熱，發熱八十日，大熱汗頭引身盡，如癩身熱，同同(齊也)如沸者，擇皮頗腫處淺刺之。不刺，入腹中二十日死。

俠(胡頰反)榮疽發脅，若起兩肘頭，二十五日不瀉死，其九日可刺。發赤白間，其膿多白而無赤可治也。人年一，十六、二十六、三十二、四十八、五十八、六十四、八十、九十六，神皆在脅，不可見血，見血者死。

行疽發如腫，或複合相往來，可要追其所在，刺之即愈。

勇疽發股起太陰，若伏鼠，二十五日不瀉死，其十日可刺。勇疽發膿赤，黑死，白者尚可治。人年十一、十五、二十、三十一、三十三、四十六、五十九、六十三、七十五、九十一，神皆在尻尾，不可見血，見血者死。

標疽發熱同，耳聾。後六十日腫如裹水狀，如此可刺之。但出水後及有血，血出即除也。人年五十七、六十五、七十三、八十一、九十七，神皆在背，不可見血，見血者死。

□（□先反）疽發足趺若足下，三十日不瀉死，其十二日可刺。□疽，發赤白膿而不反（死），大多其上白癢，赤黑膿死不可治，不黑可治。人年十三、二十九、三十五、六十一、七十三、九十三，神皆在足，不可見血，見血者死。

冲疽發少腹，痛而振寒熱。四日可刺，五日，六日變而可刺之，不刺之，五十日死。

敦（熟，殊六反）疽發兩手五指頭若足五趾頭，十八日不瀉死，其四日可刺。其發日而黑，癰不甚，未過節可治也。

疥疽發腋下，若臂、兩掌中，振寒熱而噎乾者，飲多即嘔，煩心，或六十日軫（軟歟）及有合者，如此可汗，不汗，入腹內死。

筋疽發背俠脊兩邊大筋，其色蒼，八日可刺也。有癰在肥（胞）腸（腹）中，九十日死。

陳乾疽發兩臂，三四日痛不可動，五十日身熱而赤，六十日可刺之。如刺肺無血，三四日病已，無膿者死。

蚤疽發手足五指頭起，過節其色不變，十日之內可刺也，過時不刺後為蝕（飲）。有癰在腋，三歲死。

叔疽發身腫，牢核而身熱，不可以坐，不可以行，不可以屈伸，成膿刺之即已除。

白疽發膊若肘後，癢，目痛，傷精，乃身熱、多汗，五六處死。心主疽癰在股脛六日死，發膿血六十日死。

黑疽發腫，居背大骨上，八日可刺也，過時不刺為骨疽。骨疽膿出不可止，出碎骨，六十日死。

脅少陽有腫癰，在頸八日死，發血膿十日死。

創疽發，身先癢後痛。此故傷寒寒氣入臟，篤發為創疽。九日可刺，不刺九十日死。

尻腰太陽脈有腫，交脈屬於陽明。癰在頸十日死，發膿血七十日死。

尻太陽脈有腫癰，在足心陽明、少陽，八日死，發膿血八十日死。

頭陽明脈腫癰，在尻六日死，發膿血六十日死。

股太陽脈有腫癰，在足太陽十七日死，發膿血百日死。

肩太陽太陰脈在腫癰，在脛八日死，發膿血四百日死。

足少陽脈有腫癰，在脅八日死，發膿血六百日死。

手陽明脈有腫癰，在腋淵一歲死，發膿血二歲死。

黑疽發腋淵死；黑疽發耳中如米，此大疽死；黑疽發肩不死可治；黑疽缺盆中，名曰伏癰死，不治；黑疽發胸可治；黑疽發肘上下，不死可治；赤疽發陰股，堅死，濡可治；赤疽發髀樞（昌朱反），六日可治，不治出歲死；赤疽掌中可治；髀解際，指本黑、頭赤死；赤疽發陰死不治；黑疽發肥腸死；黑疽發膝臘，堅死，濡可治；黑疽發趺上，堅死；足下久癰，色赤死，不可治。

又云：夫癰疽者，初發始微，多不為急，此實奇患，惟宜速療之，療之不若速，病成難救，以此致禍，能不痛哉？且述所懷，以悟後賢。謹條黃父癰疽論，論癰所著，緩急之所，死生之期，期如有別癰之形色、難易之療如下：

發皮肉，淺腫高而赤，貼即消，不療先愈。

發筋肉，深腫下而堅，其色或青、黃、白、黑，或複微熱而赤，宜急療之，成消中半。

發附骨者，或未覺內肉，內肉已殃，已殃者癰疽之甚者也。

發背外，皮薄為癰，皮堅為疽。如此者多現先兆，宜急療皮堅甚大者，多致禍矣。

《太素經》云：黃帝曰：願盡聞癰疽之形與忌日名。岐伯曰：癰發於噎中，名曰猛疽。

猛疽不治，化為膿，膿不瀉，塞咽半日死，其化為膿者，瀉則已，已則含豕膏，毋冷食，三日而已。（今按：《劉涓子方》癰疽極者十八種雲則是也。）

發於頸名曰夭疽。其癰大以赤黑，不急治則熱氣下入淵腋，前傷任脈。內熏（熱也）肝肺，熏肝肺十餘日而死矣。

陽氣大發，消腦留項，名曰腦鑠（書藥反）。其色不樂，項痛如刺以針，煩心者死，不治。

發於肩及腋，名曰疵癰。其狀赤黑，急治之。此今人汗出至足，不害五臟。癰發四五，逆之。（今按：《劉涓子方》"癰發四五逆之"此七字無。）

發於腋下赤堅，名曰朱疽。治之用砭石，欲細而長，數砭之，塗以豕膏，六日已，勿裹之。其癰堅而不潰者，為馬刀俠嬰，急治之。（今按：《劉涓子方》作"鼠膏"。）

發於胸，名曰井疽。其狀如大豆，三四日起，不早治下入腹，不治，七日死。

發於臆者，名曰甘疽。其狀如谷實萋瓜，常寒熱，急治之，去其寒熱。不治，十歲死，死後膿自出。

發於脅，名曰敗疵。敗疵者，女之病也，久之，其病大癰膿，其中乃有生肉，大如赤小豆，治之，銼連翹草根各一升，水一斗六升，煮之，竭為三升，即強飲，濃衣坐釜上，令汗出至足已。

發於股脛，名曰股脛疽。其狀不甚變，而癰膿附骨。不急治，四十日死。

發於股，名曰脫疽。其狀不甚變，而癰膿搏骨，不急治，三十日死矣。

發於尻，名曰兌疽。其狀赤堅大，急治之。不治，四十日死矣。

發於股（故戶反）陰，名曰赤絕。不急治，六日死。在兩股之內，不治，六十日而死。

發於膝，名曰疵疽。其狀大癰，色不變，寒熱而堅，勿破，破之死。須其柔，乃破之者生。

諸癰疽之發於節而相應者，不可治也。發於陽（丈夫陰器曰陽，婦人陰器曰陰）者百日死，發於陰者四十日死。

發於脛，名曰兔齒。其狀赤至骨，急治，不治害人也。

發於踝，名曰走緩。其狀色不變，數石其輪而止其寒，不死。

發於足上下（足跌上下也），名曰四淫。其狀大癰，不色變，不治百日死。

發於足旁，名曰厲疽。其狀不大，初如小指發，急治之。去其黑者，不消輒益。不治，百日死。

發於足指，名曰脫疽。其狀赤黑死不治，不赤黑不死。治之不衰，急斬去之活，不然則死矣。

又云：身有五部：伏菟一；腓二，腓者，（都館反）也；背三；五臟之輪四；項五。五部有癰疽者死。

又云：楊上善曰：癰生所由，凡有四物也：喜怒無度，爭氣聚生癰，一也；飲食不依節度，縱情不擇寒溫為癰，二也；臟陰氣虛，腑陽氣實，陽氣實盛生癰也，三也；邪客於血，聚而不行，生癰，四也。癰疽一也，癰之久者，敗骨名疽也。

又云：夫積石成山，積氣成癰，不從天下，不從地出，皆由不去脆（青碎反）微故也。

《病源論》云：癰者由六腑不和所生也；疽者，五臟不調所生也。

凡腫一寸至二寸，癰也；二寸至五寸，癰也；五寸至一尺，癰疽也。一尺至三尺者，竟體膿，膿成，九孔皆出。諸氣憤郁，不遂志欲者，血氣蓄積，多發此疾。

凡發腫高者，疹（恥忍反）源淺。腫下者，疹源深。大熱者易治，小熱者難治。

凡五月勿食不成核果及桃、棗，發癰疽癰。

凡人汗入諸食中，食之則作疔瘡、癰癰。

凡銅器蓋食，汗入食，食之令發惡瘡內疽。

凡鯽魚膾合豬肝肺，食發疽。

凡醉，強飽食，不幸發疽。

《醫門方》云：凡癰腫發於背，欲得高，高即腫浮，淺在外，縱結膿者，亦多瘥；腫不高，沉在肉裡者，其腫深，膿潰向內必死。

《范汪方》云：經言：五臟不調，致疽；六腑不和，生癰。疽急者，有十：一曰癰疽者，急者二三日殺人，緩者十餘日；二曰癰疽，急者十餘日殺人，緩者一月；三曰緩疽，急者一年殺人，緩者數年；四曰水疽，所發多在手足，數年猶可治。疽者有數十種，要如此。癰之疾，所發緩地不殺人，所發若在險地，宜令即消，若至小膿，猶可治，至大膿者致禍矣。一為腦（乃道反）戶，在玉枕下一寸；二為舌本；三為懸壅；四為頸節；五為胡脈；六為五臟俞；七為五系；八為兩乳；九為心鳩尾；十為兩手魚際；十一為腸屈之間；十二為小道之後；十三為九孔；十四為兩脅腹；十五為神主之舍。凡四十五處不可傷，而況於疽乎？若癰發此地，遇良醫，能令不及大膿者，可救，至大膿者害及矣。

癰疽脈洪粗難治，脈微澀者易愈。諸浮數之脈，應當發熱，而反惡寒，癰也。

癰起於節解過，遇頑醫不能即消，令至大膿者，豈膏藥可得生複？

## 治癰疽未膿方第二

《醫門方》云：扁鵲曰：癰腫癰疽風腫惡毒腫等，當其頭上灸之數千壯，無不瘥者；四畔亦灸三二百壯。此是醫家秘法。小者灸五六處，大者灸七八處。療癰疽腫一二日未成膿，取伏龍肝下篩，醋和如泥，塗爛布上，貼腫，燥即易，無不消。（今按：《葛氏方》和雞子中黃塗。）

《劉涓子方》云：癰疽之甚，未發之兆，飢渴為始，始發之始，或發白疽似若小癰，或複大痛，皆是微候，宜善察之。欲知是非，重按其處，是便隱痛，複按四邊，比方得失。審定之後即灸，第一便灸其上二三百壯，又灸四邊一二百壯。少者灸四邊，中者灸六處，大者灸八處，壯數、處所不患多也。灸應即貼即薄，令得即消，內服補暖湯、散。不已，服冷導外即冷薄。不已，用熱薄帖貼之法，當開其口，泄熱氣也。

治癰疽始作腫不赤而熱長甚速、非薄帖所製犀角拓湯方：

犀角（三兩） 大黃（三兩） 升麻（三兩） 黃芩（三兩） 梔子（三兩） 黃連（三兩）  
甘草（三兩）

上七物，切，以水一斗二升煮取六升，使極冷，以故練兩重入湯中，拓腫處，小燥易，恆令濕，一日，一夜數百過。

治癰腫黃 帖治癰腫癰瘰及欲發背覺痛方：

黃耆(一兩) 黃芩(一兩) 芎 (一兩) 當歸(一兩) 黃連(一兩) 白朮(一兩) 夕藥(一兩) 防風(一兩)

上八物，搗篩，以雞子白和塗故布上，以貼腫上，燥復易。患熱者加白朮，患痛者加當歸各一兩。

《千金方》云：凡癰疽始發，或從小癰，或複大痛，或複小痛，或發米粒大白膿子，此皆微候，宜善察之。見有少異，即須大驚忙，急治之。及斷口味，速服諸湯，下去熱毒。若無醫藥處，即灸當頭百炷，其大重者，灸四面及頭二三百壯，壯數不必多也，複薄冷藥帖。種種救療，必瘥速也。亦當頭以大針，針入四分即瘥。

凡諸異腫種種不同者，無問久近，皆服五香湯，刺去血，小豆薄敷之，其間數數以針刺去血。若失治已潰爛者，猶服五香及漏蘆湯下之，以升麻湯拓洗熨之，摩升麻膏。若生息肉者，白蘆茹散敷之，青黑肉去盡即停之。好肉生，敷升麻膏；肌不生，敷一物黃散。若敷白蘆茹，青黑惡肉不盡者可以柒頭、茹半錢和三錢白茹散稍敷。(今按：五香湯在丁腫方，漏蘆湯、升麻湯、升麻膏在治丹之方；黃散、茹散在緩疽之方。)

內消散 凡是癰疽皆宜服之，方：

赤小豆(一升，熬，納酢中，往還七返) 人參(二兩) 甘草(二兩) 瞿麥(二兩) 白朮(三兩) 當歸(二兩) 黃芩(二兩) 豬苓(二兩) 防風(一兩) 黃耆(三兩) 薏苡仁(三兩) 升麻(四兩)

十二味，酒服方寸匕，日三夜二，長服取瘥。(今按：《廣濟方》同之。但《范汪方》云：

內消散治癰腫不潰：

白芷十分 白朮十分 芎 七分 夕藥十分 椒七合 乾薑七分 當歸七分 草七分 凡八物，冶合，以酒服五分七，日再。

又《令李方》內消散治癰腫不潰方用：

白芷十分 夕藥十分 蜀椒七合 芒硝十分 芎 十分 當歸七分 乾薑七分 七物，下篩，酒服五分七，日二。一方有白朮一分。)

治癰腫痛煩困方：

生楸葉十重貼之，以布帛裹，緩勿令急，日二易。止痛消腫，食膿勝於眾帖，冬以先乾者，臨時鹽湯潑潤用之。（《葛氏方》、《劉涓子方》同之。）

廣濟犀角丸 治一切毒腫癰乳發背，服之止痛化膿為水，遂大小便出神效方：

犀角（十二分）升麻（一兩）大黃（五分）黃芩（五分）防風（一兩）當歸（一分）黃 梔子仁 乾薑 黃連 人參 甘草（各一兩）巴豆（二十三枚，去心、皮，熬）凡十三物，治下篩，以蜜和丸如梧子大，空腹以飲服十丸，取二三行快利，常服為微痢。（忌生菜、熱曲、酢蒜、海藻、豬肉、筍、粘食。）

《效驗方》治卒癰腫白藪帖方：

大黃（三分）黃芩（三分）夕藥（二分）白藪（三分）赤石脂（一分）凡五物，治合下篩，以雞子白和如泥，塗紙以薄腫上，燥易之。

《錄驗方》治癰腫運赤痛及已潰松脂帖方：

成練松脂（一斤）蠟蜜（半斤）豬脂（四斤）當歸（二兩）黃連（一兩）黃柏（一兩）

凡六物，咀三物，盡合，煎三沸三下，候帖色變微紫色者藥成，絞去滓。若初腫未有膿者塗紙貼腫上，日三易，夜再。若以潰有口者，穿紙出瘡口，貼四邊，令膿聚食旁肉速瘥。（今按：諸方松脂帖已多，但《劉涓子方》松脂二斤，黃連一兩，附子一兩，黃芩一兩，夕藥一兩，細辛一兩，石膏二兩也。又《效驗方》杏仁一兩，臘蜜一兩，松脂一兩，濃朴一兩也。）（今按：以下字治本注也。）

千瘡萬病霜膏 治金木瘡，癰疽惡瘡，若始得癰，摩腫上五百過即消。若以潰者著瘡中食膿云云，具在本方。

《短劇方》云：經言寒氣客於經絡之中，則血氣凝（李亢反）澀不行，壅結則為癰疽也。不言熱之所作。其成癰，久寒化為熱，熱盛則肉腐爛為膿也。依經診候之由，人體中有熱，被寒冷搏之，血脈凝澀不行，熱氣壅結則為癰疽也。是以治癰疽方，有灸法者治其始，其始中寒未成熟時也。其用冷薄帖者治其熱已成，以消熱，使不成膿也。今人多不悟其始，不用溫治及灸法也。今出要方以治其成形者耳。赤色腫有尖頭者根廣一寸，以還名為癰，其廣一寸以上者便為小癰也，其如豆粒大為。

治作癰令消方：

取鹿角就磨刀石上水摩之，以汁塗燥，復塗則消也；內宜服連翹湯下。

又方：生春小豆下篩，雞子白和如泥，塗之。

治始作癰正赤熱痛方：

單燒鹿角作末，苦酒和薄之，乾復塗之自消。

又方：單搗大黃，苦酒和薄之，溫則易。

治癰及癤始結腫赤熱方：

水摩半夏，塗之燥，更塗得皺，使消也。山草中自可掘取生半夏乃佳，神效。

《葛氏方》治諸癰疽背及乳房初起，赤急痛，不早治殺人，使速消方：

但灸其上百壯。

又方：釜底土，搗，以雞子中黃和塗之。

又方：搗芋根薄之。

又方：搗黃柏下篩，以雞子白和，濃塗，乾復易，立愈。

治癰發背腹陰處通身有數十方：

取乾牛矢，燒，搗細，重絹篩下，以雞子白和塗，乾復易。秘方。

《范汪方》治癰腫初腫痛急方：

以冷鐵熨溫輒易。

又方：取粢粉，熬令正黑，末作屑，以雞子白和之。以塗練上敷腫上，小穿練上作小口以泄氣，癰毒便消。當數易之，此藥神秘方。（今按：《葛氏方》：治諸癰疽發背及乳房初起赤急痛，使速消。《爾雅》云菜□也。和名：支美乃毛知。）

《本草拾遺》云：水蛭（音質），人患赤白游疹及癰腫毒腫，取十餘枚令□病處，取人皮皺肉白，無不癢者。冷月無蛭，泥中掘取暖湯養令動，先洗人皮，咸以竹筒盛啜之，須與咬血滿，自脫，更用飢者。（今按：《經心方》云：以水蛭食去惡血。）

《僧深方》治癰方：

梁上塵、燒葵末分等，苦酒和敷之，燥復敷。治乳癰亦愈。

### 治癰疽有膿方第三

《病源論》云：凡癰若按之都牢堅者，未有膿也；按之半軟者，有膿也。又，以手掩腫上，不熱者無膿。若熱甚者，為有膿。凡覺有膿，宜急破之，不爾，侵食筋骨。

《劉涓子》云：癰大堅者，未有膿。半堅半薄半有膿。當上薄者，都有膿，便可破。可破之法，應在下逆上破之，令膿易出，用鉞（披眉反）針。膿深難見，上肉濃而生內大針。若外不別有膿，可當其上數按之，內便隱痛者，肉殃堅者，未有膿也。按更不痛於前者，內膿已熟也。膿泄去熱氣，不爾長連，連則不良。

癰審知有膿者，按之處陷不復者無膿，按之即復者有膿；初腫大，按乃痛者病深；小按便痛者病淺也。凡破癰之後，病患便綿欲死，便內寒熱，腫自有似癰而非者，當以手按腫上，無所連是風毒耳，勿針，可服升麻湯、升麻膏，破癰，口當令下流三分，近下一分，令針極熱，極熱便不痛。

夫癰壞後有惡肉者，當以豬蹄湯洗去其穢，次敷食肉膏、散，惡肉盡，乃敷生肉膏、散，乃摩四邊，令善肉速生。當絕房室，慎風冷，勿自勞動，須筋脈復常，乃可自勞耳。不爾，新肉易傷，傷則重發，慎之。

治癰疽洗瘡豬蹄湯方：

豬蹄（一具）黃連（五兩）芎（三兩）當歸（三兩）甘草（三兩）夕藥（三兩）薔薇（一斤，又方代大黃三兩）

上七物，以水二斗，煮蹄取一斗，納諸藥復四升洗之。

治癰疽食惡肉蘆茹散方：

蘆茹（一兩，柒頭）礬石（二分）雄黃（二分）硫黃（二分）

上四物，下篩，著兌頭納瘡口中。（今按：《錄驗方》：雄黃一兩，礬石一兩，蘆茹一兩也。）

治癰疽發背已潰未潰生肉排膿散方：

當歸(二兩) 桂心(二兩) 人參(二兩) 芎 (一兩) 濃朴(一兩) 防風(一兩) 甘草(一兩) 白芷(一兩) 桔梗(一兩)

上九物，搗下篩。溫酒服方寸七，日三夜再。瘡未合可長服之。(今按：《僧深方》治癰腫自潰長肉排膿蜀椒散方：

蜀椒 桂心 甘草 乾薑 芎 當歸各一兩  
凡六物，服法如上。

又方：治癰腫排膿散方：

黃耆四分 夕藥二分 白蘘二分 芎 二分 赤小豆一分  
凡五物，治下，服如上。)

治癰疽食惡肉膏方：

松脂(五兩) 雄黃(二兩) 雌黃(二兩) 冶葛皮(一兩) 柒頭蘆茹(三兩) 巴豆(百枚) 豬膏(一升)

上七物，煎，松脂消下諸藥，微火上煎三上三下，膏成絞去滓，著兌頭，納瘡中，日六七，食惡肉，初用病當更腫赤，但用如節度，惡肉盡止，勿使過也。

治癰疽發背已潰生肉膏方：

甘草(二兩) 當歸(二兩) 白芷(二兩) 烏喙(六枚) 肉蓯蓉(二兩) 蜀椒(二兩) 蛇銜(一兩) 細辛(二兩) 薤白(二兩) 乾地黃(二兩)

上十物，切，以好酒半升和漬再宿，以不中水豬肪三斤，煎一沸，下餘止，複三上三下，膏成，急手絞之。

(今按：《錄驗方》治癰疽生肉膏方：草二兩，生地黃五兩，當歸二兩，續斷一兩，黃芩二兩，白芷三兩，甘草二兩，薤白二兩，豬脂一升，大黃四兩。凡十物，咀，煎三上 三下，膏成，敷之。)

治癰疽臭爛洗大黃湯方：

大黃(二兩) 黃芩(一兩) 白蘘(一兩)

上三物，合搗下篩，以水一升二合煮一沸，絞去滓，適冷暖以洗瘡，日十過。

《范汪方》治癰瘡熱已退，膿血不止，瘡中空虛，疼痛排膿，內塞散方：

防風(一兩) 茯苓(一兩) 白芷(一兩) 桔梗(一兩) 遠志(一兩) 甘草(一兩)  
桂心(二分) 人參(一兩) 芎(一兩) 當歸(一兩) 附子(二枚, 炮) 濃朴(二兩)  
龍骨(一兩) 黃耆(一兩) 赤小豆(五合, 熬)

凡十五物, 治下篩, 溫酒服方寸七, 日三夜一。(《千金方》同之, 有下發背條。)

《集驗方》治癰瘡膿血不止, 瘡中空虛疼痛, 排膿內補散方 :

防風(一兩) 遠志(一兩) 當歸(二兩) 黃耆(一兩) 白芷(一兩) 甘草(一兩)  
桔梗(一兩) 通草(一兩) 濃朴(二兩) 人參(一兩) 桂心(一兩) 附子(一兩)  
赤小豆(五合, 熬) 芎(一兩) 茯苓(二兩)

凡十五物, 治合篩, 食未溫酒服方寸七, 日三夜一。(今按 : 《廣濟方》同之。)

《令李方》治癰內補排膿散方 :

黃耆(二兩) 當歸(二兩) 赤小豆(三十枚) 芎(一兩) 夕藥(二兩) 大黃(一兩)  
凡六物, 治合下篩, 以粥清服方寸七, 日三。

又云 : 治癰腫桂心散方 :

黃耆(六分) 夕藥(四分) 桂心(一分)

凡三物, 治下篩。酒服方寸七, 日三。

《錄驗方》洗癰疽並惡瘡毒瓦斯豬蹄湯方 :

當歸(四兩) 甘草(四兩, 炙) 夕藥(五兩) 芎(二兩) 白芷(四兩) 草(二兩)  
黃芩(四兩) 野狼牙(四兩) 豬蹄(一具) 薔薇根(一兩) 大黃(四兩)

凡十一物, 先以水二升半, 別煮豬蹄取一升半, 去蹄納諸藥, 煮得再沸下桑灰汁一升, 又煮取一升半, 湯成稍稍以洗瘡癰結疽。初腫時去野狼牙納灰汁; 瘡既(所教反, 斷已)潰, 用野狼牙除灰汁。

《僧深方》治癰疽瘡臭爛洗瘡青木香湯方 :

青木香(一兩) 夕藥(一兩) 白藪(一兩) 芎(一兩)

凡四物, 水四升, 煮取二升, 去滓溫洗瘡, 日三, 明日以膏納瘡中, 日三。

《醫門方》瘡癰腫已膿, 懼針令膿自出方 :

上取鹿角刮取細末, 和醋聚安腫上, 經宿膿自出。若膿深者先嚼生栗敷之, 撮膿向上, 極妙。療癰腫不消, 已有膿不能針, 自令穿潰方 :

空腹服葵子一枚，一宿即穿出膿，神妙。

《葛氏方》治癰已有膿，當使膿速潰壞方：

雀屎以苦酒和，塗上如小豆。

又方：吞薏苡子一枚，勿多。

《新修本草》云：癰膿使速潰方：

吞（）實一枚，破癰腫。

《蘇敬本草》注云：吞惡實一枚，出癰疽頭。

《千金方》治癰潰後瘡不合方：

燒鼠皮一枚，作灰封孔中。

又方：塗牛屎，乾易。

又方：燒故蒲席灰，和豬脂，納孔中。

《救急單驗方》療頭癰因即骨陷方：

先燒杏仁令黑，磨塗後取棗木、紫葛蔓及乾魚燒灰，和薰黃蠟月豬脂塗，神驗。

#### 治癰發背方第四

《病源論》云：癰發背，多發於諸腑俞也。六腑不和則生癰，諸腑俞皆在背，其血氣結絡於身，六腑氣不和。腠理虛者，經絡為寒所客，寒折於血，則壅不通，故結成癰，發其俞也。熱氣加於血，則肉血敗，化而為膿。癰初結之狀，腫而皮薄以澤。背上忽有赤腫而頭白，搖之連根，入應胸裡動，是癰也。

發背若熱，手不可近者，內先服王不留行散，外摩發背膏、大黃帖。若在背生，破無苦，良久不得膿，以食肉膏、散著兌頭，納癰口中。人體熱氣歇，服朮散。五日後癰欲瘥者，服排膿內塞散。

《千金方》云：論曰：凡發背皆由服五石、寒食、更生散所致，亦有單服鐘乳而發者，又有生平不服石而自發者，此是上世有服之者。其候率多於背兩胛間起，初如粟米大，或痛或癢，仍作赤色，人皆初不以為事，日漸長大，不過十日，遂

至不救。其臨困時，方圓徑三四寸，瘡有數十孔，以手按之，諸孔之中膿皆乃出，尋即失音不言。

所以養生者，小覺背上痛癢有異，即取淨土水和作泥，捻作餅子，徑一寸半，濃二分，以粗艾作炷，灸泥上灸之，一炷一易。若粟米大時，可灸七餅即瘥。若如榆莢大，灸七七炷即瘥。若至錢許大，日夜灸不住乃瘥，並服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈。又恆冷水射之，漬冷石熨之，日夜勿止，待瘥住手。此病忌面、酒、肉、五辛等。

凡腫起於背胛中，頭白如黍粟，四邊相連腫，赤黑，令人悶亂者，名發背。不灸治即入內，灸當針瘡上七八百壯。

又方：飲鐵漿三升，下利為度。

又方：鹿角灰，酢和塗之。

排（步皆反）膿內塞散主大瘡熱已退，膿血不止，瘡中肉虛瘡痛方：

防風（一兩）茯苓（一兩）白芷（一兩）桔梗（一兩）遠志（一兩）甘草（一兩）桂心（二分）人參（一兩）芎（一兩）當歸（一兩）附子（二枚）濃朴（二兩）龍骨（一兩）黃耆（一兩）赤小豆（五合，熬）十五味，為散，酒服方寸匕，日三夜一。（今按：《范汪方》云：非酒則藥勢不宣。）

《廣濟方》療鐘乳及五石等發背毒熱方：

黃芩（三兩）白鴨屎（五合）白藪（一握）香豉（五合）切，水六升煮取二升，分溫三服。

《經心方》療發背方：

以冷石熨腫上，驗。

又方：馬糞敷，乾易之，婦人發乳亦瘥。

《范汪方》治發背及諸癰腫已潰未潰方：

搗豉小和水，令如強泥作餅，餅可腫大，濃三分所，若有瘡孔空遺之，勿覆，令汁得出，得以艾羅灸豉上欲燥，若熱則易，令大熱剝爛皮也。癰痛尋當轉減，便

得安。為灸或有 一日、二日、三日，瘡孔中當汁出。（《千金方》同之。）治癰腫王不留行散方：

王不留行〔二升（成末）〕 甘草（五兩） 冶葛（二兩） 桂心（四分） 當歸（四兩） 凡五物，治合下篩，以酒服方寸匕，日三夜一。

《葛氏方》治癰發背腹陰匿處通身有數十方：

取乾牛屎燒，搗細，重絹篩下，以雞子白和以塗之，乾復易。秘方。《劉涓子方》同之。

又方：用鹿角、桂心、雞矢，當別燒，合之搗，以雞子白和，塗之。秘方。

又方：生栝樓根細搗，以苦酒和，塗上，乾復易之。

又方：赤小豆塗之亦良。

《劉涓子》治癰發背發房初起赤方：

其上赤處灸百壯。

又方：搗苧根，少水解以薄上。

又方：灶黃土、雞子白和，塗上。

又方：樹上不落桃子，末，以好苦酒和，敷上良。

又云：欲使速潰方：水研半夏，雞子白和塗之，亦能令消。

## 治附骨疽方第五

《病源論》云：附骨疽者，由體熱當風入骨解，風與熱相搏，復遇涼濕；或秋夏露臥，為冷濕所折，風熱伏結，壅遏附骨成疽。喜著大節解間，丈夫及產婦、女人，喜著鼠膝、髀頭、髀膝間，嬰孩、嫩兒亦著膊肘、背也。其大老子著急者，則先覺痛，不得轉動，按之應骨痛，經日便覺皮肉微急，洪洪如肥狀，則是也。其小兒不知字名，抱之才近其身便啼喚，則是肢節有痛處，便是其候也。大老子著緩者，則先覺如肥洪洪耳，經日便覺痺痛不隨也。

其小兒則覺四肢偏有不動搖者，如不隨狀，看肢節解中，則有肥洪洪處，其若不知是附骨疽，乃至稱身成膿，不潰至死，皆舉體變青黯也，其大老子，亦有不別是附骨疽，呼急者為賊風，其緩者謂為風腫而已。皆不悟是疽，乃至於死。

《短劇方》云：附骨疽一名（許及反）疽，其無頭附骨成膿故也。又名癰疽。以其廣大，竟體有膿故也。附骨急疽與賊風實相似也，其附骨疽者，由人體盛有熱，久當風冷，入骨解中，風與熱相搏。其始候為欲眠沉重、惚惚（音忽，恍恍也）耳，急者熱多風少，緩者風多熱少也；賊風者其人體平，無熱，中暴風冷則骨解深痛。附骨疽久者則腫見結膿。賊風久則枯消，或結癰癥。以此為異也。是附骨疽而作賊風治，則益其病深，膿多也；是賊風而作附骨疽治，則加其冷風，增遂成癰癥偏枯攣曲之疾也。

附骨急疽者，其痛處壯熱，體中乍寒乍熱，痿痿惡寒，不用熱，小便或赤，大便或難，無汗也，即得治下去熱，便得消也。縱不消盡，亦得浮淺近，外易得壞潰，其不複附骨也。

賊風之証，但痛應骨，不可按仰痛處，不壯熱，體不仁，乍寒乍熱，但覺體□以冷，砍得熱，熱熨痛處即小寬，時有汗也，即得針、灸、熨，服治風溫藥便效也。初得附骨疽即服漏蘆湯下之，敷小豆薄得消也；下利利已虛，而腫處未消者，可除大黃，用生地黃及乾地黃也；熱漸退，餘風未歇者，可服五香連翹湯，除在黃也；餘熱未消可敷升麻膏佳；若失時不消成膿者，用火針膏散如治癰法也。（今按：漏蘆湯、升麻膏在第十七卷治丹之方；五香翹湯在第十六卷治惡核腫方，皆出《短劇方》。）

《千金方》云：候附骨與賊風為異者，附骨之始未腫但痛而已，其賊風亦痛不熱，附骨則其上壯熱。

凡初得附骨疽即須急服漏蘆湯下之。敷小豆散得消，可服五香連翹湯。

治骨疽方：

又方：末蕪菁子敷，帛裹，一日一易。

《葛氏方》治久疽附骨以積年，一合一發汁出不癢方：

火烱飴以灌瘡中，日三。

又方：以白楊葉屑敷之。

## 治石癰方第六

《病源論》云：石癰者，亦是寒氣客於肌肉，折於氣血，結聚所成。其腫結確實，至牢有根，核皮相親，不甚熱，微痛，熱時自歇。此寒多熱少，堅如石，故謂之石癰也，久久熱氣乘之，乃有膿。

《短劇方》云：有石癰者，始微堅皮核相親著，不赤頭，不甚尖，微痛熱，熱漸自歇，便極堅如石，故謂石癰難消，又不自熱，熱皆可百日中也。初作便服防己連翹湯，自針氣瀉之，敷練石薄，積日可消，若失時不得治，不可消，已有膿者，亦用此薄，則速潰。膿淺易為火針，諸癰潰後用膏散，依治緩宜法，初作即以小豆薄塗之，亦消也。

治癰結腫，堅如石，或如大核，色不變，或作石癰不消者方：

鹿角八兩(燒作灰)，白蠟二兩，粗裡黃色磨石片一斤，燒石極令赤，納五升苦酒中複燒，燒竟複更納苦酒中，令減半止，搗石作末，並鹿角屑、白蠟屑，餘苦酒和如泥，濃塗癰上，才乾更塗取消也。

《千金方》治石癰堅如石不作膿者方：

生商陸根搗敷之，燥則易。又治漏癰。(《醫門方》同之。)

又方：酢和菘蓂子末敷，極亦得。

凡發腫至堅而有根者曰石癰。

又方：當上灸百壯，石子當出。

又方：梁上塵、葵莖灰分等，酢和塗。

又方：蜀桑根白皮，陰乾，搗末，消膠，以酒和桑皮敷上，敷上即拔出。

## 治瘰癧方第七

《病源論》云：瘰癧者，由風濕冷氣搏於血，結聚所成也。腫結如梅李也。

《養生方》云：人汗入諸食中，食之作瘰癧。

又云：五月勿食不成核果及桃、棗，發瘰癧之。

《太素經》云：汗出見濕，乃生瘰疽。注云：瘰癧之類，然小也，俗謂之癰子。

《短劇方》治癰及癰始結腫赤熱者：

水摩半夏塗之，燥更塗，得皴便消也。山草中自可掘取生半夏乃佳，神驗。

《千金方》治癰子方：

凡癰無頭者，吞葵子一枚，多服頭多。

又方：牛矢封之。

《徐伯方》治癰癰方：

搗商陸根和糟敷之。

又方：搗百合根敷之，食之亦得蒸。

又方：搗苦苣葉敷上。又生倉食苦苣。

《徐伯方》云：搗商陸根和糟敷之。

又方：搗生牛膝根敷之。

《范汪方》云：癰癰初生即灸其頭數百壯，即愈。

又云：癰癰初生尚微者，取如雞子所石若瓦十餘枚，燒，以布帛裹熨之，重按令極熱，熱微者輒易，二三十枚則消。

《刪繁論》云：治癰癰方：

搗生苧根以薄腫上乃止。

《救急單驗方》療初患似癰後破無痂，疼痛不可忍，名豬啄（竹角反）瘡方：

燒豬鼻作灰，附立瘡。

《陶景本草》注：伏龍肝搗篩，合葫塗甚效。

《劉涓子方》治癰癰虛腫方：

當歸(二兩) 草(二兩) 赤石脂(二兩) 升麻(四兩) 白朮(四兩) 芎(四兩) 大節〔(黃)四兩〕 乾玄參(三兩)

上八物，下篩，雞子白和如泥(塗)故布上，隨腫所大小作帖貼，燥復易之。

## 治疽方第八

《病源論》云：疽之狀，肉生小黯點，小者如粟米豆，大者如梅李，或赤或黑，乍青乍白，有實核，慘痛應心。或著身體，其著手指者，似代指，人不別者呼為代指。不急治，毒逐脈上，入臟則殺人。南方人得此疾，皆斬去指，恐其毒瓦斯上攻臟故也。

又云：十指端忽然策策痛，入心不可忍，向明望之，晃晃黃赤，或黯黯青黑，是疽。直斬後節，十有一冀。

又云：風疹痛不可忍者，疽也。疽，發五臟俞，節解相應通洞，疽也。諸是疽皆死。又齒間臭熱，血不止，疽也，七日死。治所不瘥，以灰掩覆其血，不爾著人。

又云：諸是疽皆死，唯痛取利，十有一活耳。此皆寒毒之氣客於經絡，氣血痞澀，毒變所生。

《短劇方》云：癰疽者，肉中忽生一子如豆粒，小者如米粒粟，劇者如梅李大，或赤或黑，或青或白，其黯狀實核，核有根而不浮腫也，痛應心，其根極深達肉肌也。小久不治，便四面悉腫，瘡黯□(丁甚反)紫黑色，能爛壞筋骨也，毒流散，逐脈走入臟腑，則殺人。南方人名為，著毒得著濃肉處皆即割去之，亦燒鐵令赤，爍上令焦如炭，亦灸黯瘡上百壯為佳。單舂酸莓(和名之)葉薄其四面，以防其長也。飲葵根汁、藍青汁、犀角汁、升麻汁、竹瀝汁、黃龍湯諸單方，治能折其熱耳，內外治法依治丹毒方也。

癰疽著指頭者，其先作黯疽，然後腫赤黑黯，(丁甚反)，□痛入心是也。代指者，其先腫欣欣熱痛，色不黯□也。(以上《千金方》同之。)

《千金方》云：癰疽秘方世所不傳，神良無比方：

夜干(二兩) 甘草(二兩) 大黃(十分) 麝香(二分) 乾地黃(二兩) 枳實(二兩) 犀角(六分) 前胡(三分)

八味，水九升煮取三升，分服，瘥止，不限劑。

治療疽著手足、肩背，累累(良偽反)如米起色白，刮之汁出，愈復發方：

黃(六分)款冬花(二分)升麻(四分)赤小豆(一分)附子(一分)苦參(一分)六味，下篩，酒服半錢匕，漸漸增至一錢，日三。

又方：熬蕪菁子，熟搗，帛裹，輾轉其上勿止。

又方：熬麻子，末，摩上，日五。

又方：鯽魚(三寸長者)，亂髮如雞子大，豬脂二升，煎塗。

《病源論》云：凡疽發諸節解及腑臟之俞，則猝急也；其久疽者，發身體閑處，故經久積年，致膿汁不盡，則瘡內生蟲，而變成。

《范汪方》治久疽眾醫所不能治方：

沸飴灌瘡中，三灌即愈。《葛氏方》同之。

治久疽惡瘡連年不瘥方：

黃連(二分)赤小豆(二分)附子(半分，炮)

凡三物，各搗為屑，合藥之，若瘡有汁，以屑敷之；無汁皆以豬膏和屑，銅器中火上使一沸，以敷之。

《錄驗方》治疽方：

燒鐵令赤爍之。

又方：蛭口尤佳。

又方：飲葵根汁。

又方：飲藍青汁。

又方：飲犀角汁。

又方：飲黃龍湯。

《龍門方》治療疽徹骨痛方：

取狗糞，當戶根前燒作灰，塗之。燒時勿令患人知，驗。

### 治久疽方第九

《千金方》治久疽方：

取鯽魚，破其腹，勿損腸脬，納上白鹽末，以針縫合，於銅器中火煎令乾，末，著瘡中，無膿者以豬脂和敷，小疼痛，勿怪也。

《令李方》治久癰疽漏夕藥散方：

夕藥(三分) 大黃(三分) 白藪(三分) 莽草(二分)

凡四物，治合下篩，和調之，以酒服半錢七，日二。不知可稍增至方寸七。

### 治緩疽方第十

《病源論》云：緩疽者，由寒氣客於經絡，致營衛凝澀，氣血壅結所成。其寒氣盛者，則腫結痛深，而回回無頭尾，大者如拳，小者如桃李，冰冰與皮肉相親著。熱氣少，其腫與肉色相似，不甚赤，積日不潰，久乃變紫黯色，皮肉俱爛，如牛領瘡，漸至通體青黯，不作頭，而穿潰膿出是也。以其結腫積久，而其肉腐壞遲，故名緩疽；亦名肉色疽也。

《短劇方》治緩疽方：

初作宜服五香連翹湯，去血，以小豆薄塗之，其間數以針去血。又敷之取消良也，不消色未變青者，以練石薄敷之。若失時，不得消已爛者，猶服五香連翹湯及漏蘆湯下之，隨熱多少投方也。外以升麻湯洗之，敷升麻膏。若生臭惡肉者，可以單行一物白茹散敷之，青黑肉盡便敷也。好肉熟生但敷升麻膏良，肉不生敷單行一物黃耆散也。若敷白茹散，積日青黑惡肉不盡者，可以柒頭赤皮茹散。取半錢七和雜三大錢七白茹散中合，治之，稍以敷之。惡肉去盡還淳用白茹散也，視好肉欲生可敷黃耆散也。

白茹散、柒頭茹散、黃耆散。

上三方並一物單行，隨多少春下篩用耳。

### 治甲疽方第十一

《病源論》云：甲疽之狀，瘡皮濃，甲錯剝起是也。其瘡亦癢，恆欲搔抓之，汁出。其初皆是風邪折血所生，而瘡裡亦有蟲也。

《醫門方》療甲疽，其候甲際生肉，痛不得著靴鞋（戶皆反），膿血不止方：上取石膽火上燒令煙盡，研末敷瘡上，消痛，不過三五度必瘥。極效，宜保愛之。

《隨時方》治甲疽方，因割甲傷肌作瘡癢，浸淫相染，膿血如火燒，瘡日夜漸引，名醫不能療者，此方必瘥如神。綠礬狀似朴硝，綠色，炭燒沸盡候看色赤，停冷，簡取好者搗篩為散，粗石不堪棄之勿用。上若患前件瘡者，先以鹽湯淨洗，以綠礬散濃敷之。用帛纏裹經一日□膿水即乾。若覺瘡乾急痛，即塗酥取潤，每一兩日一洗，濃敷之。病初患瘡尚小膿小，未多之時，只取少許散藥，和蘇如軟面敷一兩日，即瘥。（《極要方》同之。）

## 治腸癰方第十二

《病源論》云：腸癰者，寒溫不適，喜怒無度所致，使邪氣與營衛相干，在腸內，遇熱加之，血氣蘊積，結聚成癰。熱積不散，血肉腐壞，化而為膿。其病之狀，少腹微強，小便似淋，惡寒，身皮甲錯，腹皮急，如腫狀。甚者腹脹大，轉側聞水聲，或繞臍生瘡，而穿膿出；或膿自臍中出；或大便去膿血。惟宜急治之。又大便膿血，似赤白下，而實非者，是腸癰。猝得腸癰而不曉，治之錯者則殺人。

《千金方》腸癰之為病，小腹重，而抑強之則痛，小便數似淋，時時汗出，複惡寒。其身皮甲錯，腹皮急如腫狀。

又云：繞臍有瘡如粟，皮熱便膿血，似赤白下，必死，治之方：

屈兩肘，正灸肘頭銳骨各百壯，則下膿血即愈。

又方：大黃（四兩）牡丹皮（三兩）桃仁（五十枚）冬瓜仁（一升）芒硝（二兩）五味，水六升，煮取一升，盡服，當下膿血。

《集驗方》治腸癰湯方：

薏苡仁（一升）牡丹皮（三兩）桃仁（三兩）冬瓜仁（一升）  
凡四物，以水六升，煮取二升，分再服。

《范汪方》治腸癰方：

大黃(一斤, 金色者) 大棗(十六枚)

凡二物, 以水一斗, 煮取三升, 宿勿食。能一服, 須臾攻痛如火燒之, 癰壞血即隨大便出。

《醫門方》療腸癰方：

甘瓜子(一升, 碎) 牡丹皮 大黃(別浸) 芒硝(各三兩) 桃仁(去尖) 甘草(炙, 各二兩)

水七升, 煮取二升半, 下大黃, 更煮二三沸, 絞去滓, 納芒硝, 分溫三服, 當下膿血。

### 治肺癰方第十三

《病源論》云：肺癰者, 由風寒傷於肺, 其氣結聚所成也。肺癰之狀, 其人咳, 胸內滿, 隱隱痛而戰寒。

又肺癰有膿而嘔者, 不須治其嘔也, 膿止自愈。

又云：咽乾, 口內燥而不渴, 時時出濁唾腥臭, 久久吐膿如粳米粥, 難治。

又云：癰膿吐如粥, 始萌可救, 膿成則死。

又云：肺癰者在胸間, 咳有血也。

《千金方》云：咳, 胸中滿而偏振寒, 脈數咽乾而不渴, 時時濁唾腥臭, 久久吐膿如粳米粥, 是為肺癰。桔梗湯主之：

桔梗(三枚) 甘草(一兩)

凡二物, 咀, 以水三升, 煮取一升, 絞去滓。適寒溫, 分為再服。朝飲暮吐膿血即愈。(《葛氏方》同之。)

《范汪方》治肺癰方：

用薏苡一升, 咀, 淳苦酒三升, 煮得一升, 適寒溫一服, 有膿血當吐之。(《葛氏方》同之。)

《百濟新集方》治肺癰方：

黃耆一兩, 以水三升, 煮取一升, 分二服。(《葛氏方》同之。)

《僧深方》治肺癰經時不瘥，桔梗湯主之方：

桔梗(三兩) 甘草 薏苡仁 敗醬 乾地黃 朮(各二兩) 當歸(一兩) 桑根皮 (一升)

凡八物，切，以水一斗五升煮大豆四升，取七升汁，去豆納清酒三升，合藥煮三升半，去滓，服七合，日三夜再。禁生菜。

《醫門方》療肺癰喘氣急，臥不得安者方：

葶藶子(三兩，熬，搗如泥) 大棗(三十枚，破。)

水二升，煮棗二沸，去滓，納葶藶脂一兩，煎取一升，又以布濾，頓服之。忌豬肉酸鹹。