

卷第十六

治疗瘡方第一

《病源論》云：疔瘡者，風邪毒瓦斯搏於肌肉所生也。初如風疹搔破青黃汁出，裡有赤黑脈。亦有全不令人知，忽以衣物觸反手著則痛。亦有肉突起如魚眼，赤黑久結皆變爛成瘡，瘡下有深孔如火針穿之狀。初作時，突起如回釘蓋，故謂之疔瘡。令人惡寒，四肢強痛，瘡便變焦黑色，腫大光起，根硬強，酸痛，皆其候也。在手足頭面骨節間者最急，其餘處則可也。毒入腹，則煩悶不佳，或如醉，如此者二三日便死也。

《養生方》云：人汗入酒食內，食之作疔瘡。

凡有十種：一，瘡頭烏而強凹；二，瘡頭白而腫實；三，瘡頭如豆色；四，瘡似葩紅色；五，瘡頭內有黑脈；六，瘡頭赤紅而浮虛；七，瘡頭如葩而黃；八，瘡頭赤如薄色；九，瘡頭如茱萸；十，瘡頭似石榴子。

《千金方》云：論曰：夫稟形之類，須存攝養，將息失度，百病萌生。故四時代謝，陰陽遞興，此之二氣更相擊怒，當時也，必有暴氣。夫暴氣者，每月之中必有猝然大風。大霧、大寒、大熱，若不時避，人忽遇之，此皆入人四體，頓折皮膚，澀經脈，遂使腠理壅隔，營衛結滯，陰陽之氣不得宣瀉，變成癰疽疔毒惡瘡諸腫。至疔腫，若不預識，令人死，死不迎辰。若覺訖乃欲求方，其人已入木矣。所以養生之士，須早識此方。凡是瘡瘻無所逃矣。

又云：一、麻子疔，其狀肉上起，頭，大如黍米，色少烏，四邊微赤多癢，忌食麻子，及衣布並入麻田中行。（今按：《錄驗方》云：大小如黍米，頭黑有部漿，肉色不異。）二、石疔，其狀皮肉相連，色烏黑如烏豆，甚硬刺不入肉內，隱隱微疼。忌瓦、磚石之屬。（今按：《錄驗方》云：頭黑靨下瘡加對，有部漿，四畔小赤並粟。）三、雄疔，其狀瘡頭烏靨，四畔瘡泡漿起，色黃，大如錢孔。忌房。（今按：《錄驗方》云：連根加頭黑，刺不入，有部漿，無赤粟。）四、雌疔，其狀瘡頭少黃向裡靨，亦似灸瘡，四畔泡漿起色赤，大如錢孔。忌房。（今按：《錄驗方》云：頭赤四畔黑黃，泡漿，有汁無粟。）五、火疔，其狀如火瘡，頭烏靨，四邊有泡漿，有如赤粟。忌火灸燻。（今按：《錄驗方》云：頭黑靨肉色赤赤粟多。）六、爛疔，其狀少黑有白斑，瘡中有膿

水，形大小如匙面。忌熱食爛物。（今按：《錄驗方》云：大小如拭面，膿血俱，有四畔，無赤粟。）七、三十六疔，其狀頭烏浮起，形如烏豆，四畔起，大赤。今日生一，明生兩三乃至十，若滿三十六，藥所不治。不滿者可治。俗名黑□。忌鎮喜愁恨。（今按：《錄驗方》云：

頭黑兩兩俱生，但時滿三十六，患者即死。）八、蛇眼疔，其狀瘡頭黑，皮上浮生形如小豆狀，似蛇眼，體大。忌惡眼人見之及嫉妒人看之。（今按：《錄驗方》：頭黑條，四畔有部漿，赤粟。）九、鹽膚疔，其狀大如匙面，遍瘡皆赤，有黑粟起。忌鹹食。（今按：《錄驗方》：頭白赤大如小豆，赤粟廣多，無部漿。）十、水洗疔，其狀瘡如錢形，或如錢孔大，瘡頭白裡黑靨，汁出中鞭。忌飲漿水，水洗，渡河。（今按：《錄驗方》：頭白，無部漿，有赤粟。）十一、刀鑷疔，其狀瘡闊狹如薤葉，長一寸，側內黑如燒爛，忌刺及刀鑷切割。（今按：《錄驗方》一頭三角，有部漿，無赤有粟，忌兵刃。）十二、浮甌疔，其狀瘡體曲圓，少許不合，長而狹如薤葉大，內黃外黑白，黑白處刺不痛，裡黃處刺痛。（今按：《錄驗方》：頭高，肉上出四畔，無部漿，赤粟，忌疔鐵。）十三、牛拘疔，其狀肉內泡色起，掐不破。（今按：《錄驗方》：名羊疔瘡，即有三角，有部赤粟。）

上一十三瘡，初起必先癢後痛，先寒後熱，熱定寒多。四肢沉重、頭痛、心驚、眼花，若太重者嘔逆，嘔逆者難治。其麻子疔一種，始末唯癢，所錄之忌不得犯觸，犯觸者難治。其浮甌、牛拘兩種，無所禁忌。縱不治亦不殺人。

又云：有此病者，忌房、豬、雞、魚、牛、生韭、蒜、蔥、芸苔、胡葵、酒、酢、面、葵等。又見豹即死，大忌。（今按：《錄驗方》云：七日不得食鹽及酒肉、五辛、生冷酢滑，不得帶赤者，有毒。唯用純白色者。）

又云：凡治疔腫皆刺中心至痛，又刺四邊十餘下令血出。去血敷藥，藥氣入針孔中佳。若不達瘡裡，則不相得力也。

又云：治一切疔腫方：

蒼耳根莖子葉皆得燒作灰，酢泔和作泥塗上，不過十易。枝根出。

又方：塗雄黃末立愈，神驗。

又方：枸杞煮汁冷凍飲料一二盞，彌佳。

《錄驗方》云：有疔毒瘡，肉中突起如魚眼狀，赤黑，酸痛徹骨，是寒毒久結。及在此疾也，其爛成瘡，瘡下有深孔如火針穿也。初作突起狀如細釘蓋，

故謂之疔毒者焉。初作即服湯及諸單行治如治丹方法便瘥也。北方饒此疾也，江東時有作者。喜著口裡頰邊及舌上也，看之正黑如珠子。含服湯、針刺去血如治丹疽法也。癰疽方 治疗瘡方：

以甘刀割十字，以銅鐵箸燒火令赤，瘡上置臘，少燒，刺名曰為爍，一、二遍，無毒肉時自熱止，燒鼠屎作灰末，著瘡穴滿之即瘥。（今按：《經心方》：燒錐赤刺頭上。）

又云：治惡瘡疔腫五香湯方：

青木香 薰陸香 沉香 丁子香 藿香（各一兩）水三升，煮取一升半，分三服，得麝香二分去藿香。

《極要方》治疗瘡方：

搗茺蔚莖葉敷腫上，服汁令疔毒內消也（一名益母草。）

《百濟新集方》治疗腫毒瓦斯入心欲困死方：

取菊葉合莖搗絞取汁三升，頓服之。

《醫門方》療疔毒腫不問雄、雌、麻子等一切毒腫毒瓦斯入腹殺人方：

頻煮枸杞根汁飲之。

又云：治疗腫方：

白僵蠶、白疆石末和，封之最佳。

又方：水研白疆石服一盞，並針開瘡敷上自消。

《經心方》治疗腫新方：

末附子，酢和塗上，燥複塗之。

《陶景本草注》治疗療方：

人屎乾者燒之，煙絕水漬飲汁，名破棺湯。

《蘇敬本草注》疔瘡方：

末白僵蠶封上，根當自出，極效。

《崔禹錫食經》疔瘡方：

搗 莖葉根敷之，瘡根即撥。

《耆婆方》治一切疔瘡神方：

以 末少少敷即瘥。(今按：以冷水潑之。)

又云：治人熱毒疔瘡在口中方：

凝水石搗末研之，少少以敷瘡上，日三、四敷，即瘥。

治犯疔瘡方第二

《病源論》云：犯疔瘡者，謂疔瘡欲瘥，更犯觸之。若大 及食豬魚麻子並狐臭人氣熏 瘡皆能犯之，則更劇乃甚於初。更令瘡熱 腫，先寒後熱，四肢沉重，頭痛心驚，嘔逆煩悶 則不可治之。

《千金方》云：欲知犯狀，但脊強，瘡痛極甚，不可得忍。是犯狀，治之方：

多搗蒼耳汁飲並塗上。

又方：水四升，煮蛇蛻皮如雞子大，三、四沸，去滓服，立愈。

又云：若犯者：

取枸杞根切三升，以水五升，煮取一升。取滓研一錢，上和汁一盞服之，日二、三服。並單飲冷汁一、二盞彌佳。

《醫門方》療犯疔腫欲死者方：

搗菊葉取汁服之，冬月取根，神驗。

《錄驗方》治患疔瘡犯欲死方：

取磁石和酢封，立撥根出。

又方：石硫黃燒鐵著之。

又方：酢練磨石遍敷之，立瘥。

又方：取冬葵子服方寸匕，日二。

《救急單驗方》療犯疔瘡瘡根入腹欲死方：

取東行母豬糞和水絞汁飲一升，瘥。

又云：已死者：

取大黃龍湯一升，暖之，以木拗口，灌即活，甚驗。

治毒腫方第三

《病源論》云：毒腫之狀，與風腫不殊，時令人壯熱，其邪毒甚者，入腹殺人。

《經心方》治毒腫五香湯方：

沉香 青木香 薰陸香 丁香（各一兩） 麝香（半兩）
五味，以水五升，煮取一升半，分三服。

《劉涓子方》五香丸治惡氣腫毒方：

薰陸香（二分） 藿香（二分） 青木香（二分） 雞舌香（二分半） 鬼臼（二分）
大黃（八分） 當歸（五分） 升麻（三分） 朱砂（一分半） 牡丹（二分） 雄黃（一分）

上十一物，搗，下篩，蜜和為丸，清白飲一服四丸，丸如小豆大，日再。

又云：五毒膏治惡氣毒腫方：

蜀椒（二兩） 當歸（二兩） 朱砂（二兩） 烏頭（一升） 苦酒（一升半） 豬肪
（六斤） 巴豆（一升去心） 雄黃（二兩） 上八物，咀，以苦酒淹一宿，納豬肪，
合煎微火上，三上三下，藥成，向火摩腫上，日三。

《集驗方》治風熱毒腫結赤夜干膏方：

夜干（二兩） 常陸（切一升） 防己（四兩） 升麻（三兩）
四物，切，以豬膏三升，微火煎常陸小焦黃，絞去滓以摩病上。

《葛氏方》治猝患惡毒腫起稍廣急痛方：

燒牛屎末，以苦酒和敷上，燥複換之。

又方：搗荏子如泥塗上，燥複換之。

又方：以苦酒、升麻及青木香、紫真檀合磨以指塗痛處良。

又方：但以甘刀破上，泄去毒血及敷藥，彌佳。今按：取水蛭令吮去惡血，其方在治癰疽之方。

《千金方》治惡毒腫，或著陰卵，或偏著一邊，疼急痛變，牽入少腹不可忍，一宿殺人方：

取茴香草搗取汁飲一升，日三、四服。滓敷腫。此外國神方，從元嘉末來，用之起死人，神驗。

《救急單驗方》療一切惡腫疼痛不可忍無問冷熱大小方：

取葇荑子三枚，捻熟，捥勿令破，吞之驗。

《孟詵食經》毒腫方：

末赤小豆和雞子白，敷之立瘥。

《陶景本草注》毒腫方：

煮青木香浴大佳。

又方：服藍汁。

治風毒腫方第四

《病源論》云：風毒腫者，其先赤痛飆熱，腫上生瘰漿，如火灼是也。

《短劇方》云：有風熱毒相搏為腫，其狀先腫熱，上生瘰漿如火爍者名風熱毒也。治之如治丹毒法也。

《葛氏方》若風毒兼攻通身漸腫者方：

生苦參 菖蒲根 三白根 銚，各一斗，以水一石五斗，煮取一斗，去滓納好酒一升。溫服半升，日三。又洗身。

《極要方》療風毒初腫令消方：

大黃(二兩) 葶藶子(二兩，熬) 通草(二兩) 莽草(二兩)
上為散，水和敷腫上，燥易之，神效。

《耆婆方》治人風腫在皮上發有時方：

升麻(三兩) 夜干(二兩) 夕藥(二兩)
三味，切，以水三升，煮取一升，分三服。

治風腫方第五

《病源論》云：風腫者，腫無頭無根浮在皮上如吹也，不赤不痛，移無常處而兼癢。由 腠理虛而逢風所作。

《葛氏方》云：凡毒腫多痛，風腫多癢，按之隨手起，或疥癩、隱疹皆風腫。治之方：

但令人痛以手摩將抑，按數百過自消。

又方：炒蠶矢並鹽布裏熨之。

又方：苦酒摩，桂若獨活以敷之。

又方：楸葉浸水中以裹腫上。

又方：以鉞刀決破之出毒血便愈。

《經心方》白藪貼治風腫毒核癰疽方：

白藪(二兩) 黃芩(半兩) 草(半兩) 夕藥(一兩) 黃耆(一兩) 當歸(一兩)
大黃(半兩) 赤石脂(二兩)
八味，為散，以雞子白和粥塗紙貼上，燥複易。

《本草雲》：柞莧麻子油塗之。

治熱腫方第六

《病源論》云：其熱毒作者，亦無正頭，但急腫色赤而時惡寒壯熱，煩悶不安。

《極要方》療熱毒腫秘之不傳方：

皂莢刺(一握去兩頭)

上以水一大升，煮取半升，去滓頓服之，取利，其腫如湯沃雪。

又云：療一切熱毒腫忽發頸項胸背上即封不成膿方：

生地黃(二升) 香豉(半升) 芒硝(五兩)

上搗令熟，以敷腫上，濃二分，日五、六付，消止。

《救急單驗方》療熱毒腫方：

取桑樹東南根下土，和水作泥餅安腫上，以艾灸之，取熱應即止。男女並同。

《廣濟方》療熱毒腫方：

取牛脊骨燒為灰，以大酢和如泥塗上，乾易。

《耆婆方》治人熱腫疼痛方：

升麻(三兩) 夜干(二兩) 大黃(二兩) 芒硝(二兩) 青木香(一兩) 梔子(一兩) 甘草(半兩) 七味，銼，以水六升煮取三升，納芒硝攪令調。分三服，得下利即瘥。

治氣腫方第七

《病源論》云：氣腫病者，其狀如癰，無頭虛腫，色不變，皮上急痛，手才著便即痛是也。此風邪搏於氣所生也。

《短劇方》云：有氣腫病，其狀如癰，無頭虛腫，色不變，皮上急痛，手才著便覺痛。此由體熱當風複被暴冷涼折之，結成氣腫也。宜服五香連翹湯，白針氣瀉之，敷蒺藜薄，亦用小豆薄並得消也。(今按：五香連翹湯 在治惡核之方中。)蒺藜薄方：

蒺藜子二升，下篩，以麻油和如泥，熬令焦黑，以塗細故熱布上，剪如腫大勿開頭，拓之，無蒺藜可舂小豆下篩，雞子白和塗腫上，乾復塗之並得消也。（《集驗方》同之。）

治氣痛方第八

《病源論》云：氣痛者，人身忽然有一處痛，發作有時，痛發則小熱，痛靜便如冰霜所加，故云氣痛也。亦由體虛為風邪所侵，遇寒氣而折之，邪氣不出故也。

《短劇方》云：有氣痛病，身中忽有一處痛如打擗之狀，不可堪耐，亦左右走身中，發作有時，痛發時則小熱，痛靜時便覺其處如冷水霜雪所加。此皆由冬時受溫風，至春復暴寒涼來折之，不成溫病乃變作氣痛也。宜先服五香連翹湯數劑及竹瀝湯，摩丹參膏及以白酒煮楊柳樹皮，暖熨之，有赤氣點點見處宜去血也，其間將白薇散。小竹瀝湯 治氣痛方：

淡竹瀝(二升) 夜干(二兩) 杏仁(二兩) 茵芋(半兩) 黃芩(半兩) 白朮(二兩) 木防己(二兩) 防風(二兩) 秦膠(二兩) 茯苓(三兩) 麻黃(一兩) 獨活(二兩) 枳實(二兩) 夕藥(二兩) 甘草(二兩)

凡十五物，咀，以水九升，煮藥折半乃可納竹汁，煮取三升，分四服，少嫩人分作五服。白薇散 治風熱相搏結，氣痛，左右走身中，或有惡疹起者，積服湯，餘熱未平復，宜此白薇散以消餘熱方：

白薇(六分) 葳蕤(四分) 當歸(四分) 麻黃(三分) 秦膠(五分) 天門冬(四分) 蜀椒(二分) 木防己(四分) 柴胡(三分) 草(二分) 獨活(四分) 枳實(四分) 烏頭(二分) 朮(六分) 人參(四分) 夜干(六分) 山茱萸(四分) 防風(六分) 白芷(三分)

凡二十物，搗下絹篩，以酢漿服方寸匕漸至二七，日三。少嫩人隨長少減服之。毒微者可用酒也。（以上《集驗方》同之。）

治惡核腫方第九

《病源論》云：惡核腫者，肉裡忽有核，累累如梅李，小有如豆粒，皮內酸痛，左右走身中，猝然而起，此風邪挾毒所成。其亦似射工毒。初得無常處，多惻惻痛。不即治，毒入腹，煩悶惡寒即殺人也。久不瘥，則變作。

《短劇方》云：有惡核病者，肉中忽有核累累如梅李核狀，小者如豆粒，皮肉中酸痛，左右走人身中，壯熱 畏寒是也。與諸瘡痕癩癰、結筋相似。其瘡

痕癰癧要因瘡而生，是緩疾無毒。其惡核病，猝然而起，有毒，不治，入腹煩悶則殺人。南方多有此疾，皆是冬月受溫風，至春夏有暴寒冷相搏，氣結成此毒也。宜服五香連翹湯，以小豆薄塗之得消也。亦煮五香湯，去滓，時時洗漬之，消化之後，以丹參膏敷餘核令消盡，不消盡者，還敷小豆薄也。五香連翹湯 治惡脈及惡核，癰癧、風結諸核腫氣痛方：

青木香(二兩) 麝香(半兩) 沉香(二兩) 薰陸香(一兩) 雞舌香(一兩)
連翹子(二兩) 夜干(二兩) 升麻(二兩) 獨活(二兩) 寄生(二兩) 大黃(三兩) 甘草(二兩) 淡竹瀝(二升)

凡十三物，咀，以水九升煮藥，計水減半許可納竹瀝汁，又克取三升，分三服。丹參膏 治惡脈及惡核、癰癧、風結諸核腫氣腫痛方：

丹參(二兩) 蒴根(二兩) 草(半兩) 秦膠(一兩) 獨活(一兩) 躑躅花(半兩) 蜀椒(半兩) 白芨(一兩) 牛膝(一兩) 菊花(一兩) 木防己(一兩) 烏頭(一兩)

凡十二物，細切為善，以苦酒二升漬之一宿，夏月半日。急疾即煎之，以豬膏四升煎苦酒竭，勿令暴焦熬也，去滓以膏塗諸疾上，日五、六，至良。

《葛氏方》治惡核腫結不肯散者方：

烏根 升麻(各二兩) 以水三升，煮取半升，分再服，以滓熨上。

又方：燒白鵝屎，以水服三方寸七，以肉敷腫上。

又方：苦酒摩由躑塗之，搗小蒜敷之。

《錄驗方》治惡核腫毒入腹五香湯方：

薰陸香 射香 沉香 雞舌香 青木香(各二兩)

凡五物，以水六升，煮取二升半，適寒溫分用三服。不瘥復作，雲令劑可盡。五香各一兩，水四升，煮取三升，亦為二服。又滓敷腫上，神良。

《僧深方》：凡得惡腫皆暴卒，初始大如半梅桃，或有核。或無核，或痛或不痛，其長甚速，須臾如雞鴨大，即不治之腫。熱為進，煩悶拘攣，腫毒內侵，填塞血氣，氣息不通，再宿便殺人。初覺此病便急，宜灸當中央及繞腫邊灸之，令相去五分，使周匝腫上，可三七壯。腫盛者多壯數為瘥。腫進者，逐灸前際取住乃止。

又方：鯽魚搗敷腫上。

又方：啖鯽魚膾蒜齏。

《劉涓子方》治惡核腫毒湯方：

烏扇(二兩) 升麻(二兩) 梔子仁(十四枚, 破)
上三物, 切, 以水三升, 煮取一升半, 分再服。以滓敷腫上甚良。

《張仲景方》治消核腫黃 貼方：

黃(三兩) 真當歸(三兩) 大黃(三兩) 芎(一兩) 白朮(三兩) 黃芩(三兩)
防風(三兩) 夕藥(二兩) 雞子(十枚) 黃連(二兩)
凡十物, 搗, 篩, 以雞子白和塗紙上, 貼腫上, 燥易。

又方：搗茱萸以囊盛, 敷核上, 亦可令速消開, 多得效驗。

治惡肉方第十

《病源論》云：惡肉者, 身裡忽有肉如赤豆粒突出, 細細長乃如牛馬乳大, 亦如雞冠之狀, 不痛也, 亦久不治, 長不已。春冬被惡風所傷, 風入肌肉, 結瘀血積而生也。

《短劇方》云：有惡肉病, 身中忽有肉如赤豆粒突出, 便長推出不息, 如牛馬乳, 亦如雞冠狀也。不治其為自推出不肯止, 亦不痛癢也。此由春冬時, 受惡風入肌脈中變成此疾也。

治之宜服漏蘆湯, 外燒鐵爍之, 日日稍爍令焦盡也。爍竟以升麻膏敷之, 積日乃瘥耳。(今按：漏蘆湯、升麻膏在治丹之方。)

治惡脈病方第十一

《病源論》云：惡脈者, 身裡忽有赤絡, 脈起聚如死蚯蚓狀。看如似有水在脈中, 長短皆逐其, 絡脈所出見是也。由春冬受惡風, 入絡脈中, 其血瘀結所作也。

《短劇方》治惡脈病方：

宜服五香連翹湯及竹瀝湯，去惡血，敷丹參膏，積日則瘥。亦以白雄雞屎塗之。（《集驗方》同之。）

《劉涓子方》治惡脈腫毒方：

烏扇（二兩）升麻（二兩，生者用一兩）梔子（十四枚，擘破）
上三物，切，以酒三升，煮取一升半，分為再服，以滓敷腫上甚良。

又云：升麻湯治惡脈毒腫方：

升麻（一兩）吳茱萸（一兩）薰陸香（二兩）雞香舌（一兩）雄黃（一兩）鱉甲（一兩，炙）甘草（一兩）烏扇（三兩）青木香（一兩）
上九物，以水七升煮取二升半，適寒溫，分三服，相去一裡。治脈腫神良。
（今按：升麻湯，又有《短劇》治丹之方，藥種與此不同。）

治編病方第十二

《病源論》云：編病者，由勞役，肢體熱盛，因取風冷，而為涼濕所折，入於肌肉，筋脈結聚所成也。其狀赤脈起如編繩，急痛壯熱。其發於腳者，喜從鼠仆起至踝，赤如編繩，故謂編病也；其發於臂者，喜腋下起至手也，不即治取，其潰去膿則筋攣縮也；其著腳，若不治，不消，復不潰，其熱歇氣不散，變作 \square 。脈緩相薄，腫 \square 已成膿。

《短劇方》治 \square 病方：

宜服漏蘆湯，自下外以鋒針數去血氣，針瀉其結核處，敷小豆薄則消。皆可依治丹法消之，亦用治癰三物甘焦薄薄也。及至潰成膿，火針，敷膏散，亦如治癰法之。

《葛氏方》治皮肉猝腫起夾長赤痛名曰編方：

鹿角（一兩）白（一兩）牡蠣（四兩）附子（二兩，炮）
上四物，搗，下篩，苦酒和塗帛以貼之，乾複換之。

治療方第十三

《病源論》云：風邪毒瓦斯容於肌肉，隨虛處而停結為瘰癧。或如梅、李、棗等核大小，兩三相連皮間而時發寒熱是也。久則變膿潰成也。

《錄驗方》云：療瘰癧，唯須以員針針之，小者即消，大者即熟，然後出膿便瘥，隔日一針。

《千金方》云：一切瘰癧在項上及陰處，但有肉結凝似作及癰癤者方：

以獨頭蒜截兩頭卻心，作艾炷，秤蒜大小貼子上灸之，勿令上破肉但取熱而已。七壯一易蒜，日日灸之，取消止。

又方：白僵蠶為散，水服五分七，日三，十日瘥。

又方：乾貓舌末敷瘡上。

又方：野狼屎灰敷上。

《醫門方》治瘰癧方：

尖針針子令穿通，以石硫黃如豆大安針孔中，燒針筋令赤爍之，藥流入瘡中，其瘡瘥即消，極驗也。

《短劇方》治三十歲瘰癧瘦方：

海藻一斤，絹囊盛，好清酒二斗漬之，春夏二宿，服二合，酒盡復以酒二斗漬之，飲如上法，此酒盡爆海藻令燥，末，服方寸七，日三，藥無所禁。一劑不愈，更作不過三劑也。（今按：《葛氏方》治頸下瘰癧累累如梅李，宜使速消。）

《劉涓子方》治寒熱瘰癧在頸腋下皆如李大方：

人參(四分) 甘草(四分) 白芷(四分) 乾薑(四分)

凡四物，皆同分，治合篩，先食服方寸七，日三。少小服半方寸七，良。一方以酒服。

《范汪方》治瘰癧朝夕發熱龍骨散方：

龍骨(七分) 牡蠣(三分，一方分等)

凡二物，治合下篩，先食服五分七，日三。

《僧深方》治諸瘰癧因瘡壯熱方：

白藪灰(二升)

上一物，沸湯和如糜，熱以掩其上。甚良。

《廣利方》療瘰癧成 作孔方：

露蜂房二枚，炙末，和臘月豬脂，塗孔上。

治瘰方第十四

《病源論》云：瘰者，由憂恚氣結所生。亦由飲沙水，沙隨氣入於脈，搏頸下而成之。初作與櫻核相似，而當頸下也，皮寬不急，垂然是也。恚氣結成瘰者，但垂壘壘無核也。飲沙水成瘰者，有核壘壘無根，浮動在皮中。又云：三種瘰，有血瘰，可破之。有息肉瘰，可割之。有氣瘰，可具針之。

《養生方》云：諸山水裡土中出泉流者，不可久居。常食作瘰病，動氣增患。

《短劇方》云：有瘰病者，始作與櫻相似。其瘰病喜生頸下，當中央不偏兩邊也。皮寬不急，垂然則是瘰也。中國人患氣結瘰者，但垂無及也。長安及襄陽、蠻人其飲沙水善病沙瘰，有壘壘耳無根，浮動在皮中。

治諸瘰良方：

小麥一斗，以淳苦酒一斗漬小麥，令釋，漉出，爆令燥，燥復漬之，苦酒盡，曝麥燥，搗下篩，以海藻三兩，別搗末合治之。溫酒服方寸匕，日三，禁鹽、生魚、豬肉、生菜。數用有驗也。(今按：《龍門方》加昆布三兩。《范汪方》云：治三十年瘰及瘰癧。)

《千金方》治瘰方：

昆布二兩，切，如指大，酢漬，令咽汁盡則愈。

又方：灸風府穴百壯，又灸大椎百壯。

又方：灸大椎兩邊相去各一寸半少下垂各三十壯。(《短劇方》云：大椎上節以上屬頸，崇骨也，大椎與崇骨相接處，其節最高碩也。)

《葛氏方》治頸上猝結果漸大欲成瘰方：

海藻一斤，酒二斗漬一宿，稍稍含一、二合咽之。酒盡取滓末服方寸七，日三。

《范汪方》治瘦昆布丸方：

昆布(八兩) 海藻(八兩，洗)

凡二物，搗下篩，和以蜜丸。先食，含如半棗大，稍稍咽之。日五服，不知稍增，以知為度。

《效驗方》治瘦昆布丸方：

昆布(二分) 松蘿(二分) 海藻(五分)

凡三物，治合下篩，以白蜜丸如李子，含咀嚼咽其汁，日三夜二。

《極要方》治瘦海藻散方：

海藻(十分) 昆布(一兩) 海蛤(一兩) 通草(一兩) 松蘿(一兩) 乾薑(一兩) 桂心(一兩一方無乾薑，代白朮一兩。)

上七物，下篩，酒服方寸七，日三。

《耆婆方》治人氣瘦方：

松蘿(二兩) 海藻(三兩) 通草(二兩) 半夏(三兩洗一遍) 桂心(二兩) 海蛤(三兩) 昆布(三兩) 乾薑(六兩) 茯苓(二兩) 細辛(三兩) 桔梗(二兩) 上十一味，搗篩為散，以酒服一方寸七，日三。

又方：炒鹽薄之。

《玉箱方》治三十年瘦及瘰癧方：

海藻(八兩) 貝母(二兩) 土瓜根(二兩) 麥面(二分) 四味，作散，酒服方寸七，日三。(《經心方》同之。)

《廣利方》療瘦結氣方：

昆布(二大兩，暖水洗，去鹹味，寸切) 小麥(三大合) 以水二大升，煮取小麥熟，擇取昆布空腹含三、五斤，津液細細咽之，日再含。(忌生冷油膩。)

《病源論》云：瘤者，皮肉中忽腫起，初如梅李大，漸長大，不癢不痛，又不結強。言瘤結不散，謂之為瘤。不治，乃至大則不復痛。不能殺人，亦慎不可輒破之。

《范汪方》云：發腫都軟者，血瘤也。發腫狀如 雖極大，此肉瘤非癰也。

《千金方》治瘤病方：

礬石 芎 當歸 大黃 黃連 夕藥 白藪 黃芩(各二分) 吳茱萸(一分)
九味，為末，雞子黃和之，塗細故布上，隨瘤大小以敷貼之，乾即易。著藥當熟作膿脂 細細從孔出也。按卻膿血盡，著生肉膏。若膿不盡，復起故也。

又云：生肉膏主癰瘤潰漏及金瘡凡百瘡方：

當歸(一兩) 附子(一兩) 甘草(一兩) 白芷(一兩) 芎 (一兩) 生地黃 (五兩) 薤白(二兩) 七味，切，以豬脂二升半，煎白芷黃，去滓稍以敷之，日三。《僧深方》同之。

又云：凡肉瘤勿治，治殺人，慎慎之。

《僧深方》治血瘤方：

鹿肉割，炭火灸令熱，掩上拓之。冷復灸，令肉燒燥，可四灸四易之。若不除，灸七炷 便足也。

《玉箱方》楊樹酒治瘤瘰方：

河邊水所注楊樹根三十斤，熟洗細銼，以水一石，煮取五斗，用米三斗，面三斤釀之酒 成。服一升。(《集驗方》同之。)

治諸方第十六

《病源論》云：病之生，或因寒熱不調，致血氣壅結所作。或由飲食乖節，野狼鼠之精 入於腑臟，毒流注脈，變化而生。皆能使血脈結聚，寒熱相交，久則成膿而潰漏也。生身體 皮肉者，亦有始結腫，與石癰相似。所可為異者，其腫之中。按之累累有數核，喜發於頸邊，或兩邊俱起便是 証也。亦發兩腋下及兩顳 間，初作喜不痛不熱，若失時不即治生寒熱也。所發之處，而有輕重。重者有兩，一則發口上壁，有結核，大小無定，或如桃李大，此蟲之 窠窟，正在其中。二則發口之下，無有結核，而穿潰成瘡。

又云：蟲毒之居，或腑臟無定。故發身體，亦有數處，其相通者多死。其形狀起發之由，今辨於後章。

《養生方》云：六月，勿食自落地五果，經宿蚍蜉、螻蛄、蜚蠊游上，喜為九。十二月，勿食狗鼠殘肉，生瘡及出頸項及口裡，或生咽內也。

又云：決其死生者，反其目視之，其中有赤脈，以上下貫瞳子。見一脈一歲死；見一脈半，一歲半死；見二脈，二歲死；見二脈半，二歲半死；見三脈，三歲死。赤脈而不下貫瞳子，可治也。

又云：方說九者，是野狼、鼠、螻蛄、蜂、蚍蜉、蟻、浮疽、瘰癧、轉脈，此頸之九也。

又云：復有三十六種，方不次第顯其名。而有蜚蠊、蚯蚓等諸，非九之名，此即是三十六種之數也。

《短劇方》云：有者，始結腫與石癰相似，所可為異者，其一種中，按之累累有數核便是也。初作喜不痛不熱，即以練石薄敷之，內服防己連翹湯下之，便可得消。若失時不治結膿者，亦以練石薄敷，令速熟，熟用火針膏散。如治癰法。初作即以小豆薄塗之亦消。

又云：桐君說，赤小豆、白薤、黃芩、黃、牡蠣，凡五物，等分，下篩，酒服方寸匕。

治瘰癧諸 昆布丸方：

昆布(八兩，炙) 海藻(七兩，洗，炙) 小麥(一升，熬) 海蛤(五兩) 松蘿(四兩) 連翹(二兩) 白頭翁(二兩)

上七物，搗下篩，和蜜丸如梧子，服十九，日三。稍加三十丸。

《千金方》云：凡有似石癰，累累然作子，有核，在兩頸及腋下，不痛不熱者皆練石散敷，內服五香連翹湯下之。已潰者，療如癰法。(今按：五香連翹湯有治惡方。)

凡項邊、腋下先作瘰癧者，欲作漏也。宜禁五辛、酒、面及諸熱食。

又云：灸漏方：

搗生章陸根，捻作拌子，置漏上，以艾灸上，拌子熱易之。灸三四升艾，瘥。(《經心方》同之。)

又方：葶藶子二合，豉一升，二味合搗，令熟，作餅如大錢，濃二分許。取一枚當瘡孔上。作大艾炷如小指大，灸餅上，三炷一易，三餅九炷，日三。隔三日複一灸。

又方：灸 周四畔即瘥。

又云：治漏方：

搗土瓜根敷之，燥複易，不限時節。

又方：燒死蟻螂末，酢和塗之。

又方：死蛇灰，酢和敷之。

《葛氏方》通治諸方：

取地中潛行鼯鼠一頭，破腹去腸干之，火炙令可成屑末，以臘月豬脂和，敷瘡上。

又方：燒螻蛄作屑，豬膏和，敷之。

又方：白犬骨燒末以豬膏和敷之。

又云：治諸著口裡齒頰間者方：

東行母練根細銼三、四升，以水濃煮，取汁含之。數吐易，勿咽之。

《耆婆方》治人三十年瘡方：

取蒴根曝令土燥，槌去土，大釜中以水煮令熟，去滓，置大盆中，絞取清汁煎之，若盛複熟小器中煎，令如薄糊，納器中。若有痂，去之納煎。若病深，以雞毛取煎冷暖軟以納中，瘥乃止。取煎蒴，滓舉著其人，瘥。而不報息者，取滓燒還發也。秘之。

《廣濟方》療久不瘥方：

巴豆（一兩，去皮）大棗（一升）

上以水五升，煮取一升，絞去滓，更煎如稠餈，敷瘡上，日三。

《劉涓子方》治眾方不瘥效驗方：

取牡蒙數兩，搗之，湯和。適寒溫，取一升許，薄瘡上。冷復易。經日益佳。

《新錄方》治諸方：

露蜂房末酒服方寸匕。

又方：兔皮灰敷之。

又方：芥子末敷之。

又方：桃葉搗如泥封之。

《救急單驗方》療諸瘡方：

煎楸枝葉，淨洗瘡，納孔中大驗。

又方：石留黃末，置瘡孔中，以艾灸立驗。

《陶景本草注》諸方：

玄參，酒漬，飲之良。

又方：□鼠蹄，燒末，酒服之。

《蘇敬本草注》諸方：

馬莧，搗，揩之。

又方：食雉肉，良。

《崔禹錫食經》諸方：

食一、兩斤蕨，終身不病也。

治野狼方第十七

《病源方》云：野狼者，年少之時，不自謹慎，或大怒，氣上不下之所生也。始發之時，在於頸項，有根出缺盆，上轉連耳本，根在肝。

《劉涓子方》治野狼 為病，始發於頸，腫有根，起於缺盆，上轉連耳本。此因憂、恚，氣上不得下。空青(二分) 燥腦(二分) 燥肝(一具) 芎 (半分) 獨活(一分) 女 婦草(一分) 黃芩(一分) 鱉甲(一分) 斑蝥(一分) 乾薑(一分) 當歸(一分) 蜀椒(三十枚) 茴香(一分) 礬石(一分) 地膽(一分) 十五物，搗，下篩。酒服方寸七，日三。十五日服之。

治鼠方第十八

《病源論》云：鼠 者，飲食之時不擇，蟲蛆之毒而變化，入於臟，出於脈，不去使人 寒熱。其根在肺，出於頸項。

《千金方》療鼠 瘡瘻後複發，及不愈出膿血不止方：

以不中水豬脂， 咀生地黃，納脂中，令脂與地黃足相淹和，煎六、七沸。桑灰汁淨洗 瘡去惡汁，以地黃膏塗上，日一易。

又云：鼠 腫核痛未成膿方：

以柏葉敷著腫上，熬鹽著葉上熨之，令熱氣下即消。神良。

又云：治風 及鼠 方：

赤小豆 白藪 黃 牡蠣

凡四味，等分，酒服方寸七，日三。(今按：《短劇方》加黃芩治諸)

《葛氏方》治鼠 方：

取槲白皮濃煮取二升，服一升，當吐鼠子。

又方：搗車前草以敷之。

又方：巴豆去心皮，以和艾作柱，灸瘡上。

又方：取小鼠子剝去皮，炙令燥，搗末，以臘月豬膏和，敷之。

又云：若已有口，膿血出者，以熱牛屎塗之，日三。

《范汪方》治頸鼠 累累方：

貝母(二分) 乾薑(一分) 桂心(一分) 蜀椒(一分) 吳茱萸(一分) 本(一分)

凡六物，治，下篩。先食，以酒服一撮，良。

《錄驗方》：治鼠 及癰三十年：

烏頭散方：

烏頭(一兩) 黃柏(二兩)

凡二物，治下篩。酒服一刀圭，日八夜四，起令藥熱相繼，初得癰，即服良。

《劉涓子方》治鼠 方：

又方：死蜚螂，燒作屑，苦酒和，塗之。

《經心方》治鼠 方：

燒地黃葉，貼上得瘥。

又云：鼠子，結核未破者，用大針針之，無不瘥。

治螻蛄方第十九

《病源論》云：螻蛄者，食果瓜子，不避有蟲，既便啖食之。有毒不去，變化所生也。在於頸上，狀如蝸形，癰疹而出，其根在大腸。

《集驗方》治螻蛄 方：

取螻蛄腦二七枚，酒和敷上。

《千金方》有螻蛄 方：

槲葉灰，先以泔漬，煮槲葉取汁，洗拭乾，納灰瘡中。

《劉涓子方》治螻蛄，始發於頸，狀如腫。此得之食果子瓜實毒不去核。龍骨(半分) 桂心(一分) 乾薑(一分) 桔梗(一分) 礬石(一分) 附子(一兩) 獨活(一分) 芎(半分) 蜀椒(一百枚)

上九物，搗，下篩，別取乾棗二十枚去核，合搗之，取酢漿和之便得丸。日服五，丸如大豆，溫漿服之。

治蜂方第二十

《病源論》云：蜂者，食飲勞倦，渴乏多飲流水，即得蜂毒，蜂毒不去，變化所生也。發在頸，三、四處俱腫，以潰生瘡，狀如癰形，瘡而複移，其根在脾。

《劉涓子方》治蜂，始發於頸，癰癰三、四處俱腫，連以潰移。此得之多飲流水，水有蜂餘毒不去。蜂房（一具）螫甲（一分）茴香子（一分）茱萸（一分）椒（二百枚）乾薑（一分）

上六物，搗，下篩作散，敷瘡孔口上，日十度。

《千金方》有蜂方：

人屎，蛇蛻灰臘月豬膏和之，敷孔中。

又方：蜂窠灰，臘月豬膏和，敷孔中。

《葛氏方》云：若著鼻內外，查瘤血出者，是蜂。取觚、蜂房，火炙焦末，溫酒服方寸匕，日一。

治蚰蟬方第二十一

《病源論》云：蚰蟬者，因寒，腹中臃脹，所得寒毒不去，變化所生也。始發之時，在其頸項，使人壯熱若傷寒，有似疥癬，婁婁孔出，其根在肺。

《劉涓子方》治蚰蟬，始發於頸，初得如傷寒。此因食中有蚰蟬毒不去。桃白皮（一分）白朮（四分）知母（一分）雌黃（一分）乾地黃（一分）皮（四分）獨活（一分）椒（一百枚）青黛（一分）斑蝥（一分）白芷（一分）柏脂（一分）夕藥（一分）海苔（一分）當歸（一分）

上十五物，合搗作散，下篩，服一錢匕，日三。病在裡空腹服，在外先食後服之。又方：

無斑蝥、朮。

治蟻螻方第二十二

《病源論》云：蟻螻者，恐懼愁憂思慮，哭泣不止，餘毒變化所生也。始發之時，在其頸項，無頭尾，如棗核，或移動皮中，使人寒熱心滿，其根在心。

《劉涓子方》云：治疔瘡，始發頸，無頭尾，如棗核塊，塊多在皮中，使人寒熱心滿。此因喜怒哭泣。空青(二分) 當歸(二分) 細辛(一兩) 乾肉〔一分(一方用皮)〕 枸杞根(一分) 斑蝥(一分，去翅) 地膽(一分) 乾烏腦(如三大豆) 上八物，合治下篩，作散。服方寸匕，日三，以酢漿下散。病在上，倒輪臥；在下，高枕，使藥流下。

治浮沮方第二十三

《病源論》云：浮疽者，因患結馳思，往反變化所生。始發之時，在於頸項，亦在腋下，如兩指無頭尾，使人寒熱欲嘔吐，其根在膽。

《劉涓子方》：治浮疽，始發於頸，如兩指，使人寒熱欲臥。得之因思慮憂滿，其根在膽。地膽主之。甘草為佐方：

石硫黃(一分) 乾薑(一分) 龍膽草(二分) 細辛(二分) 地膽(一分，去翅) 石決明(一分，去皮) 續斷(一分) 大黃(半分) 陰蘆根(一分) 上九物，下篩，敷瘡上，日四、五。

治療方第二十四

《病源論》云：瘰癧者，因強力入水，坐濕地，或新沐浴，汗入頭中，流在頸上之所生也。始發之時，在其頸項，恆有膿，使人寒熱，其根在腎。

《劉涓子方》：治療瘰癧，始發於頸，有根，令人寒熱，此得之新沐，汁入頭中，下流於頸。茯苓(一兩) 續斷(一分) 礬石(二分) 乾地黃(一分) 空青(一分) 石(一分，煉) 乾薑(一分) 桔梗(一分) 蜀椒(一分) 恆山皮(一分) 斑蝥(一分) 烏腦(一分，熬) 附子(一合，炮) 乾薑(一分) 乾狸肉(一分)

上十五物，搗合下篩，以白蜜和，酒服如大豆十丸，日再。

治轉脈方第二十五

《病源方》云：轉脈者，因飲酒大醉，夜臥不安，驚欲嘔，轉側失枕之所生也。始發之時，在於頸項，濯濯脈轉。身如振使人寒熱，其根在小腸。

《劉涓子方》：治轉脈，始發於頸，濯濯脈轉，身始振，寒熱。此得之驚臥失枕。綠青(二分) 人參(二分) 當歸(二兩) 升麻(一分) 麥門冬(一兩，去心) 大黃(二分) 鐘乳(二分) 桂心(二兩) 甘草(半分) 防風(一分) 白朮

(一分) 地 膽(一分) 續斷(一分) 麝香(一分, 末) 石(半分生用之)
上十五物, 合搗, 下篩, 麝香末篩合, 更搗令調, 白蜜和如大豆, 溫酒服十丸,
日三。勿食生菜、生魚、肥肉, 忌房內, 滿百日令得, 都瘥。

治蜚蠊方第二十六

《病源論》云：蜚蠊 者，由飲食居處，有蜚蠊之毒瓦斯，入於臟腑，流於經脈所生也。初生之時，其狀如鼠乳，直下腫如覆手，而癢，搔之疼痺，至百日有七，八孔，入三寸，中 生蜚蠊，乃有百數，蜚蠊成尾，自覆刺人，大如盂升，至三年殺人。

《千金方》：治蜚蠊 方：

牛屎灰，和臘月豬膏敷之。

又方：熱牛屎塗之。

治蚯蚓方第二十七

《病源論》云：蚯蚓 者，由居處飲食，有蚯蚓之氣，或因飲食入腹內，流於經脈所生。其根在大腸，其狀，腫核潰汁漏之。

《集驗方》：蚯蚓 方：

取螻蛄腦二七枚，酒和敷瘡上。

《劉涓子方》：治蚯蚓 方：

鴨膏和胡粉，敷瘡上，已靈。

《千金方》：有蚯蚓 方：

蚯蚓尿、雞尿末之，以二月牡豬下頷髓和敷。

治蟻方第二十八

《病源論》云：蟻 者，由飲食有蟻精氣，毒入於五臟，流出經脈，多著頸項，戢戢然 小腫核細，而乃遍身體。

《集驗方》：蟻 方：

半夏一果，搗作屑，以鴨膏和，敷瘡上。

《千金方》：蟻 方：

皮、肝、心灰末，酒服一錢七。

又方：雄雞灰末敷之。

又方：鼠灰敷之。

《葛氏方》：若瘡多而孔少者，是蟻 。燒陵鯉鰓甲，豬膏和敷，佳。

治蠍方第二十九

《病源論》云：蠍 者，飲食居處，有蠍之毒瓦斯，入於臟流於經脈。或生腋下，或生頸 邊，腫起如蠍蟲之形，寒熱而潰成 。久則瘡裡生細蠍。

《千金方》：有蠍 ，五孔，六孔皆相通方：

搗茅根汁，著納孔中。

治蝦蟆方第三十

《病源論》云：蝦蟆 者，飲食流於經脈，結腫寒熱，因潰成 。服藥有物隨小便出，如蝦蟆之狀。

《千金方》：有蝦蟆 方：

五月五日蛇頭及野豬脂付水衣敷之佳。

治蛙方第三十一

《病源論》云：蛙 者，飲食居處有蛙之毒瓦斯，入於臟流於經脈而成 。因服藥隨小便 出物，狀如蛙形是也。

《千金方》：有蛙 方：

蛇腹中蛙灰敷之。

治蛇方第三十二

《病源論》云：蛇者，居處飲食有蛇毒瓦斯，入於臟，流於脈。寒熱結腫，出處無定，因潰成。服藥有物隨小便出，如蛇形。

《千金方》：有蛇方：

蛇蛻灰，臘月豬脂和敷之。

治方第三十三

《病源論》云：者，由居處飲食，有之毒瓦斯，入於臟流於經脈所生。初得之時，如棗核許，或滿百日，或滿周年，走不一處，成孔膿汁潰漏。

《千金方》有方：

搗瓜根敷，至瘥。慎口味。

治雀方第三十四

《病源論》云：雀者，居處飲食，有雀之毒瓦斯，入於臟，流於脈，發無定處，因潰成。服藥有物隨小便出，狀如雀□。

《千金方》有雀方：

母豬屎灰，和臘月豬膏敷，蟲出如雀形。

治石方第三十五

《病源論》云：石之狀，初起兩頭如梅李核，斲實按之強如石而寒熱，熱後潰成。

《千金方》有石從兩頭出者，其狀堅實，令人寒熱方：

以大鉞針破之，鼠粘草二分末，和雞子一枚敷之。

又方：搗槐子和井花水敷之。

治風方第三十六

《病源論》云：風者，由風邪在經脈，經脈結聚所成也。

《經心方》：治風 鼠 方：

桑白皮七、八斤，細銼，水二斗，煮取汁一斗，更煎汁，取二升半，頓服下，蟲瘥。

又方：燒地黃葉貼上得瘥。

又方：杏仁一升，熟搗，和生豬脂敷上。

《千金方》：風 及鼠 方：

赤豆 白蘘 黃 牡蠣 四味等分，酒服方寸匕，三。

治內方第三十七

《病源論》云：內 者，人有發瘡，色黑有結內有膿，久乃潰出，侵食筋骨，謂之內 。

《龍門方》：治內 方：

取槐白皮十兩搗丸綿裹，納下部驗。

又方：煎楸葉，作煎稠，堪丸，以竹筒納下部，蚘、痔、悉瘥。

治膿方第三十八

《病源論》云：諸 皆有膿汁，此 獨以膿為名者，是諸瘡久不瘥成，而重為熱氣所 乘，毒瓦斯停積生膿，常不絕，故謂之膿 。

《千金方》有膿 方：

桃花末和豬脂敷之。

又方：鹽，面和，燒灰敷之。

《龍門方》：膿出方：

石硫黃末，置瘡孔中，以艾灸立驗。

《本草》膿出方：

楊盧木，水煮葉汁。洗之，立瘥。

治冷方第三十九

《病源論》云：冷者，亦是諸瘡得風冷，久不瘥，因成，膿汁不絕，故為冷。

《千金方》：凡一切冷方：

燒人吐出蛔蟲灰，先甘草湯洗，後著灰，無不瘥者，慎口味。