

卷第二十二

妊婦脈圖月禁法第一

《產經》云：黃帝問曰：人生何如以成。歧伯對曰：人之始生，生於冥冥，乃始為形，形容無有擾，乃為始收，妊身一月曰胚（芳杯反），又曰胞，二月曰胎，三月曰血脈，四月曰具骨，五月曰動，六月曰形成，七月曰毛髮生，八月曰瞳子明，九月曰穀入胃，十月曰兒出生也。（今按：《太素經》云：一月膏，二月脈，三月胞，四月胎，五月筋，六月骨，七月成，八月動，九月躁，十月生。）

夫婦人妊身，十二經脈主胎，養胎當月不可針灸其脈也，不禁皆為傷胎，複賊母也，不可不慎，宜依月圖而避之。

懷身一月，名曰始形，飲食必精熟暖美，無御大（丈）夫，無食辛腥，是謂始載負也。（《病源論》云：宜食大麥。）

一月足厥陰脈養，不可針灸其經也，厥陰者是肝，肝主筋，亦不宜為力事，寢必安靜，無令恐畏。上肝脈穴，自大敦上至陰廉，各十二穴。又募二穴，名期門；又輸二穴，在脊第九椎節下兩旁，各一寸半。上件諸孔，並不可針灸，犯之致危。

足厥陰肝脈圖（缺）

懷身二月，名曰始膏，無食辛燥，居必靜處，男子勿勞，百節骨間皆病，是謂始藏也。（《病源論》云：勿食辛腥之物，二月之時，兒精成也。）

足少陽膽脈圖（缺）

二月足少陽脈養，不可針灸其經也。少陽者內屬於膽，當護慎，勿驚之。上膽脈穴自竅陰上至環跳，各十三穴，又募二穴，名日月，在期門下五分。又輸二穴，在背第十椎節下兩旁，各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身三月，名曰始胎。當此之時未有定儀，見物而化。是故應見王公、後妃、公主、好人，不欲見僕者、侏儒、丑惡、瘦人、猿猴。無食苗薑兔肉。思欲食果瓜，激味酸菹瓜，無食辛而惡臭，是謂外像而內及故也。

三月手心主脈養，不可針灸其經也。心主者，內屬於心，心無悲哀，無思慮驚動之。

手心主脈圖（缺）上心胞脈穴自中沖上至天府，各八穴。又募一穴，名曰巨闕，在心鳩尾下一寸五分。又輸二穴，在背第五椎節下兩旁各一寸半。上件諸穴，並不可犯也。

懷身四月，始受水精，以盛血脈。其食稻粳，其羹魚雁，是謂盛血氣以通耳目，而行經絡也。

四月手少陽脈養，不可針灸其經也。手少陽內屬上焦，靜安形體，和順心志，節飲食之。

手少陽三焦脈圖（缺）上三焦脈穴自關沖上至消灤，各十二穴。又募一穴，在當臍下二寸，名為石門。又背輸二穴，在脊第十三椎節下兩旁各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身五月，始受火精，以盛血氣，晏起沐浴浣（胡管反）衣，身居堂，必濃其裳。朝吸天光，以避寒殃（於良反）。其食稻麥，其羹牛羊和茱萸。調以五味，是謂養氣，以定五臟者也。

五月足太陰脈養，不可針灸其經也。太陰者，內屬於脾。無大飢，無甚飽，無食乾燥。無自灸熱大勞倦之。

足太陰脾脈圖（缺）

上脾脈穴自隱白上至箕門，各十二（三）穴。又募二穴，名章門，在季肋端，側臥取之。

又輸二穴，在脊第十一椎節下兩旁各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身六月，始受金精，以成筋骨。勞身無處，出游於野，數觀走犬，走馬，宜食鷲鳥猛獸，是謂變腠理筋細筋，以養其爪，以堅背脊也。

六月足陽明脈養，不可針灸其經也。陽明內屬於脾，調和五味，食甘，甘和，無大飽。

足陽明胃脈圖（缺）

上胃脈自厲兌上至髀關，各十六穴。又募一穴，名中管，在從心蔽骨下以繩量至臍止，即以繩中折之。又輸二穴，在脊第十二椎節下兩旁，各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身七月，始受本精，以成骨髓。勞躬搖肢，無使身安，動作屈伸，自比於猿。居必燥之。飲食避寒，必食稻粳，肌肉，以密腠理，是謂養骨而堅齒也。

手太陰肺脈圖¥pyxfc8.bmp (缺)

七月手太陰脈養，不可針灸其經也。太陰者，內屬於肺。無大言，無號哭，無薄衣，無洗浴，無寒飲之。右肺脈穴自少商上至天府，各九穴。又募二穴，名中府，在兩乳上三肋間陷者中。又輸二穴，在背第三椎節下兩旁，各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身八月，始受土精，以成膚革。和心靜息，無使氣控(極)，是謂(密)腠理而光澤顏色也。

八月手陽明脈養，不可針灸其經也。陽明者，內屬於大腸。無食燥物，無忍大起。

手陽明大腸脈圖¥pyxfc7.bmp (缺)

上大腸脈穴自商陽上至臂，各十四穴。又募二穴，在臍兩旁，各二寸半，右名天樞，左名谷門。又輸二穴，在脊第十六椎節下兩旁，各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身九月，始受石精，以成皮毛，六腑百節莫不畢備；飲醴食甘，緩帶自持而待之，是謂養毛髮多才力也。

九月足少陰脈養，不可針灸其經也。少陰內屬於胃，無處濕冷，無著灸衣。

足少陰腎脈圖¥pyxfc9.bmp (缺)

上腎脈穴自湧泉上至陰谷，各十七穴。又募二穴，在腰目中季肋，本俠脊腠肉前宛宛中，名京門。又輸二穴，在脊第十四椎下兩旁，各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

懷身十月，俱已成子也。時順天生，吸地之氣，得天之靈。而臨生時乃能啼，聲遂天氣，是始生也。

十月足太陽脈養，不可針灸其經也。太陽內屬於膀胱，無處濕地，無食大熱物。

足太陽膀胱脈圖¥pyxfc10.bmp (缺)

上膀胱脈穴自至陰上至扶承，各十六穴。又募一穴，在臍下直四寸，名中極，又輸二穴，在脊第十九椎節下兩旁，各一寸半。上件諸穴，並不可犯之。

妊婦修身法第二

《產經》云：凡妊身之時，端心正坐。清虛如一，坐必端席，立不斜住(經)，行必中道，臥無橫變，舉目不視邪色，起耳不聽邪聲，口不妄言，無喜怒憂恚，思慮和順，猝生聖子，產無橫難也。而諸生子有痴、疵、丑惡者，其名皆在其母，豈不可不審詳哉。

又云：文王初妊之時，其母正坐，不聽邪言惡語，口不妄語，正行端坐，是故生聖子，諸賢母宜可慎之。

又云：妊身三月，未有定儀，見物而為化，是故應見王公、後妃、公主、好人。不欲見僂者、儒侏、丑惡、瘁(秦醇反，病也)人、猿猴。其欲生男者，操弓矢射雄雉，乘牡馬走田野，觀虎豹及走馬。其欲生女者，著簪珥施環。欲令子美好者，數視白玉美珠，觀孔雀，食鯉魚。欲令子多智有力者，當食牛心，御大麥。欲令子賢良者，坐無邪席，立無偏行，是謂以外像而內化者也。

《千金方》云：凡受胎三月，逐物變化，稟質未定。故妊身三月，欲得見犀象猛獸，珠玉寶物，欲得見賢人君子，盛德大師，禮樂、鐘鼓、俎豆、軍旅陣設，焚燒名香，口誦詩書，居處簡靜，割不正不食，席不正不坐，彈琴瑟，調心神，和情性，節嗜欲，生子皆長壽無疾。

《養生要集》云：婦人妊身大小，行勿至非常之地，逆產殺人。

又云：婦孕見麋而生兒，其四目。

又云：孕婦三月，不得南向洗浴，胎不安。

又云：婦孕三月，不得南向小便，令兒暗啞。

又云：婦孕三月，不得兩鏡相照，令兒倒產。

《膳夫經》云：妊身勿北向，向其生年上大小便，使母難。

妊婦禁食法第三

《養生要集》云：婦人妊身，不得食六畜肉，令兒不聰明。（一云：壞胎。）

又云：勿食豬肝，令胎不生。

又云：勿食兔肉，令子唇缺，亦不須見之。

又云：勿食雞子乾鱈魚，使子多瘡。

又云：勿不得食魚頭，胎損。

又云：食鯉膾，令兒多瘡。

又云：勿食生薑，令子盈指。

又云：勿食乾薑、桂、甘草，令胎消，胎不安。

又云：勿飲冰漿，令胎不生。

又云：勿食杏仁及熱飴，破損傷子。

又云：勿以炙雀並大豆醬食，令胞漏，使兒多。

又云：勿飲酒，多食雀肉，使子心淫精亂。

又云：勿食雀肉，令兒多所欲。

又云：勿食雀肉並雀腦，令人雀盲。

又云：勿食雀並梨子，令子短舌。

又云：麋並梅、李實，食之，使人清盲。

《崔禹錫食經》云：妊身不可食鳩，其子門肥充，病於產難故也。

《朱思簡食經》云：勿食豬肉，令子暗啞無聲。

又云：飲酒醉，令兒癩癩。

《本草食禁》云：妊身食雞肉並糯米，使子腹中多蟲。

《產經》云：女人胎妊時，多食鹹，胎閉塞。

妊身多食苦，胎乃動。

妊身多食甘，胎骨不相著。

妊身多食酸，胎肌肉不成。

妊身多食辛，胎精魂不守。

今按：妊婦不可服藥八十二種，其名目在《產經》。

治妊婦惡阻(側呂反, 病)方第四

《病源論》云：惡阻病者，心中憤憤，頭重眼眩，四肢沉重；懈惰不欲執作，惡聞食氣，欲啖酸果實，多臥少起，世雲惡食，又云惡字是也。乃至三四月日以上，大劇者，吐逆不能自勝舉也。此由婦人本虛羸，血氣不足，腎氣又弱，兼當風取冷太過，心下有痰水，挾之而有娠也，經血既閉，水漬(漬)於臟，臟氣不宣，故心煩憤，氣逆則嘔吐也。血脈不通，經絡痞澀，則四肢沉重，挾風則頭痛眩。故欲有胎，而病惡阻，所謂欲有胎者，其人月水尚來。而顏色肌膚如常，但苦沉重憤悶，不用食飲，不知患所在，脈理順時平和，則是欲有胎也。如此經二月，日後便覺不通，則結胎也。

《產經》云：半夏茯苓湯治妊身阻病，心中憤悶。空煩，吐逆，惡聞食氣，頭重，四肢百節疼煩沉重，多臥少起，惡寒汗出。疲極黃瘦方：

半夏(五兩) 生薑(五兩) 茯苓(三兩) 旋複花(一兩) 橘皮(二兩) 細辛(二兩) 芎 人參(二兩) 夕藥(二兩) 乾地黃(三兩) 澤瀉(二兩) 甘草(二兩) 凡十二物，以水一斗，煮取三升，分三服。若病阻積日月不得治，及服藥冷熱失候，病變客熱煩渴。口生瘡者，除橘皮、細辛，用前胡、知母，各二兩。若變冷下者，除乾地黃，用桂肉二兩。若食少，胃中虛生熱，大行閉塞，小行赤少者，宜加大黃三兩，除地黃，加黃芩一兩，餘藥依方服一劑，得下後消息者氣力冷熱更增，損方調定，即服一劑，陽便急將茯苓丸，令得能食，便強健也。(《短劇方》同之。)

《短劇方》云：茯苓丸治妊身阻病，患心中煩悶，頭重眩目，憎聞飯氣，便嘔逆吐悶顛倒，四肢痿熱。不自勝持，服之即效。要先服半夏茯苓湯兩劑，後將茯苓丸也。

茯苓(一兩) 人參(二兩) 桂肉(二兩) 乾薑(二兩) 半夏(二兩) 橘皮(一兩) 白朮(二兩) 枳實(二兩) 葛根屑(一兩) 甘草(二兩)

凡十物，搗篩，蜜和丸如梧子，飲服二十丸，漸至三十丸，日三。《產經》同之。

《集驗方》云：治妊身二三月，惡阻嘔吐不下食方：

青竹茹(三兩) 生薑(四兩) 半夏(五兩) 茯苓(四兩) 橘皮(三兩)
凡五物，切，以水六升，煮取二升半，分三服。

又云：治妊身嘔吐不下食，橘皮湯方：

橘皮(三兩) 竹茹(三兩) 人參(三兩) 朮(三兩) 生薑(四兩) 濃朴(二兩)
凡六物，切，以水七升，煮取二升半，分三服。

《僧深方》云：治婦人妊身惡阻，酢，心胸中冷，腹痛不能飲食，輒吐青黃汁方。用：

人參 乾薑 半夏

凡三物，分等，治下，以地黃汁和丸如梧子，一服三丸，日三。今按：《極要方》云：

各八分，稍加至十丸。《產經》云：人參丸神良。

《醫門方》云：凡妊娠阻病惡食，以所思食任意食，必愈。(今檢：《延齡圖》云：令子聰明賢善端正也。)

治妊婦養胎方第五

《僧深方》云：養胎易生丹參膏方：

丹參(四兩) 人參(二分，一方二兩) 當歸(四分) 芎(二兩) 蜀椒(二兩)
白朮(二兩) 豬膏(一斤)

凡六物，切，以真苦酒漬之，夏天二三日，於微火上煎，當著底絞之，手不得離，三上三下。藥成，絞去滓，以溫酒服如棗核，日三。稍增可加。若有傷，動見血，服如雞子黃者，晝夜六七服之，神良。妊身七月便可服，至坐臥忽生不覺。又治生後餘腹痛也。(今檢：《產經》云：丹參一斤，當歸四兩，芎八兩，白朮四兩，蜀椒四兩，脂肪四斤。云云)

《千金方》云：安胎魚法：

鯉魚二斤，生者去鱗臟，粳米一斤，石相和作，少著鹽，勿著豉酢，啖之，日別三過，食之滿十個月。

又方：取鯉魚長一尺者，水自沒納鹽煮飲之。

《本草拾遺》云：鯉魚肉主安胎動懷妊身腫煮為湯食。

治妊婦悶冒方第六

《短劇方》云：妊身忽悶冒不識人，須與醒，醒復發，亦仍不醒者，名為瘧病。亦號子癩也，亦號冒也。治之方：

急作淡竹瀝汁與之。無淡竹者，桂竹亦善，複宜服治瘧冒葛根湯。

《集驗方》云：妊身恆苦煩悶者，此子煩也。治之方：

時時服竹瀝，隨多少，良。

治妊婦胎動不安方第七

《病源論》云：胎動不安者，多因勞役，或觸冒冷熱，或飲食不適，或居處失宜，輕者轉動不安，重者便致傷胎。

《醫門方》云：凡候胎動法：母唇口青者，兒死母活；唇口中青沫出者，子母俱死；口赤舌青沫出者，母死兒活。

又云：夫胎動不安方：

煮好銀，取汁煮蔥羹，服之佳。（今按：《博濟安眾方》：胎動欲墮，腹痛不可忍方：苧根去皮，切一升，銀五兩，上以清酒一升，水一升，煎取一升，溫分四服即止。）

又云：療妊娠腹內冷，致胎動不安方：

乾薑（三兩） 芎（四兩） 艾（二兩）
水六升，煮取二升半，分二服。

又方：蔥白（切，一升） 當歸（四兩） 清酒（五升）
煮取二升半，分溫二服，大效。

又云：療妊娠忽被驚愕，胎向下不安，少腹痛連腰。並下血方：

當歸 芎（各八分）阿膠（炙）人參（各六分）大棗（十二枚）艾葉（八分）茯苓（十分）

水七升，煮取二升半，分三服，服之相去八九裡。

《短劇方》云：治妊身腹中冷，胎不安方：

甘草 當歸（各二兩）乾薑（三兩）大棗（十二枚）

凡四物，以水五升，煮取三升，分三服。

又云：治母有勞熱動胎，胎不安，去血。手足煩方：

生甘竹皮（二升）當歸（二兩）芎（一兩）黃芩（半兩）

凡四物，以水一斗，煮竹皮取六升汁，去滓。納煎取三升，分三服。

《葛氏方》云：妊身猝胎動不安，或胎轉搶心，或下血不止方：

蔥白一把，以水煮令蔥熟，飲其汁。（今按《本草》云：某草一把者二兩為正。）

又方：生魚二斤粳米一斤，調作，頓食之。

《集驗方》云：治妊身胎動，晝夜叫呼。口禁唇寒及下利不息方：

已治艾葉一，以好酒五升，煮取四升，去滓，更煎取一升，一服。口閉者，開口灌之，藥下即安。（今檢：《僧深方》云：艾及葉物一者，以二升，為正。）

又云：治妊身二三月至八九月，胎動不安。腰痛已有所見方：

艾葉（三兩）阿膠（三兩，炙）芎（三兩）當歸（三兩）甘草（一兩半，炙）切，以水八升，煮取三升，去滓（滓），納膠，更上火，膠消分三服。

《產經》云：治妊身七八月，腰腹痛，胎不安，汗出逆冷，飲食不下，氣上煩滿。四肢痺強當歸湯方：

當歸(三兩) 夕藥(二兩) 乾地黃(三兩) 生艾(一把) 甘草(一兩) 膠(四兩, 炙) 生薑(一兩) 橘皮(二分)

上八物, 切, 以水一升(斗), 煮得三升, 去滓, 納膠, 令烱, 分四服之。

又云：妊身臨生月胎動不得生方：

桑上寄生(五分) 甘草(二兩) 桂心(五分) 茯苓(五分)

上四物, 以水七升, 煮得二升, 分三服。

《錄驗方》治胎不安生鯉魚湯方：

生鯉魚(一頭, 重五斤) 乾薑(二兩) 吳茱萸(一兩)

凡三物, 切, 以水一升(斗), 兒煮鯉魚五沸, 出魚, 納藥, 煎取三升, 服一升, 日三。

治妊婦數落胎方第八

《病源論》云：陽施陰化, 故得有胎。營衛和調, 則經養周之, 故胎得安而能成長。若血氣虛損者, 子臟為風冷所傷, 不能養胎, 所以數墮胎。妊娠而恆腰痛者, 喜墮胎也。

《產經》云治數落胎方：

作大麥豉羹食之, 即安胎。

又方：取母衣帶三寸燒末, 酒服即安。

《錄驗方》云：治妊身數落胎方：

以生鯉魚二斤, 粳米一升, 作 , 少與鹽啖之, 日(月)三過, 食至兒生。

治妊婦胎墮血不止方第九

《病源論》云：妊身胎墮損經脈, 故血不止也。瀉血多者致死。

《葛氏方》云：治胎墮血露不盡方：

艾葉(半斤) 酒(四升)

煮取一升, 頓服之。

《極要方》云：治胎墮血不止方：

丹參(十二兩) 酒(五升)
煮取三升，分三服即止。

又方：阿膠(五兩，炙) 乾地黃(五兩)
以酒五升，煮取一升半，空腹分再服。(今按：《博濟安眾方》：藥各二兩，酒二升，煎取一升。)

《僧深方》云：生薑，切，五升，以水八升，煮取三升，分三服。

治妊婦墮胎腹痛方第十

《病源論》云：此由墮胎之時，餘血不盡，故令腹痛。

《葛氏方》云：治墮胎後心腹致絞痛方：

鼓(三升) 生薑(五兩) 蔥白(十四枚) 酒(六升)
煮取三升，分三服。

《千金方》云：治落胎後腹痛方：

地黃汁(八合) 酒(五合)
合煮，分三服。

《僧深方》云：治墮身血不盡去留苦煩滿方：

香鼓一升半，以水三升，煮三沸，滴取汁，納成末鹿角一方寸七，服須與血下煩止。(今檢：《千金方》云麻角一兩。)

治妊婦上迫心方第十一

《葛氏方》云：治妊身胎上迫心方：

取弩弦急帶之立愈。

又方：生曲半斤，碎，水和絞取汁三升，分二服。

又方：生艾搗，絞取汁三升，膠四兩，蜜四兩，合煎取一升五合，頓服之。

治妊婦漏胞方第十二

《病源論》云：漏胞者，謂妊娠數月，經水時下也，亦名胞阻漏血盡則斃。

《醫門方》云：夫漏胞者，妊娠下血如故，血下不絕，胞乾便死。宜急治方：

生地黃汁一升，酒五合，和煮一沸。分二服。（《廣利方》同之。）

又云：療妊娠下血如月水來，若胞乾，非只殺胎。亦損其母方：

乾薑 乾地黃（各五兩）

末，酒服一匙，日夜三四服，即止。今檢：《集驗方》云：乾地黃四兩，乾薑二兩。酒服方寸匕，日三。

《葛氏方》云：妊身月水不止，名為漏胞。治之方：

阿膠（五兩） 乾地黃（五兩） 酒（五升）

煮取一升半，未食，溫再服。

《千金方》云：妊身血下不止方：

生艾葉一斤，酒五升，煮取二升，分二服。冬用莖。

又方：燒秤錘令赤，納酒中沸定，出錘，飲之。

《集驗方》云：治妊身血下不止。血盡子死方：

乾地黃搗末，以三指撮酒服，不過再三服。

《產經》云：治妊身血出不止方：

乾地黃十兩，以酒三升，煮得二升，分二服，良。

又方：灸胞門七壯，關元左右各二寸是也。

治妊婦下黃汁方第十三

《子母秘錄》云：妊娠下黃汁如膠，及小豆汁方：

糯米(一升) 黃耆(五兩)

上二物，切，以水七升，煮取三升，分四服。(今按：《產經》：搗地黃取汁，以酒合煎，頓服之。)

治妊婦頓仆舉重去血方第十四

《錄驗方》云：治妊身頓仆舉重去血方：

取淡竹斷頭，燒中央，以器承取汁一升，飲之。

《僧深方》云：治妊身由於頓仆及舉重去血方：

搗黃連下篩，以酒服方寸七，日三乃止。

又云：取生青竹，薄刮取上青皮，以好酒一升和三合許，一服。

治妊婦猝走高墮方第十五

《產經》云：治妊身婦人猝賁起，從高墮下暴大去血數斗。馬通陽方：

馬通汁(三合，絞取) 乾地黃(二兩) 當歸(二兩) 阿膠(四兩) 艾葉(三兩)
上五物，切，以水五升，煮得二升半，去滓，納膠，更上火令烊，分三服，大良。(馬通是馬屎。)

治妊婦為男所動欲死方第十六

圖¥pyxfc12.bmp (缺) 《產經》云：治妊身為夫所傷動欲死方：

取竹瀝汁，與飲一升則愈，不瘥，後作。(《千金方》云：立驗。)

《醫門方》云：若因房室下血，名曰傷胞。治之方：

乾地黃十兩，末，酒服方寸七，日三夜一。若腹內冷，加乾黃服之。

治妊婦胸煩吐食方第十七

《產經》云：治妊身胸中煩熱，嘔吐血，不欲食，食輒吐出，用諸藥無利。唯服牛乳則愈方：

牛乳微微煎，如酪煎法，適寒溫，服之多少任意，初服少少，若減之良驗。

治妊婦心痛方第十八

《病源論》云：心痛者，多是因風邪痰飲，乘心之經故也。

《葛氏方》云：刮取青竹皮，以水煮令濃，絞去滓，服三升。

《耆婆方》云：高良薑三兩，以水一升半，煮取半升，去滓，分三服。

《千金方》云：燒來二七枚末，以尿服之，立驗。

《僧深方》云：吳茱萸五合，以酒煮三沸。分三服。

治妊婦心腹痛方第十九

《產經》云：治妊身心腹刺痛方：

燒棗十四枚，治末，以小便服之，立愈。（《短劇方》同之。）

《短劇方》云：治妊身心腹刺痛方：

鹽燒令赤熟，三指撮，酒服之，立瘥。

治妊婦腹痛方第二十

《病源論》云：妊身腹痛者，因風邪入於腑臟所成。

《葛氏方》云：秤錘燒正赤，以著酒中，令三沸，出錘飲酒。

《集驗方》云：赤小豆，東向戶中吞二七枚，良。

《產經》云：蔥白，當歸，切，酒五升，煎取二升半，分再服。

《耆婆方》云：熬鹽令熱，布裹與熨之，乃停。

《千金方》云：生地黄三斤，搗絞取汁，酒一升，合煎減半，頓服。

又方：燒車脂末，納酒中服之。

治妊婦腰痛方第二十一

《病源論》云：腎主腰腳，風冷乘之，故腰痛。

《短劇方》云：治妊身腰痛如折方：

大豆三升，以酒三升，煎取二升，服之。

《葛氏方》云：治妊身腰背痛如折方：

末鹿角，酒服方寸匕。

又方：蔥白煮汁，服之驗。

又方：膠、桂各一尺，搗，以酒三升，煮得一升，去滓，盡服。

《醫門方》云：療妊娠猝腰背痛，反覆不得，如折方：

鹿角一枚，五寸截之，燒令赤，納酒二大升中浸之；冷，又燒之。如此數度，便空腹飲此酒，極佳。

《僧深方》云：治妊身腰痛方：

熬鹽令熱，布裹與熨之。

治妊婦脹滿方第二十二

《產經》云：治妊身猝心腹拘急痛脹滿，氣從少腹起上沖。心煩起欲死，是水飲，食冷氣所為。茯苓湯方：

茯苓（一兩） 當歸（三兩） 甘草（二兩，炙） 黃芩（一兩） 朮（三兩） 石膏（如雞子一枚） 杏仁（三十枚） 夕藥（二兩） 芒硝（一兩）

上九物，切，以水八升，煮取三升，納芒硝，上火令烊之，服一升，當下水或吐便解。

又云：治妊身腹痛，心胸脹滿不調，安胎當歸丸方：

乾薑（一分） 當歸（二分） 芎（二分） 膠（四分）

上四物，下篩，蜜丸如小豆，服五丸，日三。

治妊婦體腫方第二十三

《病源論》云：此由臟腑之間有停水，而妊娠故也。

《錄驗方》云：治妊身體腫方：

生鯉魚一頭，長二尺，完，用水二斗煮取五升，食魚飲汁。

又方：葵子一升，茯苓三兩，下篩，服方寸匕，先食，日三，小便利即止。

《醫門方》云：治妊身四肢煎腫。皮肉拘急方：

常陸根切，一升，赤小豆三升，桑根白皮切，一升，水一斗二升，煮二味取七升，去滓，納小豆煮令熟，然食豆渴飲汁，小便利即瘥。

《千金方》云：治妊身手足皆腫攣急方：

赤小豆（五升）常陸根（一斤）滓柒（一斤）
三味，水三升煮取一升，恆服。

《集驗方》云：小豆五升，好豉三升，以水一斗煮取三升，分上服。

《葛氏方》治婦人妊身之腫方：

大豆二升，酒三升，煮取二升，頓服之。

治妊婦下利方第二十四

《產經》云：治妊身暴下不止腹痛石榴皮湯方：

安石榴皮（二兩）當歸（三兩）阿膠（二兩，炙）熟艾（如雞子大二枚）
上四物，以水九升，煮取二升，分三服。

又云：治妊身下利赤白種種帶下黃連丸方：

黃連（一兩）甘草（一兩）乾薑（二兩）吳茱萸（一兩）烏梅（三十枚）熟艾
（一兩）黃柏（一兩）
上七物，下篩，蜜和丸如梅子，一服五丸，日三。

《醫門方》療妊娠注（治）下利下（不）止或水或膿血方：

熟艾（二兩）石榴皮 阿膠（炙，各三兩）
水四升，煮取一升半，分三服。（《集驗方》同之。）

又云：療妊娠利白膿，腹內冷方：

乾薑(四兩) 赤石脂(二兩) 粳米(一升，熬令黃)
水七升，煮取二升半，分三服。

《千金方》云：白楊皮一斤，水一斗，煮取二升，分三服。

治妊婦小便數方第二十五

《病源論》云：腎氣通於陰，腎虛而生熱，熱則小便澀數。

《錄驗方》云：治妊身猝暴小便數不能自禁止方：

桑螵蛸(十四枚)

凡一物，作散，溫酒服，分為再服。(《產經》同之。)

治妊婦尿血方第二十六

《病源論》云：尿血者，有熱氣乘於血，血得熱故尿血。

《產經》云：治妊身尿血方：

取其爪甲及發燒作末，酒服之。

又方：龍骨，治下，三指撮，先食酒服，日三。

又方：鹿角屑(一兩，熬，)大豆卷(二兩) 桂心(一兩)
三味，下篩，酒服方寸七，日三。

《葛氏方》云：治妊身尿血方：

取黍、燒末，服方寸七，日三。

治妊婦淋病方第二十七

《病源論》云：妊身之人胞系於腎，腎患虛熱成淋，謂之子淋。

《錄驗方》云：葵子一升，以水三升，煮取二升，分再服，亦切根用之。

《千金方》云：葵子，茯苓一兩為散，水服方寸七，日三。

《醫門方》云：治妊娠患淋，小便澀，水道熱痛方：

車前子五兩，炙，葵子一升，水五升，煮取一升半，分二服。

《產經》云：妊身小便不利方：

葵子一升，榆皮一把，以水二升，合煮三沸，去滓，服一升，日三。

又方：滑石以水和泥於臍中，濃二寸，良。

治妊婦遺尿方第二十八

《產經》云：治妊身遺尿方：

取胡燕巢中草，燒末，服半錢匕，水酒無在。

又方：龍骨治末，三指撮，先食酒服，日三。

又方：白藪十分，夕藥十分，治下，酒服方寸匕，日三。

治妊婦霍亂方第二十九

《產經》云：治妊身霍亂甘草湯方：

甘草(二兩，炙) 濃朴(三兩) 乾薑(二兩) 當歸(二兩)
上四味，切，以水七升，煮取二升半，分三服，日三。(今按：《博濟安眾方》
：藥各一兩，水三升，煎取一升，分三四服。)

《極要方》云：妊娠飲食不銷，成霍亂，心腹痛大吐胸心痰。濃朴湯方：

當歸(四兩) 人參(三兩) 濃朴(三兩) 芎(二兩) 乾薑(二兩)
以水九升，煮取二升半，分三服，羸人分四服。

治妊婦瘧方第三十

《產經》云：恆山(一兩) 甘葛(半兩) 枳子(二兩) 蔥白(四株)
凡四物，水五升，煮取二升，未發服一升，臨發複服一升，自斷。

《僧深方》云：竹葉一升，細切。恆山一兩，細切。水一斗半，煮竹葉，取七升半，納恆山漬一宿，明旦煮取二升半，再服，先發一時一服，發一服盡，去竹葉納恆山。

《集驗方》云：恆山(二兩) 甘草(一兩) 黃芩(半兩) 烏梅(十四枚，碎) 石膏(八兩，碎，綿裹)

凡五物，切，以酒一升半，水一升半合。漬藥一宿，煮三四沸，去滓，初服六合，複服四合，後服二合，凡三服。(今按：《博濟要方》：恆山二兩，甘草半兩，黃芩三兩，烏梅半兩、石膏半兩，酒一升，浸一宿，煎一數沸，去滓，分三四服。)

治妊婦溫病方第三十一

《產經》云：治妊身溫病不可服藥方：

取竹瀝二升，煎之減半，適寒溫服之，立愈，良。

又方：以井底泥塗病處，良。

又方：以人尿塗，隨其痛處，良。

治妊婦中惡方第三十二

《產經》云：治妊身中惡，心腹暴痛，逐動胎。少腹急，當歸蔥白湯方：

當歸(四兩) 人參(二兩) 濃朴(二兩) 蔥白(一虎口) 膠(二兩) 芎(二兩)
上六物，以水七升，煮取二升半，分三服。

又云：吳茱萸酒方：

吳茱萸五合，以酒三升，煮三沸，分三服，良。

治妊婦咳嗽方第三十三

《產經》云：治妊身咳逆，若傷寒咳，人參湯方：

人參 甘草(各一兩) 生薑(五兩) 大棗(十枚)
凡四物，切，以水四升，煮取一升半，分二服，良。

治妊婦時病令子不落方第三十四

《千金方》云：灶中黃土水和塗臍，方五寸，乾復塗之。（今檢：《葛氏方》云：塗腹上。）

又方：泔清和塗之，和酒塗並良。（今按：《葛氏方》云：塗腹上。）

《葛氏方》云：取井中泥，泥心下三寸。

治妊婦日月未至欲產方第三十五

《短劇方》云：搗知母，和蜜為丸，如梧子，服一丸，痛不止更服一丸。

《崔侍郎方》云：蘆根下土三指撮，酒服之。

《葛氏方》云：灶中黃土末，以雞子白丸如梧子，吞一丸。

治妊婦胎死不出方第三十六

《短劇方》云：治月未足，胎死不出。母欲死方：

大豆，醋煮，服三升，死兒立出，分二服之。（《千金方》、《葛氏方》同之。）

又方：好書墨三寸，末，頓服。

又方：桃白皮如梧子大，服一丸，立出。

又方：鹽一升，雞子二枚，和，頓服之。

又方：瞿麥一把，煮令二三沸，飲其汁立產。一方下篩服方寸匕。

《醫門方》云：療胎死腹中不出，其母氣欲絕方：

水銀二兩，吞之，兒立出。

又方：伏龍下土，下篩，三指撮，以酒服即出。

《產經》云：治妊身子死腹中不出方：

取赤莖牛膝根，碎，以沸湯沃之，飲汁，兒立出。

又云：周德成婦懷身八月，狀□緣之，其腹中兒背折，胎死腹中三日困篤方：

取黑大豆一升，熬，以清酒一斗漬之須臾，擇去豆，可得三升汁，頓服即下胎。

治妊婦欲去胎方第三十七

《產經》云：治妊身胎二三月欲去胎方：

大麥面五升，以清酒一斗合煮，令三沸，去滓，分五服，當宿不食。服之其子即墮腹中，令母不疾，千金不易。（《千金方》同之。）

《短劇方》云：妊身欲去子方：

栝萋（三兩） 豉（一升） 桂心（三兩）
凡以水四升，煮取一升八合，分三服。

又方：附子三枚，冶作屑，以好苦酒和，塗右足心即去，大良驗。

又云：婦人得溫病欲去腹中胎方：

取雞子一枚，扣之，以三指撮鹽置雞子中，服之，立出。

又方：取井底泥，手書其腹，立出。神良。

《千金方》云：妊身得病事煩去胎方：

麥一升，末，和蜜一升服之，神效。

《葛氏方》云：或不以理欲去胎方：

斑蝥，燒末，服一枚即下。

《錄驗方》云：煮牛膝根服之。

《如意方》云：去胎術：

以守宮若蛇肝□和塗臍，有子即下，永無複有。

又煮桃根，令極濃，以浴及漬膝，胎下。

《極要方》云：妊娠欲去胎方：

瞿麥(半斤) 桂心(三兩) 蟹爪(一升) 牛膝(五兩)
上，以水三升，酒五升，煮取一升，分三服。

又云：去胎後血下冲心方：

生薑，切，五升，以水八升，煮取三升，分三服。

醫心方卷第二十二

醫心方卷第二十二背記

治妊婦中蠱方：

《子母秘錄》云：鼓皮燒，冶末，服方寸七，須臾，自呼蠱主姓名。