

## 卷第二十五

### 小兒方例第一

《短劇方》云：黃帝云：人年六歲以上為小，十八以上為少，二十以上為壯，五十以上為老也。其六歲以還者，經所不載，是以乳下嬰兒病難治者，皆無所承按也。中古有巫立小兒《顛凶經》以占夭壽，判疾病死生，世相傳有小小方焉。

今按：《太素經》云：小兒初生為嬰，能笑為□脈(兒)。

《經義解》云：小兒初生號赤子。

《產經》云：凡兒生當長一尺六寸，重十七斤。

《針灸經》云：十歲小兒，七十老人不得針，宜灸及甘藥。

《千金方》云：凡新生兒七日以上，周年以還，不過七壯，炷如雀屎大。

### 小兒新生祝術第二

《產經》云：凡兒初生時即祝曰：以天為父，以地為母。頌金錢九十九，令兒壽。

凡小兒初生，仍以發其手掌，日號理，壽千歲。至二千石乃起之，大吉。若可，當為天子、王候、後妃、卿相者，即隨共相號之，乃可起抱之，吉。

### 小兒去銜血方第三

《產經》云：兒初生落地，急撩去(兒)口中舌上銜血，即時不去，須與血凝，(兒驚哭發聲，血)吞入(者，)或令兒成腹中百病(也。去銜血法：以綿纏手指頭以拭去之)。

《千金方》云：兒生口中有血，即當去之，不去者，而得吞之，成痞病。

### 小兒與甘草湯方第四

《千金方》云：兒新生出腹，先以指料口中惡血，去之便洗浴，斷臍竟□ 袍訖。未與朱蜜也。取甘草如手中指一節許(計)，打碎，以水二合，煮取一合；以綿纏沾取，與兒吮之，如朱蜜法，連吮，計可得一蜆殼，入腹止。兒當快吐，吐去胸中惡汁也。吐後消息計如飢渴，項複更與之，若前服。乃更與並不吐者，但稍與盡此一合止，得吐惡汁。令兒心神智惠，無病。都不吐者，是不含惡血耳。勿複與之。(《短劇方》同之。)

### 小兒與朱蜜方第五

《產經》云：小兒初生三日，可與朱蜜方，令兒鎮精神魂魄。真朱精練，研者如大豆多，以赤蜜一□ 殼和之，以綿纏沾取，與兒吮之，得三沾止，一日令盡，此一豆多耳。作三日與之，則用三大豆多也。勿過此量，過則複兒也。

今按：《短劇方》云：不宜多，多則令兒脾胃冷，腹脹。

### 小兒與牛黃方第六

《產經》云：朱蜜與竟，即可與牛黃，牛黃益肝膽，除熱，定驚，辟惡氣也。作法如朱蜜，多少一法同也。(《短劇方》同之。)

### 小兒初與乳方第七

《產經》云：凡乳兒，母當枕臂與乳頭平，當乳，不然則令兒噎。

凡乳兒，當先施去宿乳，以乳兒之，不然令兒吐 可利。

凡乳兒，先以手按乳，令散其熱，乃乳兒之，若不然，乳汁奔走於兒咽，令兒奪息成疾也。

凡乳兒，母欲寐者，則奪其乳，恐覆兒口鼻。亦不知飽，令致兒困也。

凡乳兒，頓不欲大飽，大飽則令兒吐。若吐，當以空乳，乳之則消。夏不去熱乳，以乳，令兒嘔逆；冬不去寒乳，令兒咳，下痢。

凡母新飽以乳，令兒喘、熱、腹滿。

母新內以乳，令兒羸，肢脛不能行，殺兒。

母新醉以乳，令兒身熱、腹滿、殺兒。

母新怒以乳，令兒喜發氣疝病。

母有熱以乳，令兒變黃不能食。

母有疾行以乳，令兒病癡狂。

母新吐下以乳，令兒虛羸。

凡兒初生，乳母食豬雞鮮魚胞美以乳兒者，令兒傷害洞泄也。

凡乳母過醉及房室喘息乳兒者，此最為劇，能殺兒，宜慎之。

夫五情善惡，七神所稟，無非乳而生化者也。所以乳兒宜能慎之。其乳母黃發、黑齒、目大、聲、眼精濁者，多淫邪相也。其椎項節高，鼻長，口大，臂、脛多毛者，心不悅相也。其手足丑惡、皮濃、骨強、齒□口臭，色赤如絳者，勝男相也。其身體恆冷，無有潤澤、皮粗、無肌而瘦者，多病相也。

又有漏腋(漏腋者恆濕臭汗也;)胡臭;癩□，(□者，白禿;)易□；(者，諸節生瘡;□□者，皮上疥瘡;)□(□者，聲敗;)嗽；(者鼻息肉也;)聾;齕(齕，齒敗破者;)齩(齩者，蟲食齒;)瘰；；瘰;瘤;痔;唇;癩;眩;癩者。是丑疾相也。

又其本命生年與兒無克，如此諸惡相者，便可飲乳。不隨此法，害兒，不吉。

凡乳兒頓欲大飽，大飽則令兒吐。

## 小兒哺谷方第八

《產經》云：凡小兒生三日後，應開腹助谷神。可研米作濃飲如乳酪狀。抄如大豆粒大，與兒咽之，咽三豆許止，日三與之，七日可與哺。十日始哺，如來核許。二十日倍之。五十日如彈丸許，百日如棗許。若乳汁少者，不從此法，當用意少增之。

今按：《本草》云：以如梧子十六枚準。(彈丸一枚。)

一云：二十日後可乃始哺，令兒無疾也。若早與哺者，兒頭、面、體喜生瘡。亦令兒虛羸難長。若兒大小隨宜哺增減之良。

凡小兒不嗜哺者，勿強與，強與哺不消，便致疾病也。

又云：初哺小兒良日：

五寅、五辰、五丑、五酉，皆大吉。

又云：男以甲乙，女以壬癸，亦吉。

又云：以成、收、開、定、滿日，義日，保日，皆吉，哺兒，兒終身無病，大吉。  
(義日：壬申、癸酉；保日：甲午、乙巳。)

又云：哺小兒忌日：

五戌、五巳、五亥、丁日，大凶。

又：戊戌、戊辰、執、閉日，皆大凶。

### 小兒初浴方第九

《產經》云：小兒初生時洗浴，以牛脂小置湯中，令兒至老無疾。一云：香脂大如指，投湯中浴之，大佳。香脂是半脂也。

又云：小兒初生，以虎頭骨漬湯中洗浴之，令兒不病。

又云：小兒初生以洗浴，以金銀珍寶珠玉等投湯中，兒必為貴尊，大吉。

又云：小兒初浴湯法：桃根、李根、梅根三物，以水煮取汁洗浴兒，卻諸不祥，令兒身無瘡，大吉。(今按：《千金方》云：以豬膽一枚，投湯中浴兒，終身不患瘡疥。)

又云：凡小兒浴數，數者，令兒背冷，發癩。若久不浴者，令兒毛落，亦復令啼呼之。間一二日浴之良。

又云：浴小兒良日：

丑、寅、卯、申、酉。

又：甲寅、乙未、丙午、丁酉、癸酉，癸未、甲辰，皆吉。令兒終身無疾病，長壽，大吉。

又云：浴小兒忌日：

庚戌、壬子、甲乙、庚辛、壬癸、辰巳、午未、亥，大凶。

又：男忌戌日，女忌丁日，大凶。

又：平旦、日中、黃昏、夜半，大凶。

### 小兒斷臍方第十

《產經》云：凡兒斷臍法，以銅刀斷之，吉(去)臍當令長六，七寸，長則傷肌，短則傷臟。

凡兒初生，當即舉之。遲舉則令兒寒中，腹中雷鳴。先浴之，然後斷臍裹之，吉。

《千金方》云：斷臍當令長至足夫，短則中寒，令腹中不調，當下利。

又云：裹臍法：推治帛布令柔軟，方四寸，新綿濃半寸，與布等合之，調其緩急，急令兒吐。兒生二十日，乃解視臍。若十日許兒怒啼，似衣中有刺，此或臍燥還刺其腹，當解。易衣更裹臍時，當閉戶下帳，燃火左右，令帳中溫暖，兒衣亦令溫粉粉之，比謂冬時寒也。若臍不愈。燒蝦蟆令成灰治末(粉臍中。)

### 小兒去鵝口方第十一

《產經》云：凡初生兒，其口中舌上有白物如米屑，名為鵝口，及鼻外亦有。此由兒在胞中之時，其母嗜嚼米，使之然也。此物當時不去之，兒得吞者，化為蟲也，宜便去之。治之方：

以發纏釵頭，沾井花水撩拭之，三四旦，如此便脫去也。猶不去者，可煮栗蒺汁，令濃，以拭，如上法。若春冬無栗蒺者，可煮栗樹皮用如上法，皆良。一云：釵頭著在者，屠蘇水中，勿令兒口中落入吞。(《短劇方》同之。)

《爽師方》云：小兒鵝口方：(桑白汁和胡粉塗之。)

### 小兒斷連舌方第十二

《產經》云：兒初生之時，有口中舌下膜如石榴子，中隔者連其舌下。當時不摘斷者，後喜令兒言語不發，轉舌也。治之方：

可以爪摘斷之，微有血出，無害。若血出不止者，可燒發作末，敷之血止，良。(《短劇方》名之“連舌”。)

### 小兒刺懸癰方第十三

《產經》云：小兒初生後六七日，其血氣收斂成害，則口舌頰裡領領淨也。若喉裡舌上有物如蘆籬盛水狀者，名懸癰，有氣脹起也。又有著舌下如此者，名為重舌。又有上 如此者，名為重 。又有著齒齦如此者，為重齦，皆刺去血汁之，良。

治奇以綿纏長針，未刃如栗以刺決之，令氣泄之，去清黃血汁，良。一刺止之，消息一日，不消又刺之，不過三刺，自消。（《短劇方》同。）

#### 小兒變蒸第十四

《病源論》云：小兒變蒸者，以長血氣也。變者上氣，蒸者體熱。變蒸有輕重，其輕者體熱而微驚。耳冷體亦冷，上唇頭白肉（ ）起如死魚目珠子。微汗出，平者而歇，遠者九日乃歇。（遠者八九日乃歇。）其重者，體壯熱而脈亂，或汗，或不汗，不欲食，食輒吐，無所苦也。變蒸之時，目白精（睛）微赤，黑精微白，亦無所苦。蒸畢，自明了矣。先變五日，後（蒸）五日，為十日之中，熱乃除耳。初變蒸之時，不欲驚動，勿令旁邊多人，變蒸或早或晚，依時如法者少。初變之時，或熱甚者，或違日數不歇，審計日數，必是變蒸；服黑散發汗，熱不止者，服紫（雙）丸，小瘥，便止，勿複服之。其變蒸之時，遇寒加之，即寒（熱）交爭，腹痛夭矯，啼不止，煮熨之則愈。變蒸與溫壯傷寒相似，若非變蒸；身熱耳熱，體體亦熱，此乃為他病，可為餘治。審是變蒸，不得為餘治也。其變蒸日數（出《病源論》。）

又，變蒸者，唇頭白肉起，如死魚目珠子。微汗，平者而歇，遠者九日乃歇。

兒生三十二日始變，變者耳熱也。至六十四日再變，再變且蒸。其狀臥欲端正也。第二變蒸時，或目白者赤，黑者微白，變蒸畢，目便精明矣。至九十六日三變，變者候丹孔出而泄也。至一百二十八日四變，變且蒸，能咳笑也。至一百六十五日五變，以成機關也。至一百九十二日六變，變且蒸，以知五機成也。至二百二十四日七變，以知匍匐也。至二百五十六日八變，變且蒸，以知學語矣。至二百八十八日九變，以亭亭然也。凡九變三蒸也。至三百二十日十變，變且蒸，蒸積三百二十日小蒸畢。後六十四日大蒸，後百二十八日複蒸。積五百七十六日大小蒸畢，乃成人也。所以變蒸者，皆是榮其血脈，攻其五臟，故一變竟輒覺情態有異者也。

凡蒸之候，身壯熱、脈亂、汗出、目精不明，微欲驚、不乳哺、上唇頭小白肉起如死魚目珠子，耳令尻赤冷，此其診也，近者五日歇，遠者八九日歇也。當審計其蒸日，不可針灸服藥。

凡兒變(蒸)之時，不欲驚動，勿令邊多人也。小兒變時，或早或脫也。

凡兒生三月不蒸則耳聾目盲；五月不蒸身不行；九月不蒸五機不成，此為痿蹶不能行之疾也。

《產經》云：脈決曰：凡小兒變蒸之時，汗出不用食，食輒吐而脈亂，無所苦也。

《葛氏方》云：凡小兒生後六十日，目瞳子成，能咳唆，識人。百五日經脈生，能反覆。百八十日尻骨成，能獨坐。二百一十日掌骨成，能匍匐。三百日髓骨成，能獨倚。三百六十日為一期，膝骨成，乃能行。

治少小初變蒸時，有者服之，發汗已止，黑散方：

杏仁(二分) 大黃(一分) 麻黃(二兩，去節)

上三物，先搗大黃、麻黃下篩，杏仁令如脂。納散，令調，更粗篩之，盛以葦囊。二十日兒以汁和之，如小豆一丸，分為二丸，易吞，濃衣包之，令汗，汗出畢，下帳、燃火解衣、溫粉粉之。百日兒取散如棗核大，以小陽和服之，汗出之後，消息如上法；當豫溫粉，不可解衣，乃溫粉。(出《葛氏》。)

治已服黑散，發熱不歇，服之熱小瘥便止，勿複與。紫丸方：

赤石脂(一兩) 巴豆(三十枚) 代赭(一兩) 杏仁(三十枚，一方五十枚，去皮)

上四物，先治巴豆、杏仁，搗二千杵，乃納代赭、赤石脂，更搗三千杵，掩也。藥熱即成。一方云：相和，與少蜜和之，盛以密器，無令藥燥，燥則無熱。以巴豆、杏仁自丸，常苦不能盡屑，當稍稍納之令相丸。二十日兒服如黍米一丸訖，小乳小乳之，令藥得下。卻兩食頃，乃複乳之，勿令飽耳。平旦一服藥，日中熱盡；日西夕時複小增丸，至雞鳴時，若複與一丸，愈者止。三十日兒服如大黍米一丸。三十日兒服如麻子一丸。六七十日兒如胡豆一丸。百日兒服如小豆一丸。不下故熱者，增半丸，以下利為度。

又方說：服紫丸，當須完出，若不出，出不完，為病未盡，當更服之。有熱乃服紫丸，無熱但有寒者勤服乳頭。單當歸散、黃散。變蒸服藥後微熱者，亦可與除熱黃芩湯方。(出《僧深方》。)

黃芩湯少小輩變蒸時服，藥下後有朝夕熱吐利。除熱方：

黃芩(一兩) 甘皮(六銖) 人參(一兩) 乾地黃(六銖) 甘草(半兩, 炙) 大棗(五枚, 去核)

凡六物, 切之, 以水三升, 煮取一升, 絞去滓。二百日兒服半合, 三百日兒服一合, 日再。熱瘥止。變蒸, 兒有微熱可服。(出張仲。)

又云：經曰：天不足西北, 故令兒腮後合; 地不足東南, 故兒髓後生成; 人法於三, 故令齒後。故腮合乃而言, 髓成乃而行。大陰氣不足而太陽氣有餘者, 故令兒羸瘦 脛三歲乃而行。

### 小兒擇乳母方第十五

(備在第七小兒與乳方末)

《短劇方》云：乳母者, 其血氣為乳汁也, 五情善惡, 血氣所生也。乳兒者, 皆宜慎喜怒, 夫乳母形色所宜, 其候甚多, 不可悉得, 今但令不狐臭、癭瘤、  
□ 癭、氣味、蝸、蚘、癬癢、白禿、瘍、唇、耳聾、鼻、癩眩, 無此等病者, 便可飲兒也。師見其故, 灸盤便知其病源也。

### 小兒為名字法第十六

《產經》云：

子日生名救(一名壽;) 丑日生名帶(一名徐, 一名去病;) 寅日生名令(一名阿金;) 卯日生名官(一名金, 一名宣令;) 辰日生名道(一名阿種;) 巳日生名益宗(一名阿善;) 午日生名徐(一名阿師;) 未日生名護; 申日生名多(一名起, 一名立, 一名桓,) 酉日生名多; 戌日生名帶子(一名弟;) 亥日生名他人(一名侶。)

又云：正月一日、十一日、二十一日、寅日、寅時生子名為正月子。二月二日、十二日、二十二日、卯日、卯時生子名為二月子。五月五日、十五日、二十五日、午日、午時生子名為五月子。七月七日、十七日、二十七日、申日、申時生子名為七月子。諸此日月合生者可為忌耳。

又云：以二月、五月生者, 皆不利父母。二月生男名安都, 生女名候女, 一名定女, 無咎。五月生男名連□, 一名扶紆, 女名恐華朱。如此名之, 無咎。是周文王為作神字, 不妨害父母, 吉。

又云：初立名字, 勿以五子曰, 凶。又不以巳日, 大凶。



## 小兒初著衣方第十七

《產經》云：小兒初著衣法：甲乙日生子，衣以黑衣(忌庚日、晡時、補時，凶。)丙丁日生子，衣以青衣(忌夜半。)戊巳日生子，衣以絳衣(忌甲申日、旦時，凶。)庚辛日生子，衣以黃衣(忌丙子日、申時，凶。)壬癸日生子，衣以白衣(忌戊巳日、晡時，凶。)

又云：小兒初著衣，良日辰巳。男以甲，女以乙，吉。

又云：凡作兒衣，勿以新綿繒之，損兒氣，故宜用故布帛。有人氣者，著益也。兒衣不欲濃，多綿之，恆如不忍，見其寒，乃為佳耳。

## 小兒調養方第十八

《禮記》云：童子不衣裘(裘)裳。(裘大溫，消陰氣，使不堪苦，不衣裳以便宜也。)

《養生要集》云：嬰兒之生，衣之新繒則骨蒸焉。食之魚肉則蟲生焉。串之逸樂則易傷焉。

《千金方》云：小兒始生，肌膚未成，不可暖衣，暖衣則令筋骨緩弱；不見日風，則令肌膚脆軟，便易傷。皆當以故絮著衣之，勿用新綿也。天和暖無風寒之時，令母將於日中嬉戲，數見風日，則血疑氣剛，肌肉牢密，能耐風寒，不致疾病。若常藏在帳中，重衣溫暖，辟陰地之草，不見風日，軟脆不堪風寒。

又云：養小兒常慎驚，勿令聞大聲，抱持之間，當安徐，勿令怖也。

又云：天雷塞耳，但作餘細聲以亂之。

又云：凡兒冬不可浴，冬生傷寒，夏不可浴，不浴久，久傷熱。

又云：凡小兒不能乳哺，當雙丸下之。小兒氣盛有病，但下之，必無所損，若不時下，則成病，痼難治矣。

《病源論》云：薄衣之法：當從秋習之，不可以春夏卒減其衣，則令中寒。從秋習之以漸，猶寒，如此，則必□寒，冬月但當著兩薄襠一複裳耳，常令不忍見其寒，適佳耳。愛而蠕之過，所以害之也。

又云：當消息，無令汗出，汗出則致虛損，便受風寒。晝夜寤寐，皆當慎之。

《產經》云：凡養小兒法，隨大人身之寒溫而養之，隨天時寒溫減增之，能察其微之。

又：不用新綿帛，新者過即有患兒故也。

凡小兒衣，其寒薄者，則腹中乳食不消，乳食不消則其大行酢臭。酢臭，此欲為癖之漸也，便將雙丸以微消之。

凡小兒大行黃而臭者，此是腹中有熱，故宜將服龍骨湯，良。

凡小兒不節哺乳者，則病易後，後下之則傷胃氣，令腹脹滿。再三下尚可，過此則傷小兒矣。

凡小兒冬日下為無所畏，夏日下不癢，難治。壯有疾者，不可不下，夏日下之後，腹中常當小脹滿，故當節哺乳，將護之，數日間愈矣。

凡小兒不使溺灶灰上，令兒陰生瘡，難治。

## 小兒禁食第十九

《產經》云：小兒食語害，令兒腹中生瘕，難治。

又云：小兒齒未易，蜜及飴糖不可與食，令兒齒壞，雖易，齒不堅。

又云：小兒不可與食狗鼠殘物，令兒咽中生白瘡，死。

又云：小兒不可與食核未成諸果，令兒生寒熱及癩癧。

《養生要集》云：大豆炒小麥，勿與一歲以上，十歲以下小兒，喜氣壅而死也。

又云：凡男子年十五以下，不得飲冰沉漿，腠理未成，故成病。

又云：小兒未斷乳，不可啖雞肉，生蛔蟲，亦令體瘦。

《崔禹錫食經》云：大麥面勿與一歲以上，十歲以下小兒，其喜氣壅塞而死。

《孟詵食經》云：黍，不可與小兒食之，令不能行。

又云：小兒食葢菜，便覺腳痛。

《蘇敬本草注》云：栗(栗)餌孩兒，令齒不生。

《本草拾遺》云：蝦，小兒食之，腳屈不能行。

又云：小兒食蕨，腳弱不行。

### 治小兒解顛方第二十

《病源論》云：解顛者，其狀小兒年大凶應合而不合，頭縫開解是也。由腎氣不成故也。腎主骨髓，而腦為髓海，腎氣不成，則髓腦不足，不能結成。

《產經》論云：細辛一分，桂心一分，乾薑五分。凡三物，以乳汁和，塗上。乾，複塗。

《僧深方》云：取豬牙車骨髓，塗凶上，日一，十日止。良。

《短劇方》云：生蟹骨、白 各二分。凡二物，下篩，以乳汁和，塗上立愈。

《千金方》云：熬蛇蛻末，和豬頰車中髓塗凶上，日三四。

《葛氏方》：燒藜蘘末敷良。

《極要方》云：防風六分，白芨，柏子仁各二分。上為散，以乳汁塗凶上，日一，十日知，二十日合。

又方：灸臍上下半寸。(出《新錄方》。)

### 治小兒凶陷方第二十一

《病源論》云：小兒凶上陷，此謂凶陷下不平也。由腹(腸)內有熱，熱氣熏臟，臟熱則竭(渴)，引飲而小兒(便)泄曳利者，則腑臟血氣虛弱，不能上充髓腦，故凶陷也。

《千金方》云：灸臍上下各半寸，及灸足太陰各一壯。

今按：《玉遺針經》云：足太陰穴在內踝後白肉際陷骨宛中。

### 治小兒搖頭方第二十二

《子母秘錄》云：治小兒長搖頭方：

狗腦以摩頭，即瘥。

### 治小兒髮不生方第二十三

《病源論》云：小兒稟生足少陰之血氣不足，則髮疏薄不生，亦有因頭瘡而禿落不生。

《短劇方》楸葉中心無多少，搗絞取汁，塗頭上。（《產經》同之。）

《新錄方》云：以蜜和豬毛灰塗之，即生。

又方：蓮子草汁塗之，驗。

又方：桑上寄生汁塗，立生。

《千金方》云：枸杞根搗作末，和臘月豬脂敷。和酢亦佳。

### 治小兒白禿方第二十四

《病源論》云：白禿之狀，頭上白點斑剝，初似癬，而上有白皮屑，生痂生瘡。頭髮禿落，謂之白禿。

《葛氏方》云：燒鯽魚末，以醬汁和敷之。

又方：末藜蘆，豬膏和塗之。

《產經》云：先以桑灰汁淨洗之，末，白焚灰，和塗之，良。

《短劇方》云：搗楸葉中心，取汁，以塗頭，立生。

《極要方》云：搗莞花以豬脂和如泥，灸，洗去痂，塗之。

《錄驗方》云：取熊白脂敷之。

《千金方》云：不中水蕪菁葉燒作灰，和豬脂塗之。

又方：葶藶子細末，先洗而洗之。

又方：桃樹青皮，搗，和醋塗之。

### 小兒鬼舐頭方第二十五

《病源論》云：人有風邪在於頭，有偏虛處那髮落肌肉枯死，或如錢大，或如指大，髮不生，故謂之鬼舐頭。

《千金方》云：狸骨燒末，以豬脂和塗之。

《產經》云：亂髮如鴨子大一枚，醋鯽魚一頭，苦參一兩，附子一枚，雄黃二兩，豬膏四升。凡六物，搗，篩下，用膏煎發，魚令盡，納諸藥末絞之，敷瘡上，良。

### 治小兒頭瘡方第二十六

《病源論》云：腑臟有熱，熱氣上沖於頭，而複有風濕乘之，濕熱相搏，折血氣，血變生瘡。

《極要方》云：胡粉膏主之。

胡粉 水銀(各二兩) 松脂 豬膏(各四兩)  
上，煎成去滓，納水銀，胡粉和調，塗瘡上，日二，大人蒸治之。

今按：《千金方》云：銀膏在下條。

《產經》云：梁上塵，下篩，麻油和，先洗瘡畢，拭燥，敷上。

《僧深方》云：燒竹葉，和雞子白，敷之，不過三愈。

《蘇敬本草注》云：生嚼胡麻，塗之，大效。

《葛氏方》云：雞屎燒冶為末，和豬脂，敷之。

《劉涓子方》云：取臘月豬屎燒末敷之，良。

《經心方》：治小兒一切頭瘡久，即疽癢不生痂，藜蘆膏方：

黃連(八分) 藜蘆(二分) 黃柏(八分) 礬石(八兩) 雄黃(八分) 松脂(八分)  
六味，以豬膏二升，煎令調，先以赤龍皮湯洗，敷之。

《子母秘錄》云：竹葉燒灰，和雞子白敷之。（《僧深方》云：不過三，愈之。）

《范汪方》：治小兒頭瘡，面赤有瘡，日日益甚方：

黃連 赤小豆

熬，分等作屑，和豬膏塗之。

《千金方》治小兒頭瘡經年不瘥方：

松脂(六分) 大黃(四分) 苦參(五分) 黃連(六分) 胡粉(四分)

凡五味，下篩，以豬膏和研水銀散敷上。

《徐之才方》云：白帝瘡，小兒頭上瘡團團然白色者是也，大蒜揩白處，早朝敷之。

### 治小兒頭面身體瘡方第二十七

《病源論》云：腑臟熱盛，熱氣衝發皮膚而外有風濕折，與血氣相搏則生瘡。其狀：初赤起，後乃生膿汁，隨癢隨發。或生身體，或出頭面，或身體頭面皆有之者。

《千金方》云：水銀膏主之。（今按《極要方》號胡粉膏在頭瘡條。）

《葛氏方》：取兒父 □ 汁以浴之，勿令兒及母知也。

《范汪方》：治小兒頭瘡面亦有瘡，日日益甚方：

黃連 赤小豆

熬，分等作屑，和豬膏塗之。

《廣利方》療小兒面上忽生瘡黃水土方：

黃連(末三分) 胡粉(三分) 甘草(一分，炙)

三味，以豬脂和，以帛貼瘡上，日一。

又方：鯽魚一頭，燒作灰，和醬汁塗上。

《集驗方》治少小面瘡方：丹茱萸葉，以東流水煮，以浴，良。

### 治小兒面白屑方第二十八

《產經》云：吳茱萸根白皮，煮取汁，拭洗。

又方：以刀刃克□樹，取其汁，塗白處上，日三四。

今按：礬石和酒敷之，尤良。

### 治小兒耳鳴方第二十九

《病源論》云：小兒耳鳴，頭腦有風，令耳鳴。

《產經》昌蒲散方：

菖蒲 烏頭(炮，各四分)

凡二物，為散，以綿裹，塞耳，日再易。

### 治小兒耳瘡方第三十

《病源論》云：小兒瘡生於兩耳，時癢時發，亦有濃汁，是風濕搏於血氣所生也。

《千金方》云：燒馬骨灰敷之。

又方：敷雞屎白。

《產經》云：小兒耳有惡瘡及有惡害生耳中方：

雄黃(六分) 曾青(二分) 黃芩(一分)

凡三物，合下篩，以敷耳中，以綿塞耳中，汁出，複敷，良。

### 治小兒耳方第三十一

《病源論》云：小兒腎臟盛而有熱者，熱上沖於耳，津液壅結則生膿汁。亦有因沐浴，水入耳內而不頃瀝停積，搏於血氣，蘊結成熱，亦令有膿汁。皆謂之耳。(久不癢變成聾。)

《集驗方》云：桃核中仁，熟治，末，(熱)或以裹塞耳，常用，良。

《效驗方》云：燒杏仁黃香塞耳。

又方：黃連、礬石各二兩，下篩，如棗核，吹納耳中，立止。

《產經》云：搗桂末，以魚膏和，塞耳，不過三四日。

又方：釜下灰吹入耳中，令入深，無苦即自丸出，良。

### 治小兒耳中百蟲入方第三十二

《產經》云：以苦酒灌之便出。

又方：油脂灌耳中，良。

又方：水灌注之(佳)。

又方：熬麻子綿裹，塞耳即出。

又方：桃葉汁灌耳中。

又方：以革帶 鉤向耳孔，即諸蟲皆出。

### 治小兒耳蟻入方第三十三

《產經》云：炙豬膏，香物，安耳孔邊，自出，良。

### 治小兒耳蜈蚣入方第三十四

《產經》云：以□ 樹葉裹鹽炙，令熱，掩耳孔，冷換之即出。

### 治小兒耳蚰蜒入方第三十五

《產經》云：胡麻，熬，以葛囊盛，枕之，蟲聞香，即出。

### 治小兒目不明方第三十六

《錄驗方》：治小兒眼茫茫不見物方：

魚膽敷目，鯉鮒等良。

### 治小兒目赤痛方第三十七

《產經》云：黃連七枚 人乳汁一合(半)，漬敷之。(今按：《極要方》無人乳，黃連數分等用之。)



又方：竹瀝汁三合，人乳汁一合，和以綿取藥拭目。

又云：小兒目赤，淚出不止，灸足大指上叢毛中，名大都。

《葛氏方》云：搗薺菜取汁，以注目 中。

《錄驗方》云：鯉魚膽敷之良。

### 治小兒眼爛癢方第三十八

《產經》云：治小兒傷風， 間赤爛癢，經年不瘥，青銅散方：

取大銅錢一百文，以好酒三升煎錢令乾燥，刮取屑，下篩，稍以納眼 。

### 治小兒眼翳方第三十九

《產經》云：治小兒眼有障翳，大小兒年至七八歲，眼瞳子猶不堅，不宜輒敷食翳散，止單敷珊瑚散，取如粟米大納翳上，日再。

又方：宜單敷馬珂散，皆令精細，好濃蜜。(絹篩用之。)

### 治小兒雀盲方第四十

《病源論》云：人有晝而精明，至暝便不見物，謂為雀目，言如鳥雀，暝便無所見也。

《千金方》云：至黃昏時，看雀宿處，打驚之，雀起飛，乃咒曰：柴公，我還汝盲，汝還我明。如此三日暝三過為之，眼明也。秘法也。

《產經》云：見定雀宿處，夜令雀驚起之，曰：雀，汝目去之。如此三日，即愈。

又方：大豆七枚，稻一穗，以二物暮向於鼠穴，曰：穴公穴公，甚甲得雀目，夜無所見故欲汝眼，汝許與之，我獲汝眼。誦三遍訖，則以稻置孔口，則曰：我得鼠目，暗夜能視。豆穗置鼠窟而起，去之。如此三夕。驗。秘術。

《新錄方》云：鯉魚、鮒魚膽敷並良。

### 治小兒目昧第四十一

《產經》云：以豬脂著鼻孔中，隨目左右以鼻噏<sup>口</sup>之訖，閉目仰寤寐，須臾，不復知味處，有驗。

又方：早起對戶門再拜跪言：戶門狹小，不足宿客。愈之。

又方：吞蠶砂一枚，即出。

#### 治小兒目竹木刺方第四十二

《產經》云：鮑魚二，以繩貫，以水煮，令爛，取汁灌目中，即出。

#### 治小兒目芝草沙石入方第四十三

《產經》云：研好墨，以新筆注瞳子上，良。

又方：取麥汁注目中。

又方：燒甑帶末，服方寸匕，立出。

#### 治小兒眼為物撞方第四十四

《產經》云：炙羊肉慰之，勿令甚熱，無羊用豬肉，良。

又方：好黃連去毛細切，以人乳汁漬令黃色，如大豆許，著目中，仰臥，勿覆之，甚佳。

#### 治小兒燕口方第四十五

《病源論》云：小兒燕口，兩吻生瘡，此由脾胃有客熱，上氣熏於口，兩吻生瘡。自白色如燕子之吻，故名為燕口。

《千金方》揪云：燒髮灰和豬脂塗之。

又方：□白皮及濕貼上，四五度。

#### 治小兒口瘡方第四十六

《病源論》云：小兒口瘡，由血氣盛，兼將養過溫，必有客熱，熱熏上焦，故口生瘡。

《產經》云：取烏賊魚骨燒作屑，以乳汁和，塗口中瘡上。

《葛氏方》云：（治小兒口瘡不得飲乳方）：

桑白汁塗瘡上，日夜十餘過。（《產經》云：塗乳以飲兒，良。）

《博濟安眾方》：以白礬，鍛石塗之。

又方：牛膝炙根，酒煎含之。

《極要方》云：取赤葵莖灸（炙）為末，蜜和含之。

《蘇敬本草注》云：檳榔帽。作灰敷之。

#### 治小兒口下黃肥瘡方第四十七

《病源論》云：小兒有涎唾多者，其汁流溢，浸漬於頤，生瘡，黃汁出，浸淫肥爛，挾熱者，瘡汁則多。

《千金方》云：治小兒口下黃肥瘡方：

熬灶上飯令焦，末敷之。

#### 治小兒唇瘡方第四十八

《葛氏方》云：葵根燒末敷之。

《經心方》云：蟾蜍燒末敷之。

#### 治小兒緊唇方第四十九

《單要方》云：澤蘭心，嚼以敷之。

又方：肉機上垢塗之。

#### 治小兒口噤方第五十

《病源論》云：小兒中風口噤者，是風入頸項（頰）之筋故也。

《錄驗方》云：服竹瀝汁二合，分溫四分（服）。

又方：灸百會穴。

《僧深方》：取雀矢白，丸如麻子，服之即愈。

《千金方》：鹿角粉、大豆末分等和，塗乳飲兒。

### 治小兒重舌方第五十一

《病源論》云：小兒重舌者，心脾熱故也。其狀附舌下，如舌而短，故謂之重舌也。

《葛氏方》：以兒著箕中東向，納中灸箕舌三壯，良。

又方：釜月下土苦酒和，敷舌下。

《短劇方》：以赤小豆屑洒和，敷舌上。又方：燒亂髮作末，敷舌上，良。

又方：用以栗哺之，良。

《徐大山方》：甑帶燒灰，末，敷之。

《極要方》：取蒲黃敷上，良。

又方：取衣中白魚燒作屑，敷舌下。

《產經》云：以鉞針刺舌上(下)腫者，令血，有刺大脈。

又方：燒烏扇根苦酒和，塗上。

《徐大山方》：甑帶燒灰敷之。

### 治小兒舌上瘡方第五十二

《病源論》云：小兒苦心臟有熱，舌上生瘡也。

《短劇方》：用烏賊魚骨燒屑，以雞子黃和，塗喉下及舌下也。(今按：《產經》云：以乳汁和塗上。)

又方：清旦起，斫桑木令白汁出，塗乳以飲兒。(今按：《龍門方》：塗舌。)

### 治小兒舌腫方第五十三

《病源論》云：小兒舌腫者，心脾俱熱，氣發於口，故舌(舌)腫也。

《千金方》：釜月下墨末，和醋，塗舌上(下)。

又方：滿口含糖醋，少時熱氣通，愈。

### 治小兒齒晚生方第五十四

《病源論》云：齒是骨之所終，而為髓之所養也，小兒有稟氣不足者，則髓不能充於齒骨，故久不生也。

《葛氏方》：以薄□ 編繩，向東磨齒處，微令破，即生，甚神驗。

《極要方》：雌鼠屎二七枚，以一鼠屎拭齒處，盡二七枚止，二十一日齒當生。  
(今按：

《短劇方》：雌鼠屎，一頭大一頭小是也。)

《蘇敬本草注》云：人屎中竹木，以正旦刮之即生也。

### 治小兒齒落不生方第五十五

《產經》云：取牛屎中大豆二七枚，小開兒口，以注齒處即生。(《葛氏方》同之。)

### 治小兒齒間出血方第五十六

《范汪方》治少小齩齒間血出，齩皆赤黑色方：取生雀割之，以血塗齩上及齒間，便愈。有驗。

### 治小兒鼻衄方第五十七

《病源論》云：小兒經脈血氣有熱，喜令鼻衄也。

《極要方》：取烏馬屎，薄綿裹，塞鼻中。

又方：燒發作灰，少許吹納鼻中。

《產經》云：阿膠令烱，水著貼額上良。

又方：書額上言“今日血忌”，即止。

又方：書額上言：“血出不止，流入東海”。良。

### 治小兒鼻塞方第五十八

《病源論》云：小兒風冷氣入於頭腦，停滯鼻間，則氣不宣和，結聚不通，故鼻塞也。

《產經》云：小兒患鼻不通有涕方：

杏仁(二分) 蜀椒(一分) 附子(一分半) 細辛(一分)

凡四物，咀，以淳苦酒五合，漬一宿，明旦以成；煎豬肪五兩，微火上煎，令附子黃，膏成，綿絮絞去滓，以塗鼻中，日再。

又：披兒頭發，凶上左右以膏摩十數過，良。

《千金方》：治鼻痛方：

恆以油塗鼻內外。

又方：塗酥佳。

### 治小兒鼻息肉方第五十九

《產經》云：治少小鼻息肉通草散方：

通草(一兩) 細辛(一兩)

凡二物，下篩，展綿如棗核，取藥如小豆著綿頭納鼻中，日二。

又方：礬石一兩。(今按：《千金方》：細辛二兩，云云。)

### 治小兒喉痺方第六十

《病源論》云：小兒喉痺，是風毒之氣客於咽喉之間，與血氣相搏而細(結)腫痛，甚者，腫塞，飲粥不下，乃成膿血也。

《產經》：取烏扇燒灰，以水服，大良。

又方：甌帶作繩系頭，愈。

《千金方》：桂一分，杏仁一兩，凡二味。為散，綿裹如棗大，咽其汁。

又方：煮大豆汁含之。

### 治小兒噦方第六十一

《病源論》云：小兒噦，由哺乳冷。冷氣入胃，與胃氣相逆，冷折胃氣，不通則噦也。

《千金方》云：生薑汁，生乳各五合，合煎，取五合，分二服。

### 治小兒津頤方第六十二

《病源論》云：津頤之病，是小兒多涎唾流出，漬於頤下也。

《葛氏方》：取東行牛口中沫，塗兒口。

又方：搗鹿角，熬如豆，著舌下。

《千金方》：桑白汁塗之。

《玄感方》：牛口中飼草絞汁，塗口中。

### 治小兒吐方第六十三

《病源論》云：小兒吐者，由乳哺冷熱不調故也。

《應驗方》：取桑根汁，著汁口中，即瘥。

又方：取新牛屎，水絞汁，少少飲兒，大良。

《經心方》：當以空乳乳則消。

《聖惠方》：治吐乳黃色方：

用韭根汁滴豆大，入口中，立瘥。

又方：用新熱馬糞絞取汁半合，灌之效。

#### 治小兒難乳方第六十四

《病源論》云：小兒初生惡血，兒咽入腹，令心腹痞滿，兒不能飲乳，謂之難乳。

又：兒在胎之時，母取冷，冷氣入胞，兒生則腹痛，不肯飲乳，亦名難乳。

《千金方》：炒鹿角末如小豆，著舌下，□□與之。

又方：雀屎四枚，未著乳頭飲之。大兒十枚。

#### 治小兒風不乳哺方第六十五

《錄驗方》：治小兒風，數十日口中寒，不能乳哺方：

取生竹汁服之即瘥，炙(名)竹瀝也。

《博濟安眾方》：小兒吐乳方：

人參(二兩) 橘皮(一兩) 生薑(一兩)  
以水一升半煎取八合，細細服之。

#### 治小兒臍不合方第六十六

《千金方》：蜂房灰末敷之。

又方：燒甌帶灰和膏敷之。

又方：大車轄脂，燒作灰，日一敷之。

#### 治小兒臍中汁出方第六十七

《千金方》：燒蒼耳子粉之。

又方：燒蜂房灰粉膏中。《效驗方》：

甘草(二分) 椒(一分)  
下篩，以粉之。

又方：礬石，附子各二分，下篩，粉臍中，日二。



### 治小兒臍赤腫方第六十八

《千金方》：杏仁(二分) 豬頰車中髓(二分)  
凡二味，先研杏仁如脂，敷上。

### 治小兒臍瘡方第六十九

《病源論》云：小兒臍瘡，由初生斷臍洗浴，拭不即拭燥，濕氣在臍中，遇風濕相搏故也。

《本草》云：蒿艾莖間白毛敷之，立瘥。

《錄驗方》：可用薑黃柏散粉之。

《產經》云：黃柏，釜月下墨各四分，末，敷之。

《千金方》小兒風臍遂作惡瘡，歷年不瘥方：

敷東壁土，大佳。

又方：蜂房灰末敷之。

《葛氏方》：小兒風臍及臍瘡久不瘥方：

燒甌帶作灰和乳汁敷之。

又方：末當歸粉之。

### 治小兒腹痛方第七十

《病源論》云：小兒腹痛，多由冷熱不調，冷熱之氣與臟相系故也。

《千金方》：梨葉濃煮，取湯，一服七合，可三四與之。

又方：半夏隨多少微火炮之，末，酒和服如粟粒五合丸，日三。

### 治小兒腹脹方第七十一

《病源論》云：小兒腹脹，是冷氣客於臟故也。

《千金方》云：燒父母指甲灰，塗乳上，飲之。

又方：腹上磨書魚。

又方：故衣帶饒垢者，切一升，水三升，煮取一升，分三服。

《葛氏方》：粉及鹽分等，合熬，令變色，以磨腹上，即愈。

## 治小兒痞病方第七十二

《病源論》云：小兒胸膈熱實，腹內有留飲，致令營衛痞塞；腑臟之氣不宜通，其病(痛)腹內結。脹滿，或時壯熱是也。

《葛氏方》方：若患腹中痞結常壯熱者方：

生蠶血，和桂屑塗痞上。

又方：末麝香，服如大豆者。

又方：大黃(灸，令煙出) 龜甲(灸令黃) 茯苓  
凡三物，分等蜜丸，服如大豆一枚，日三。(以兒大小增減也。)

又方：搗白頭翁，練右囊盛以掩痞上。

《產經》云：治小兒痞，面黃羸瘦，丁奚不欲食，食不生肌膚；心中嘈嘈，煩悶，發時寒熱五臟臘脹，腹中繞臍痛，常苦下，八痞丸方：

桂心 曾青(無代空青) 牡丹 鱧頭甲(頭漬，灸令黃色) 乾薑(各三分) 蜀漆(七分) 細辛(六分) 龍膽(五分) 附子(四分，炮)  
凡九物，治下篩，蜜和如梧子，服二丸，日三，禁如藥法。

《本草拾遺》云：小兒痞，三白草搗汁，服之令人吐。

## 治小兒瘰方第七十三

《病源論》云：五臟不和，三焦不調，有寒冷之氣容之。則令乳哺不消化，結聚成瘰癧結也。其狀按之不動，有形段者，微也，推之浮移者，瘰也。

《千金方》：灸兩乳下一寸三壯。

又方：桃樹青皮搗，和酢，塗，日二。

又方：枸杞根搗作末，和豬脂敷之，和酢亦佳。

《醫門方》：搗蒜和酢敷，如移餘處，隨就拊之，驗。

《本草拾遺》云：苦瓠取未硬者，煮令熱，解開，熨小兒閉癩。

#### 治小兒米症方第七十四

《產經》云：治少小米症恆欲食米方：

雞屎（一升）白朮（五合）

凡二物，合炒，取米焦，搗末，以水一升，頓服取盡；斯須即吐出症，吐出症如研米末為症，若無症而吐出白痰水，增米須食米。

#### 治小兒土症方第七十五

《產經》：治少小食土，腹中作土瘕，恆欲食土，啖肉方：

生肉一斤，以繩系曳地行數裡，勿洗便炙，啖之即愈。

#### 治小兒腹中有蟲方第七十六

《耆婆方》：治小兒腹中有蟲方：

蕪荑作末，每食隨多少和，少少水食之乃止。（百無所禁。）

#### 治小兒陰腫方第七十七

《病源論》云：小兒下焦熱，熱氣衝陰，陰頭勿腫合，（令）不得小便，乃至生瘡。俗雲尿火所為也。

《千金方》：搗蕪菁敷之。

又方：書魚磨之。

又方：搗莧菜根敷之。

又方：熬桃仁末，酒服方寸匕，日三。

### 治小兒陰痛方第七十八

《千金方》云：猝陰痛如刺，汗出如雨方：

小蒜 韭根 楊柳根(各一斤)  
凡三味，合燒，以酒灌之，及熱以氣重之。

又方：甘草末和乳洗之。

又云：玉莖痛方：

甘草 石蜜  
末，和乳洗之。

《極要方》：濃煮野狼牙根，洗之，甚良。

### 治小兒陰瘡方第七十九

《產經》云：治小兒陰瘡爛痛方：

濃煮野狼牙根，洗之，甚良。

又云：小兒陰頭生瘡，似石榴花者方：

虎牙 犀角  
凡二物，刀刮，以豬脂煎，令變色，去滓，塗上，神，良。

《千金方》云：治小兒陰癢生瘡方：

嚼胡麻敷之。

又方：蜜煎甘草，末之塗上。

又方：黃連，胡粉分等和，面脂塗之。

《葛氏方》：取灶中黃土，末，以雞子白和，敷之。

又方：濃煮黃柏汁漬之。

### 治小兒陰傷血出方第八十

《產經》：治女小兒為物觸傷，陰道血出不止方：

人頭髮並青布燒作灰，以麻油和塗之，亦可仍以粉，良。

又云：若深刺觸藥塗不及方：

蒲黃，水和服之，即止。

### 治小兒陰囊腫方第八十一

《千金方》：酢和面塗之。

又方：釜月下土，和雞子白敷之。

《醫門方》：末桂心，塗，良。

又方：末大黃，和酢塗，良。

### 治小兒陰頰方第八十二

《病源論》云：頰者，陰核氣結腫大也。小兒患此者，多因啼怒，氣不止，動於陰氣，下擊，結聚不散所致也。

《千金方》：灸足厥陰大敦，左灸右，右灸左。

又方：三月上除日，白頭翁末敷之，一宿作瘡，二十日愈。

《產經》云：牽陰頭正丁上行，灸頭所極。又牽下行向穀道，灸所極。

《短劇方》云：小兒頰方：

先將兒至碓頭祝之曰：坐汝令兒某甲稱兒名也，陰稱故灸汝三七一，灸訖，便牽小兒令莖以下向佳囊縫，當陰以所著處灸縫上七壯即消，有驗。

又：左右髀直行，灸所極，皆四處，隨年壯。

又方：小兒騎碓軸前齊陰莖頭前灸，有年壯。

又云：《葛氏方》：但灸其上，又灸莖上向小腸脈。

又方：灸手小指頭七壯，隨癢左右也。

《經心方》：灸兩足內踝上七寸，日七壯。

又方：但灸其上也。

### 治小兒差頰方第八十三

《病源論》云：差頰者，陰核偏腫大也，其偏虛者，氣虛而行，故偏結腫也。

《千金方》：五等丸治小兒陰偏大，卵核及頰方：

香豉 牡丹 防風 桂心 黃柏(各二兩)

凡五味，丸如大豆，兒三歲飲五丸，日三，兒小者，以意減之，著乳頭與之。

### 治小兒脫肛方第八十四

《病源論》云：小兒患脫肛門，(脫)出多因利，大腸虛冷兼因 氣故也。

《蘇敬本草注》云：燒蟹頭為灰塗(服)之。

《本草拾遺》云：有以似為藥者，蝸牛蟹頭，脫肛皆燒末，敷之自縮。

《錄驗方》：取鐵精粉推納之。

又方：宜灸龜尾骨上三七丸。

《葛氏方》：熬鍛石令熱，故綿(帛)裹坐其上，冷復易之。

《僧深方》：取蒲黃一兩，以豬膏和，敷之，不過三，愈。

《千金方》：灸頂上施毛中即入。

《產經》云：生鐵三斤，以水一斗，煮取五升，以汁洗，日三，乃以蒲黃敷上，良。

### 治小兒穀道癢方第八十五

《子母秘錄》云：小兒穀道蟲癢方：

大棗取膏和，捻長三寸，綿裹，納孔中，明日出之，蟲死。

又方：胡粉，雄黃分等著中。

今按：煮桃皮洗之，煮枸杞洗亦良。

### 治小兒穀道瘡方第八十六

《葛氏方》治猝下部有瘡方：

煮豉以漬之。

又方：□ 汁以磨墨，導也。

### 治小兒甘濕方第八十七

《病源論》云：甘濕之病，多因久利，脾胃虛弱。腸胃之間，蟲動侵食五臟，使人心煩懊悶；其上食者，則口鼻齒齦生瘡；其下食者，則肛門傷爛，皆難治。或因久利，或因臟熱嗜眠，或好食甘美之令蒸，令血動，致生此病患。

《子母秘錄》云：羊膽和漿灌下部，用豬膽亦佳。

《千金方》：細和胡粉塗之。

又方：嚼麻子塗之。

又方：以鐵衣著下部中即瘥。

### 治小兒寸白方第八十八

《病源論》云：小兒寸白者，九蟲之內一蟲是也。因腑臟虛弱而能發動也，食生栗所成。

又食生魚後即食乳酪，亦令生。

《葛氏方》：薏苡根二斤，細銼，水七升，煮取二升，分再服。又可作糜也。

《極要方》云：東行茱萸根白皮四兩，桃白皮三兩。上，切，以酒一升漬一宿，去滓，頓服良驗。

又方：煮扁竹汁飲之，有驗。

今按：蒸之當上。

又方：濃煮豬，檳榔，飲三升，蟲則出盡。

又方：多食榧子。（今按：《千金方》：榧子四十九枚去皮，以月上旬，旦，空腹服七枚，七日服盡，蟲消成水，永瘥。）

今按：研胡桃仁敷。

《產經》云：練皮，削去上皮，取中白者，切五升，以水五升，煮得二升。先令小兒食餈令渴，因飲之。今按：《子母秘錄》：練實一枚，納孔中。

又方：研芥子敷之。

又方：研雄黃，和酢敷之，檳榔子亦佳。

### 治小兒癩病方第八十九

《病源論》云：癩，小兒病也。十歲以上為癩，十歲以下為癩。其發之狀，或口眼相引而目睛上搖，或手足掣縱，或背脊強直，或頸項反折。諸方諸（說）癩（癩），名証不同，大較其發之源，皆因三種。三種者風癩、驚癩、食癩是也。風癩因衣濃行出，出而風入為之；驚癩因驚怖大啼乃發；食癩因乳哺不節所成。然小兒氣血微弱，易為傷動，因此三種變作諸癩也。

凡諸癩正發，手足掣縮，慎勿捉持之，捉則令曲戾不隨也。

《短劇方》云：《玄中記》云：天下有女鳥，一名姑權，又名鉤皇鬼也；喜以陰雨夜過飛鳴，徘徊人村裡，喚得來者是也。是鳥專雌無雄，不產，喜落毛羽中塵，置人兒衣中，便使兒作癩，病必死，便化為其兒也。是以小兒生至十歲，衣被不可露，七八月尤忌。

《神農本草經》云：小兒驚癩，有百二十種，其証候異於常。

《千金方》云：所以有癩病，瘡病（者），皆由臟氣不平故也。新生即癩者，是其五臟未收斂，血氣不聚，五脈不流故也。

又云：灸癩法：囟中未合，骨中隨息動者，是最要處也。（灸五壯。）



又云：頂上回毛中、臚中、巨闕、臍中，毛尺澤、勞宮、伏兔、三裡、然谷穴，灸之。

今按：《明堂經》伏兔穴禁灸。

又云：灸癩當先下，使兒虛，乃承虛灸之。未下有實而灸者，氣逼前後不通，殺人。

又云：龍膽湯主之。（其方在本書第五卷。）

《廣利方》：核子驚癩不知人，迷悶嚼（舌）作目方：

牛黃一大豆許，和蜜，水服之，立效。

又方：烏犀角尖（尖），研，並水二大合，服之立效。

《枕中方》：取紙中白魚，隨羊乳和之即愈。

### 治小兒魘病方第九十

《病源論》云：小兒所以有魘病者，婦人懷娠，有惡神道（導）其腹中胎，如娠（妒）嫉而製伏他小兒令病也。妊娠婦不必悉能（製）魘，人時有此耳。魘之為疾，喜生微下，寒熱有去來，毫毛髮□□不悅，是其証也。魘音製。

《千金方》灸（灸）伏翼，熟嚼哺之。

篇□〔切，一升（斤）〕 冬瓜〔切，一升（斤）〕

以水五六升，煮六七沸，去滓，稍以浴之出。（出《新錄方》。）

《蘇敬本草注》云：白馬眼療小兒魘，母帶之。

### 治小兒客忤方第九十一

《病源論》云：小兒中客忤者，是小兒神氣嫩（軟）弱，忽有非常之物，或是未經識見之人觸之，與兒（鬼）神氣相忤而發病，謂之客忤也。又名中客，又名中人。其狀吐下青黃白色水穀，解離，腹痛反倒夭矯，面變易五色，狀似癩，但眼不上，搖耳，其脈弦（強）急數者是也。若失時不治，小久則難治。若乳母飲酒過醉及房勞喘後乳者最劇，能殺兒也。

《千金方》云：少小所以有客忤病者，是外人來氣息忤之，一名中人，是為客忤也。雖是家人或別房異戶，雖是乳人父母，或從外還，衣服或經履鬼神，粗惡異氣，牛馬之氣，皆為忤也。

又云：凡小兒衣，布帛綿中不得有頭發，履中亦爾，白衣青帶，青衣白帶，皆令兒中忤。

又云：凡非常人及物從外來，亦驚小兒。欲防之法，諸有從外來人及異物，當持兒避之，勿令兒見也。若不避者，燒牛屎灰令常煙，置戶前，則善。治之方：

馬屎三升，燒令煙絕，以酒三升煮三沸，去滓，浴兒。

又方：燒母衣帶三寸並發，合服汁，服之。

《極要方》：蚯蚓屎，灶中黃土，等分為散，水和塗兒頭上及手心。

又方：取銅鏡鼻燒令赤，著小許酒中代飲之，小兒又能飲合之，即愈。取熱馬屎一丸，注取汁飲之，兒下便愈。

《短劇方》：吞麝香如大豆，立愈。

又方：取衣中白魚十枚，末，以塗母乳頭令兒飲之，入咽即愈。

《葛氏方》：令兒仰臥，以小盆著胸上，燒甌蔽於盆中，火滅即愈。

《產經》云：牛黃如大豆研，飲之即效。

## 治小兒夜啼方第九十二

《病源論》云：小兒夜啼者，臟冷故也，夜陰氣盛，與冷相並則冷動，冷動與臟氣相搏，或煩或痛，令兒夜啼也。亦有犯觸禁忌，令兒夜啼。

《龍門方》：取鏡系床腳即止。

又方：書臍上作田字，瘥。

《短劇方》少小夜啼至明安寢，夜輒啼，芎 散方：

芎（二分）朮（二分）房己（二分）

凡三物，搗下篩，二十日兒未能服散者，以乳汁和之，服如麻子一丸，兒大能散，散者，服之多少，以意節度。

《產經》：真珠少許，以水和，塗腹上。

又方：取車膏著臍中。

《集驗方》取空井中草，懸戶上，勿令母知。

今按：《本草拾遺》云：井口邊草，潛著母臥席下，勿令知。

《玄感方》取乾（牛）屎手許，安母臥席下，（臥上）勿令母子俱知，吉。

《葛氏方》：取犬頸下毛，縫囊裏以系兒兩手立止。

又方：暮取兒衣，以系柱。

《千金方》：以妊身時，食飲偏有所思物，（以此）哺兒愈。

《本草拾遺》云：灶中土及四交道中土，合末以飲小兒，辟夜啼。

### 治小兒驚啼方第九十三

《病源論》云：小兒驚啼者，是於眠睡裡忽然啼而驚與覺也；由風熱邪氣乘於心臟，生熱，精神不定，故臥不定，則驚而啼也。

《產經》云：真珠少許，以水和，塗腹，良。

《葛氏方》搗柏子仁以一刀圭飲之。

《千金方》酒服亂髮灰。

又方：車轄肪，納口中臍中。

又方：燒皮三寸灰，著乳頭飲之。

### 治小兒啼方第九十四

《病源論》云：小兒在胎時，其母將養，傷於風冷，邪氣入胞，傷兒臟腑。故兒生之後，邪猶在兒腹內，邪動與正氣相搏則腹痛，故兒張蹙氣而啼也。

《千金方》：取新出馬屎一丸，絞取汁，含之。

又方：燒豬屎沸湯，淋取汁，浴之，並與少許飲之。

### 治小兒瘧病方第九十五

《病源論》云：瘧病者，夏傷於暑，至秋風邪乘之發。小兒未能觸胃於暑亦病瘧者，是乳母抱持解脫，不避風也。

《千金方》：生鹿角末，發先時便服一錢匕。

又方：燒鱉甲，酒服方寸匕，至發時服三七，並火灸身。

《葛氏方》云：臨發時，搗大附子，下篩和苦酒塗背上。

又方：石上菖蒲濃煮，浴兒。（三四時亦佳也）。

今按：《集驗方》：桃葉二七枚按心上，艾灸葉上十四壯。

《葛氏方》云：恆山四分，小麥三合，淡竹葉切一升。上，以水三升，煮取一升，服之。（今按：《產經》云：兒生四十餘日至六十日者，分三服，或至百日服二合半，或於二百日一服三合。）

《產經》云：師左手持水碗，右持刀子，正面於北兒曰：北斗七星，主知一切死生之命，屬北斗之君王某甲病瘧，勿令流行。誦三遍訖，禹步就病兒前，令視碗中，師則吐呵，以其持刀刺碗中兒影，急急如律令，勿令及顧。甚秘驗，過病發後取刀子。（《范汪方》同之。）

又法：頭面胸背上皆筆作“天公”字，胸上書作咒曰：太山之下有不流水，上有神龍，九頭九尾；不食餘物，正食瘧鬼，朝食一千，暮食五百，一食不足，遣我來索。瘧鬼聞之，亡魄走行千裡。用朱書之。

### 治小兒傷寒方第九十六

《產經》云：治小兒傷寒頭痛方：

生葛汁(六合) 竹瀝(六合)  
凡二物，相不(和)煮，兩三歲兒，分三服。

#### 治小兒猝死方第九十七

《葛氏方》：治小兒猝不知何所疾，痛而不知人，便絕死方：

取雄雞冠血，臨兒口上割，令血出，瀝兒口，入喉便活。

《子母秘錄》：鹽湯極鹹，作服一升，取吐即活。

又方：熱湯和灰擁封之即活。

《范汪方》：熱馬屎一丸，絞取汁吞，兒下喉愈。

#### 治小兒注病方第九十八

《病源論》云：注之言住也，謂其風邪氣留人身內也。

《千金方》云：取灶突中灰三指撮，鹽末等服之。

#### 治小兒數歲不行方第九十九

《病源論》云：小兒生，自變蒸至於能語，隨日數血脈骨節備成。其髓骨成則能行，骨是髓之所養。若稟生血氣不足者，即髓不死強，故其骨不即成，而數歲不能行也。

《千金方》：取喪家未閉戶時，盜取其飯以哺兒，不過三日即行，勿令人知之。(今按：《短劇方》取束哺之，日三便起。)

#### 治小兒四、五歲不語方第百

《病源論》云：人之五臟有五聲，脾之聲為言，小兒四五歲而不能言者，內在胎之時，其母猝有驚怖，內動於兒臟，邪氣乘其脾，使脾氣不和故也。

《千金方》：灸足兩踝上三壯。

又方：末赤小豆，和酒塗舌下。

#### 治小兒無辜方第百一

《病源論》云：小兒面黃發直，時壯熱，飲食不生肌膚，積經日月，遂致死者，謂之無辜。言天上有鳥，名無辜，晝伏夜游，兒洗小兒衣席，露之經宿。此鳥則飛從上過，而取此衣與小兒著，並席與兒臥，便令兒著此病也。

《崔侍郎方》：以酢煮大黃末為丸，服之甚驗

### 治小兒大腹丁奚方第一百二

《病源論》云：小兒大腹丁奚病者，由哺食過度；而脾胃尚弱，不能磨消故也。其病腹大、頸小、黃瘦是也。

《葛氏方》：取生韭根，搗，以豬膏煎，稍稍服之。

又方：熟炙鼠肉若伏翼肉，以哺飲之。

《蘇敬本草注》云：牛臍中毛燒服之。

《錄驗方》：甘草十八分。一物下篩，蜜和為丸。一歲兒服如小豆粒二十九，日二三，不妨食及乳，服盡更合。

### 治小兒霍亂方第一百三

《病源論》：小兒腸胃嫩弱，因解脫逢風冷，乳哺不消，而變吐利也。或乳母觸冒風冷，食生冷物，皆冷氣流入乳，飲之亦成霍亂。牛涎灌口中一合也。

又：熱牛屎汁含之。

又方：研□ 滓乳上服之三刀圭，日三。（出《千金方》。）

《產經》：人參湯方：

人參（四分） 濃朴（二分） 甘草（二分，炙） 白朮（三分）  
凡四物，以水一升二合，煮取五合，五十日兒服一合，百日兒分三服之。

《千金方》治小兒吐利方：

亂髮燒之二分，鹿角一分，末，米汁服之三刀圭，日三。

《錄驗方》：煮濃朴服之。

又方：煮梨葉服之。

#### 治小兒泄利方第一百四

《病源論》云：甚冷氣盛，利甚為洞泄，洞泄不止，為注下。

《千金方》：小兒洞泄下利方：

炒倉米，末，服之。

又方：石榴石榴燒末，服一錢七，日三。

《產經》云：小兒洞利，晝夜不止。黃芩丸方：

黃芩(二分) 乾薑(二分) 人參(二分)

下篩，蜜丸如大豆，服三丸，日三。

《錄驗方》治小兒患利腹內不調方：

薤白(切，七合) 人參(切，八分) 濃朴(四分，切) 粟(三合)  
凡四物，以水四升，煮取二升，稍飲之。

《葛氏方》下利不止方：

末赤小豆，和苦酒塗踐下。

又方：豬肉炙哺之。

《本草拾遺》云：食菰烏郁甚良。

#### 治小兒白利方第一百五

《病源論》云：凡利色青白黑皆為冷色，黃赤色，是熱也。

《產經》云：治小兒白利：灸足內踝下骨際三壯，隨兒小大增減。

《子母秘錄》云：治小兒冷利方：

濃朴 人參(各四分)

以醋漿半大升，煮取二合，母含吐與之。

## 治小兒赤利方第百六

《龍門方》：孩子赤利方：

薤白(切，三合) 梔子(七枚) 香豉(二合)  
水二升，煎取六合，去滓，分三服之。

《博濟安眾方》藍青汁五合，分服。

## 治小兒赤白滯下方第百七

《千金方》：搗石榴汁服之。

又方：蜂房灰服之。

又方：鯉魚一頭，燒末服之。

又方：燒骨末服之。

《極要方》：薤白一把，香豉一升，水三升，煮取一升，(分)三服之。

《本草拾遺》云：鯽魚膾主水穀不調，下利。

又方：柿，小兒食之，止下利。

《產經》云：龍骨三兩，研如米粒，以水三升，煮取一升五合，服。(多少任意。)

又方：大棗三十枚，以水三升，煮取二升，去滓，熱服之。

《子母秘錄》云：孩子赤白利方：

犀角一兩，甘草二兩，以水一大升，煮取一大合，飲多少。

## 治小兒蠱利方第百八

《產經》：治小兒蠱利血尿方：

取生地黃汁一升，分四五服之。



《千金方》云：蠱利以蠱法治之，其方在治蠱毒方中。藍青汁一合，分四服之。

### 治小兒大便不通方第九

《病源論》云：小兒大便不通者，腑臟有熱，乘於大腸故也。

《葛氏方》：取蜂房熬末，以酒若水，服少許。

又方：以白魚蟲磨臍下至陰。

### 治小兒小便不通方第十

《葛氏方》：取衣中白魚蟲，塗臍中，納尿道中（橫骨又佳也）。

又方：取故席多垢者，銼一升，以水三升，煮取一升，去滓，飲之。

《千金方》車前子半升，小麥一升。二味煮為粥服，日三。

又方：葵莖子久在一升，水四升，煮取一升，納滑石一分，研服半合，日三。

《子母秘錄》治小兒尿不通符：

□ 墨書臍下，亦朱書甚驗。

《效驗方》蒲黃，滑石各一分，下篩，以酒服方寸匕，日二。

《產經》治小兒未滿十日（腹滿）煩不得小便方：

燒蜂房服之。

又方：蒲黃一升，以水和，塗橫骨上良。

《短劇方》治少小小便不利，莖中痛欲死方：

牛膝大把無多少，煮作飲，飲之立愈，有驗。

### 治小兒大便血方第十一

《葛氏方》大便血方：

刮鹿角作屑，以米汁服五分七。(日三四之。)

又方：燒鵲巢為屑，飲之少少許。

《千金方》大便竟出血方：燒甑帶末塗乳飲之。

又方：燒車 一枚赤，納一升水中，分二服。

《僧深方》茅根二把，以水四升，煮取二升，服之。

### 治小兒小便血方第一百十二

《產經》云：小便血方：

末龍骨，溫酒服方寸七。

又方：煮大麻根飲之。

又方：煮白 根飲之，多少任意。

《千金方》小兒尿血方：

燒鵲巢灰，井花水服之。

### 治小兒淋病方第一百十三

《病源論》云：少兒淋者，腎與膀胱熱也。其狀小便出少起數，小腹急痛引臍是也。

《千金方》：車前子一升，水四升半，煮取一升半，分三服。

又方：滑石水煮服之。

又方：蜂房，亂髮分等燒末，水服兩錢七。

《效驗方》陳葵子一升，水二升，煮取一升，分三服之。

《短劇方》治少小淋瀝，形羸不堪，大湯藥者：枳實三兩，炙，篩，兒三歲以上服方寸七，兒小以意稍服之。有驗。

《僧深方》云：車前子，滑石分等，冶篩，麥粥清和，服半錢匕。

《產經》治少小石淋方：

蜂房(一分)，炙 桂心(一分)

凡二物，冶篩，服一刀圭，以銅器承尿，尿與石俱出。

#### 治小兒遺尿方第一百十四

《病源論》云：遺尿者，此由膀胱有冷，不能約於水故也。

《千金方》：灸臍下一寸半，隨年壯。

又方：小豆葉搗汁服之。

《葛氏方》：取燕巢中蓐燒，服一錢匕即瘥。

#### 治小兒身黃方第一百十五

《病源論》云：小兒在胎，其母臟氣有熱，熏蒸於胎；至生兒皆體黃，謂之胎疸。

《千金方》治小兒身黃方：搗土瓜根汁五合服之。

又方：麥青汁服之。

又方：搗韭根汁，滴兒鼻口，大豆許。

#### 治小兒身有赤處方第一百十六

《病源論》云：小兒因汗，為風邪熱毒所傷，與血氣相搏，熱氣蒸發放外，其肉色赤而壯熱是也。

《千金方》治小兒身有赤處者方：

熬米粉令黑，唾和塗之。

又方：伏龍肝、亂髮灰、豬脂，和，塗之。

《葛氏方》：燒牛屎塗之。

又方：雞冠血塗之。

### 治小兒腹皮青黑方第一百十七

《病源論》云：小兒因汗，腠理則開，而為風冷所乘，冷搏於血，隨肌肉虛處停之，則血氣沉澀，不能榮其皮膚，而風冷客之於腹皮，故青黑。

《千金方》治小兒猝腹皮青黑方：

灸臍上下左右，各去臍半寸，並鳩尾下一寸，五處三壯。

又方：酒和胡粉塗上，若不急治，須臾即死。

### 治小兒赤疵方第一百十八

《病源論》云：小兒有血氣不和，肌肉變生赤色，染漸長大無定，或如錢大，或闊三數寸。〔今按：小兒藍注有《病源》死（無）治方。〕

《千金方》：治小兒體有赤疵，赤黑方：摘父腳中，取血貼疵上，漸消。

又方：狗熱屎塗之，皮自卷落。

《產經》云：小兒赤斑駐方：唾、胡粉和，從外向內塗之。

又方：屋塵，臘月豬膏和，敷之。

又方：鐵屎，以豬膏敷之。

### 治小兒癩瘍方第一百十九

《產經》云：治小兒身上癩易方：

石硫黃以苦酒研之，塗病上，日三。（出《產經》。）

又方：生栝藋切一升，以驗苦酒三升，煎取一升汁，塗病上良。此是德家秘方不傳。（出

《產經》。）

### 治小兒疣目方第一百二十

《病源論》云：人有附皮肉生，與肉色無異，如麥豆大，謂之疣子，即疣目也。此多由風邪客於皮膚，血氣變化所生。故亦有藥治之瘡者，亦有法術治之瘡者，而多生於手足。

《千金方》方：以刀子決目根四面，令血出。取患瘡人瘡中黃膿敷之，勿近水，三日即膿潰、根動、自脫。

《產經》：以松脂塗疣上一宿，即落。良。

又方：以礬石拭疣上七過，即去。

又方：艾柱小作，可灸始生疣上三壯，即自去。良。

又方：月晦日於廁前取故草二七枚，拭目上，訖，祝曰：今日晦疣驚去。勿反顧之，不過十日枯死。

今按：俗人以赤莧汁敷之即落，或以煮荒布之汁洗之。

### 治小兒身上□方第二百二十一

《千金方》治小兒體上□方：

取馬尿洗之，日三四度。

又方：揩破以牛鼻津塗之。

### 治小兒身熱方第二百二十二

《病源論》云：小兒血氣盛者，表裡俱熱。則煩躁不安，皮膚壯熱。

《千金方》治少小身熱李葉湯方：

李葉無多少，咀，以水煮，去滓，浴兒。（今按：《短劇方》：避日反陰處。）

《蘇敬本草注》云：梓白皮主小兒熱瘡，身頭熱煩，煮湯浴並散敷之。

《葛氏方》：治小兒猝身熱如火，不能乳哺方：

猝急斷犬耳，取血以塗兒面及身也。

《本草拾遺》云：小兒暴熱，搏（搗）水芹，取汁塗之。

又方：生銀，小兒諸熱，以水磨服，功勝紫雪。

### 治小兒盜汗方第二百二十三

《病源論》云：小兒盜汗者，眠睡而汗自出也。若將養過溫，因於睡臥陰陽氣交，津液發泄，而眠臥汗自出也。

《葛氏方》：以乾薑末一分，粉三分，合以粉之。

又方：石膏一兩，麻黃二兩，蜜和如小豆，服一丸。

《短劇方》：黃連三分，貝母三分，牡蠣二分。凡三物，粉一升，合搗下篩，以粉身。

《集驗方》：麻黃根三分，故扇燒作屑一分。治合乳汁，飲三分七，大人方寸七，日三。（《短劇方》同之。）

### 治小兒隱疹方第二百二十四

《病源論》云：小兒因汗而解脫衣裳，風入腠理。與血氣相搏成之，結聚起相連，成隱疹。風氣止在腠理浮淺，其勢微，故不腫不痛，但成隱疹癢耳。

《千金方》治隱疹方：

鹽湯極鹹，洗，絞蓼塗之。

又方：蠶砂（二升），水（二升），煮，去滓，洗之。

《產經》云：治小兒風瘙隱疹入腹，身體腫強舌乾燥。腫方：

末蕪菁子，酒服方寸七，日三。

《極要方》：芒硝二兩，清酒三升，煮取二升，洗癢上，良。菁子酒服存七日三。

### 治小兒丹瘡方第二百五

《病源論》云：風熱毒客在腠理，熱毒搏於血，蒸發於外，其皮上熱而赤，如塗丹，故謂之丹也。若久不歇，則肌肉爛傷也。

《產經》云：夫丹者，惡毒之氣，五色無常，不即治，轉壞肌肉，治之方；則去膿血。或發於節解間，多斷人四肢，治之方：赤小豆作屑以甘草湯和塗之。

今按：《錄驗方》：和麻油（經溫）塗之。

又方：升麻湯，大黃湯主之。

《錄驗方》治小兒丹毒方：

取甘蕉根敷之，亦宜服少許汁。

又方：搗慎火草敷之。

又方：取白鵝血敷之。

《千金方》搗赤小豆和雞子白塗之。

又方：

牛屎塗之（乾復易）。

又方：伏龍肝下篩，雞子白和油敷之。

又方：和油塗之。

《短劇方》：水中苔搗敷之。

又方：芒硝納湯中取汁拭上。

《新錄方》：水若油研（和）梔子仁，採汁洗之。（取濃汁，洗塗，日二三易）。

又方：生藍汁塗之。

《范汪方》：以生魚血塗之。（《葛氏方》乾更塗之。）

《蘇敬本草注》塗鯉血，良。

又云：搗菜敷之。

又方：煮栗毛殼洗之。

《本草拾遺》云：鯽魚膾，主小兒大人丹毒。

又云：淬鐵水，主小兒丹毒，飲一合，是打鐵槽中水也。

### 治小兒赤游腫方第二百二十六

《病源論》云：小兒有肌肉虛者，為風毒熱氣所乘，熱毒搏於血氣，則皮膚赤而腫起，其風隨氣行游不定，故名赤游腫也。

《千金方》：凡小兒赤游行於體上，不治入腹即死。治之方：

用伏龍肝，末，和雞子白塗，乾易之。

《葛氏方》：糯米研，和粥敷之。

又方：米粉熬唾，和塗之。

《華佗方》云：芸苔搗敷之。

### 治小兒身體腫方第二百二十七

《病源論》云：小兒腫滿，由將養不調，腎脾二臟俱虛也。其狹水腫者，皮薄如熟梨(李)之狀。若皮膚受風，風搏血氣致腫者，但虛腫如吹，此風氣腫也。

《產經》云：少小兒中風，水中身體腫滿浴方：

取香以水煮取汁，以漬浴之。良。

又方：赤小豆煮取汁，漬浴，甚良。

《千金方》云：小兒手足身體腫方：

以小便溫漬之，良。

《僧深方》云：少小手足身體腫方：



取鹹菹汁溫漬之。汁味盡易。

### 治小兒惡核腫方第二百二十八

《產經》：治小兒惡核腫，壯熱欲死，升麻湯方：

升麻（一兩） 夜干（半兩） 沉香（一分） 黃芩（一分） 丁子（三銖）  
凡五物，切，以水一升五合，煮取六合，分三服，一歲兒一服半合，隨兒大小，  
增減水藥，神驗。

### 治小兒瘰方第二百二十九

《產經》云：治小兒瘰癧如梅李海藻酒方：

海藻一斤，切，以酒二斗漬之，稍稍飲之。

### 治小兒諸方第三百十

《產經》云：治小兒諸方：

以大膏和胡粉磨瘡，良。

### 治小兒瘦方第三百十一

《產經》云：治少小瘦瘰癧，久年不瘥海藻酒方：

海藻一斤，去鹹，切，好酒二斗漬，服二合，日二三，酒盡滓干作散，服方寸  
七。

### 治小兒附骨疽方第三百十二

《產經》云：凡小兒有附骨疽者，招抱才近其身，便大啼喚，即是肢節有痛處，  
或四肢有不欲動搖，如不隨狀。治之方：初得即服漏蘆湯下之，敷小豆薄。

### 治小兒疽方第三百十三

《產經》云：凡疽著指，與代指相似，人不知不忽治，其毒入臟，殺人。更  
審之，疽著指端者，先作黑，痛入心也。先刺指頭，去惡血，以艾灸七壯，  
良。

又方：服犀角汁，佳。

又方：服升麻汁。

又方：服葵根汁。

又方：服竹瀝汁。

又方：服藍青汁。

### 治小兒代指方第三百三十四

《產經》云：代指者，先腫，欣欣熱色不黯也。然後緣爪甲結膿，劇者脫爪也。治之方：甘草湯熱漬之。

又方：芒硝汁漬之。

又方：刺去血，漬熱湯。

又方：以豬膏和鹽熱納指甲，須臾即安。若已膿者，針去膿血。

### 治小兒疥瘡方第三百三十五

《病源論》云：饒蟲多變化所作，其瘡裡有細蟲，甚難見。小兒因乳養之人疥而染著。

《千金方》：燒竹葉末，和雞子白敷，日二三。

又方：酥和胡粉塗之。

又方：亂髮灰和臘月豬脂敷，之。

《產經》：蜀椒五合，搗末，以水一斗，煮三沸，去滓，溫洗浴，良。食頃良，若癢不止，複漬之。食頃良。

### 治小兒癬瘡方第三百三十六

《病源論》云：癬瘡由風邪與血氣相搏為癬。小兒面上生癬謂之為乳癬，言乳汁潛穢兒面而生，仍以乳汁洗之便瘥。

《產經》：凡癬不搯破上皮而藥塗者不除，用黑毛牛矢溫洗之。良。

又方：末桃白皮，以苦酒和塗之。

又方：胡粉熬令黃色，和酢塗上，燥複塗，良。

《千金方》濕癬方：

桃青皮，搗，和酢塗之。

又云：乾癬方：枸杞根，搗，以豬脂和敷之。又以醋和佳。

《集驗方》以水銀合胡粉敷之。

又方：蛇床子末和白膏敷之。

### 治小兒浸淫瘡第三百三十七

《病源論》云：小兒五臟有熱，外為風濕所折，發瘡。

《千金方》：灶中土二分，髮灰一分，末，下篩，豬脂和敷之。

《產經》：取牛屎，絞取汁，塗之。

又方：以乾牛屎燒熏，良。

又方：胡燕巢，末，和水敷之。

### 治小兒瘡方第三百三十八

《病源論》云：者，風濕搏於血氣所成，多著手足節腕間匝匝然，搔之癢痛，浸淫生長，呼之為，以其瘡有細蟲，如蝸蟲。

《產經》治小兒大人蝸疥百療不瘥方：

地榆(五兩) 棟實(一升) 桃皮(五兩) 苦參(五兩)

凡四物，以水一斗，煮取五升，溫洗良，並治癬。

又方：谷樹白皮一合，臘月豬脂一合，苦酒二合，小蒜半合，釜下土半合。凡五物，搗如泥，以敷上，密裹，乾複塗之。

### 治小兒王灼瘡方第三百三十九

《病源論》云：腑臟有熱，熱熏皮膚，外為濕氣所乘，則變生瘡。其熱偏盛者，其瘡發熱亦盛。初生如麻子，須與王大，汁流潰爛，如湯火所灼，故名王灼瘡。

《千金方》：小兒王灼瘡者，一身盡有如麻子小豆者，戴膿汁出，乍痛乍癢乍熱方：

又方：桃仁熟搗，和面脂，塗之。

又方：牛□ 灰敷之。

又方：燒艾灰敷之。

《產經》治小兒黃爛瘡方：

黃連 胡粉

上二物，治下篩，分等，以麻油和塗之。

### 治小兒月蝕瘡方第四百十

《病源論》云：小兒耳鼻口間生瘡，其謂月食瘡，其瘡隨月生死，因以為名也。世云：

小兒見月初生，以手指指之，則令耳下生瘡，故呼為月食瘡也。

《千金方》：治小兒疥月蝕月死方：酥和胡粉塗之。

又云：月蝕九竅皆有者方：

又方：燒蚯蚓令赤，屎末和膏敷之。

《葛氏方》：以五月五日蝦蟆屑和膏敷之。

《產經》：取蘿摩草汁塗上。

又方：銼槐枝煮取汁洗之。

《龍門方》：豬脂和杏仁敷之。

《徐之才方》：小柏皮搗為末敷之。

#### 治小兒凍瘡方第一百四十一

《病源論》云：小兒冬月，為寒氣傷於肌膚，寒氣搏於血氣，血氣壅澀，因即生瘡，其瘡腫而難瘥，乃至皮肉爛，謂之為凍瘡(爛)瘡。

《產經》云：小兒冬月涉水，凍手足，瘡壞疼痛方：

取麥蘘，煮(令濃)熱，洗漬之(即愈)。

又方：櫟木灰和熱湯(取汁，清)洗之，良。

《千金方》：生胡麻搗敷之。

#### 治小兒漆瘡方第一百四十二

《病源論》云：人無問男女大小，有稟性不耐漆者，見漆及新漆器，便著漆毒，令頭身面體腫，起隱疹色赤，生瘡癢痛是也。

《產經》云：治小兒犯觸漆器，面目皆腫，身體作瘡，爛方：

嚼□塗之。

又方：芒硝若礬石一一著鹽湯中令消，以洗之。

又方：煮柳葉洗之。

又方：搗薤以塗之。

#### 治小兒蠟尿瘡方第一百四十三

《千金方》搗梨葉敷之。

又方：燕巢土酢漿和敷，乾，易。

《產經》云：初得便以犀角水磨塗上。

又方：鹿角燒末，苦酒和敷之。

又方：小豆屑苦酒和敷之。

又方：大麥飯嚼敷之。

又方：胡粉以生油和塗之。

#### 治小兒惡瘡久不瘥方第一百四十四

《病源論》云：夫身體生瘡，皆是臟熱沖外，外有風濕相搏所生。而風濕之氣有挾熱毒者，其瘡則痛癢腫，久不瘥，名為惡瘡。

《產經》燒蛇蛻末，以豬膏和敷之。

又方：豆豉熬(令黃)，末，敷上。

《集驗方》：浣其父，取汁，以浴兒，勿令兒及母知，大良。

《葛氏方》燒亂髮並釜月下土，豬膏和敷之。

又方：梁上塵敷之。

又方：黃連、胡粉、水銀末，和敷之，若瘡燥，和豬肪敷之。

《隨時方》：取桑樹孔中水洗之，立瘥。

《范汪方》：燒雞屎敷之。

《本草拾遺》云：廁中泥敷之。

#### 治小兒金瘡方第一百四十五

《病源論》云：小兒為金刃所傷，謂之金瘡。

《產經》云：以灶灰敷瘡中。

又方：馬屎燒末，著瘡中。

又方：燒綿末，著瘡孔中。

又方：燒青布煙絕敷之。

今按：地菘敷之。

#### 治小兒湯火灼瘡方第一百四十六

《千金方》：熟煮大豆濃汁，溫塗之，無瘢。

又方：白蜜塗，日十遍。（《僧深方》：十餘口之。今按：《經心方》：以蜜解，冷水飲之。）

今按：《經心方》以蜜斛（解），冷水飲之。

《產經》：石膏末敷之立止。

又方：桑灰水和敷之。

#### 治小兒竹木刺方第一百四十七

《產經》治小兒竹木刺及針不出方：

燒鹿角末水和塗瘡口立出，不過一夕，良。

又方：生牛膝根搗敷瘡口，令自出。

又方：嚼白梅，烏梅敷之，水和塗之。

又方：王不留行，瞿麥隨在，服方寸匕，日三，自出。

#### 治小兒落床方第一百四十八

《葛氏方》：治小兒落床墮地，腹中有瘀血、壯熱、不欲乳哺、啼喚方：

大黃 黃連 蒲黃（各二分） 芒硝（一分半）

以水二升，煮取一升，去滓，納芒硝，分二三服，當大小便去血。（《產經》同之。）

#### 治小兒食不知飽方第一百四十九

《病源論》云：小兒有嗜食，食已仍不知飽足。又不生肌肉，亦腹大，其大便數而多（泄，又呼為豁泄），此腸胃不守故也。

《千金方》治小兒食不知飽方：

鼠屎二七枚，燒末服之。

### 治小兒吐食方第一百五十

《千金方》：取肉一斤，繩系曳地行數裡，勿洗，火炙啖之，良。

### 治小兒吐血方第一百五十一

《病源論》云：小兒吐血者，是有熱氣盛而血虛，熱乘於血，血性得熱則流散妄行，氣逆即血隨氣上，故吐血也。

《千金方》：油三分，酒一分，和，日再服之。

### 治小兒咳嗽方第一百五十二

《病源論》云：小兒咳逆，由乳哺無度，因挾風冷，傷於肺故也。

《產經》治少小十日以上至五十日猝得□咳，吐乳，嘔逆。晝夜不息方：

牡桂(三分) 甘草(十分) 紫菀(三分) 麥門冬(七分)

凡四物，以水二升，煮取半升，以綿著湯中，漉兒中口，晝夜四五過與之，即乳哺。

《千金方》云：主小兒大人咳逆短氣，胸中吸吸，吐出涕唾。出臭膿方：

燒淡竹瀝，煮十沸，小兒一服一合，日五。大人一升，日五。今按：大棗丸尤驗。(其方在第九卷大人方。)

《張文仲方》云：孩子咳嗽宜與乳母藥方：

竹葉(切一升) 石膏(碎) 乾薑(各四兩) 貝母(三兩) 紫菀 百部根(各二兩)  
上六物，切，以水八升，煮取二升六合，分三服，但乳母禁食蒜面。

《新錄方》治小兒嗽方：

飲服紫菀末。

《僧深方》云：款冬花丸治小兒咳嗽方：



款冬花(六分) 紫菀(六分) 桂心(二分) 伏龍肝(二分)  
上四物，下篩，蜜和如棗核，著乳以日三夜二。(今按：以大棗丸治之尤驗，其方在大人方中。)

### 治小兒食魚骨哽方第一百五十三

《產經》云：治小兒食魚骨哽方：以大刀環磨喉二七過，良。

又方：燒魚骨末，以水飲之良。

又方：仍取投地魚骨著耳上，因□咳之即出。

又方：燒鷓鴣羽，末，以水服之，即出。

### 治小兒食肉骨哽方第一百五十四

《產經》云：治小兒食諸肉，骨哽方：

狸骨末服方寸七，良。

又方：取雄雞左右翮大毛各一枚，燒末，服一刀圭。

### 治小兒食草芥哽方第一百五十五

《產經》云：治小兒飲食過草介，雜物哽方：

以好蜜少少咽之。

又方：末瞿麥，服方寸七。

又方：以豬膏和雞子吞之，不去複吞兩三過，良。

### 治小兒飲李、梅輩哽方第一百五十六

《產經》云：治小兒吞李、梅之輩。塞咽不得出方：

以水灌兒頭上，承取汁，與飲之良。(《葛氏方》同之。)

### 治小兒食發繞咽方第一百五十七

《產經》云：治小兒食發澆咽方：

取梳頭髮燒末，服一錢匕。（《極要方》同之。）

#### 治小兒誤吞錢方第一百五十八

《產經》云：治小兒誤吞錢方：

搗炭服方寸匕。

又方：服蜜一升即出。

又方：艾一把，以水五升，煮取一升，頓服之，立下。

#### 治小兒誤吞針方第一百五十九

《千金方》治小兒誤吞針方：

吞磁石棗大，立出。（今按：《產經》云：末，少少服之。）

《產經》云：小兒誤吞針、箭、金鐵物方：

多食肥羊脂肉及諸肥物，自裡出之。

#### 治小兒誤吞釣方第一百六十

《產經》云：治小兒誤吞釣鉤緒若在手中莫引之方：

以珠若薏苡子，貫著繩，稍稍推，令至釣處，少少引之，即出之。

#### 治小兒誤吞方第一百六十一

《產經》云：治小兒誤吞方：

取韭，曝令萎，煮，不切，食多大束。

又方：多食白糖，自隨出之。

#### 治小兒誤吞方第一百六十二

《產經》云：治小兒誤吞若驅方：

燒鷹羽數枚，末服之，家所養鵝羽亦可用之。

### 治小兒誤吞竹木方第六十三

《產經》云：治小兒誤吞竹木方：

取布、刀、故鋸，燒染酒中。以女人大指爪甲二枚燒末，納酒中，飲之良。

醫心方卷第二十五

《候水鏡圖》云：治小兒瘡於大人異。

治大丹方：

蕎麥面 黃鹽(各少許) 水銀 牛乳(各少許)  
上，同研令極細，塗之便瘥。

治赤斑瘡方：

土龍子(一條) 赤小豆(少許) 牙屑(六分) 薰陸香(少許加，無以鬱金代之)  
上物，細研，以新汲井水調灌之立瘥。

治豌豆瘡方：

干漆(炒斷煙) 人中白 瓦松灰(各少許) 馬牙硝(一分)  
上，並研令細，空心，冷漿水調一錢，溫服之，取吐為度。吐了又服一錢，利  
三五行，其瘡自瘥。

治小兒急疳痢瀉不止，或濃，或血，或青，或黃發作穗，或頭發墜落，鼻乾，  
咬指，吃炭，吃壁土，金髓散方：

黃連一兩，(宣州者為末，用雞子一個取清和連末作餅子，炙焙) 石中黃(一  
分) 禹余糧 麝香 朱砂(各少許) 烏頭[二個，生，去臍尖 肉豆[一介  
(個)] 訶子[二介(個)，去核] 金牙石(一分)  
上件物，並為散，空心，以米飲下，一歲兒一字，五歲一錢，忌熱物。

治小兒紫疳，面模黑色，身上或生青斑、紫斑，鼻內生瘡，腦陷，手背、腳背  
虛腫。不脫肛，不腦陷即榘醫。宜服竹天黃丸方：

天竹黃(小一分) 朱砂(一小分) 巴豆(一粒, 去皮心) 膜麩(炒壓出油) 麝香(小許) 烏頭(一顆, 生去臍尖)

上五味, 細研為末, 以蟾酥為丸如黃米大, 一歲兒一丸, 空心溫米飲下如吃奶奶汁下。忌熱面, 毒魚及一切熱物, 不忌冷物。