

喉风三十六症

斗底风

欲识人间斗底风，十分红肿在心胸，更加痰壅咽喉内，针药无功命必终。

此症初起吞咽不下但胸前红肿渐至结喉，一时难安，初起能咽水者，可治，先用角药加摩风膏少许，冷井水调噙，取痰次开风路针，(所谓开风路针者盖喉风都是风邪按穴针刺开其风壅之路使之外出也)三吹冰硼散，四用紫地汤如病势紧急汤水不能下，遍身作痛，气喘眠卧不得，循屋下行，胸前赤肿，凡吐痰涎后仍不退者，百无一治，每初起胸前便现青筋须用破皮针，(即铍针也)针青筋边，立效。

枢扶氏曰，是症宜用雄黄解毒丸，服之，吹赤麟散。

叉喉风

叉喉之症最为殃迟了三时命不长，病者能根据方法治，管教依旧进茶汤。

男子妇人喉内生此疾者，璫为急症，先咽喉作紧，风痰上涌多有涎内紧外浮肿不能饮食渐至咽喉紧闭，如叉叉住，甚则头面浮大其患最速，宜急治之，若一二日不知治者多致殒命先用冰硼散开窍，次用风路针三用摩风膏少许和角药调噙，取喉内痰涎并用角药敷颈外浮肿处，服紫正散加开关散如病势已璫，不能开关者，不治，按此症既速凡初起当用赤麟散吹之，其效更捷。

咽疮风

咽喉此症不为良黄烂成疮作祸殃，根据法频施无效处，必然长梦入黄粱。

初起生咽喉间，或红黄色如粟形者日久满喉成疮，及满口生者，渐变紫黑不能吞咽，先用角药次开风路针，服紫地散以冰硼散吹之，即效惟风热实症可治，若内伤咳嗽吐血后而发此症者，切不可用此等药致枉人命也。

枢扶氏曰，按咽疮一症虽曰真阴亏竭相火熏灼上升咽喉发为咽疮，最为虚损恶症，然其间虚实阴符，亦当分别治之凡属实症，由于风热者，必须发热恶寒，疮色红黄，右脉浮数有力因病患平昔过食煎炙蕴积于胸膈，今又新受风邪，感触而发，治宜以喉科诸药投之，自然获效，若虚症，形色白而干燥不润内热口渴饮食微少疼，惟咽津液其痛更甚，此由真阴已亏，虚损所致，然内伤有二种，一属气亏为符虚，一属血亏为阴虚，符虚者，紫寸浮数遇劳益甚而

行。动则气喘此脾肺气虚穷及肾水。须培补中土。庶无差误今时医不识。以清凉利痰之剂治之。遂致喉间变生咽疮。顿成不治之症。若阴虚者。紫尺洪数。重按无力现于外者。内热咳嗽吐痰衄血。或饮食日絀。此肝肾阴虚不能蓄养龙雷真火盖阴虚则火旺。火旺则水竭。水竭则肾元枯涸。肾元枯涸则相火奔腾而浮上斯喉痹咽疮。痰结烦燥声哑之症作矣俗曰火烧碯门是也。其时若以六味补水真水不能骤生。以生脉保肺而久炎之肺又非参麦能疗。以八味降火。而咽喉之地难受桂附之性。以滋肾丸互治水火。而水火不能既济。惟急用甘露饮治之。使水火各安其位。得以浚其源而安其流。能导龙归海使五行自有相生之象然后再按脉察色。分别治之。或八味六味或归脾养荣诸方佐之。自然获奏神效称为璣丹。然患者亦当早治勿待病入膏肓。虽有神丹。亦无济也。

鱼鳞风

喉间忽尔患鱼鳞。多少医家不识真。此症若求痊愈易。只须针药贵于频。

此症生在帝中之下与松子风相似但微肿处起白点。日久白点变成鳞。其鳞向下者是用冰硼散。赤鳞散开风路针服紫地汤以角药加摩风膏调噙。不可用刀。此症璫险难治。治与双松子同。初起未成鳞易治。若已成鳞。则饮食到喉俱作呕恶。乃属不治。或内伤咳嗽而发斯症者。万无一治。如大便秘结不通。汤中须加犀角木通元明粉。以角药冰硼散赤鳞散。相间吹噙勿断。用鹅毛多挑角药入帝中旁含少顷再绞取痰涎吐出。自然获效。

图(图缺)

双松子风

松子风生喉膈中。逐时胀大起鳞红。莫言此症多遭险。随即疗施亦见功。

此症生靠帝中下边初起紫边红紫如粟形大。逐时肿胀。起鳞向上者是。渐长如绿豆大。似松子一样。甚至黄皮裹住及有莲子大者。斯难治矣。先开风路针。服紫地汤。加银锁匙开关散用角药加摩风膏调噙吹冰硼散。治与鱼鳞风同。二三日若转红为黄。就怕起鳞须以角药频噙勿离。根据法治之。亦不可用刀此症与鱼鳞风皆属险症勿得轻视也。

单松子风

单名松子一边生左属心兮右肺金针药交施根据法治自然奇效立消平。

此症生在帝中下一边肿者是或生左或生右。亦不可用刀治法。与双松子同。惟生左者。汤中倍加丹皮赤芍。右者倍用桔梗连翘。

帝中风

时人忽患帝中风角药频噙自见功。若遇庸工无识辈。针刀误用命随终。

初起红肿作痛。生痰不能饮食日久渐长大出来。甚有长出寸许。拦腰烂去半截或帝中全行烂去者。虽一时难治。仍为无害只根据法治之。亦见奇效。若初起先以角药取痰开风路针吹冰硼散。服紫地汤不可用刀。如日久帝中黑烂者。回生丹不宜用。当以真功丹去牙硝吹之。或口疳散。圣功丹皆可互用。至于水剂。又当以紫地加絳出入投治。不可执拘呆方也。

双鹅风

乳鹅红肿在喉间。病者求痊亦不难。角药频施兼服剂。自然取效莫愁烦。

凡咽间红肿似疔毒紫枚。而生在紫边者。是为双鹅。切勿误用刀。先以摩风膏少许入角药并水调噙。又以鹅翎挑入喉间疔毒上令病患闭目噙良久。俟满口痰来吐出。再吹赤麟散服紫地汤。自然立效。如日久疔毒未平。仍似**莲子**样。须用消芦散加**巴豆**七个去晓熏患处。如熏破后只可用吕雪丹。

枢扶氏曰。喉间诸症惟患双单鹅甚多。症候虽轻易治。却难速于平消。迩来庸医不识。欲求速效。每妄用针刀。反致枉人命者。亦复不少。今附参而订之。俾后世治者。庶不致有误苍生耳。盖此症由肺经积热。受风邪凝结感时而发。致生咽喉之旁。状如蚕蛾。亦有形若枣栗者。红肿疼痛。不能吞咽。然形有双有单。双者轻。单者重。凡初起先用**三棱**针刺少商少冲留三呼吸入一分。吹赤麟散。以角药调噙。仍服前药缓缓取效。凡针法以男左女右。若要速效。以捷妙丹吹入鼻中即消。然初起神效若日久者。不外消芦散。

单鹅风

左畔虚簪热上攻。乳蛾单重喉旁风。关前易治疗须急。关后生兮施不同。

此症生在帝中之旁。如**莲子**样。左属心。右属肺。治法与双蛾同。亦不可用刀。

枢扶氏曰。此症有部位之分。有虚实风热气郁之别。凡生于帝中紫边者是。双单蛾属关前实症。为易治。若起于咽喉内者。名喉瘤。属关后气郁虚症。却难治。时医不识。概以鹅症治之。安能获效。然喉瘤。由肝肺二经郁热。更兼多语损气性躁而成。形如圆眼。红丝相裹。或双或单。生于喉内之旁。亦有顶大蒂小者。初起喉间微痛。不恶寒发热。日久形色带白而微硬。不犯不痛。或因醇酒炙爆。或因怒气喊叫。犯之则痛切。忌用针刀。吹以消瘤碧玉散。宜服

加味逍遥散，益气清金汤，或用[夏枯草](#)同[郁金](#)煎汤代茶服之，日久自然消退，若体虚，因忧郁不舒而发是疾者，宜用归脾汤，加[柴胡](#)丹皮山栀，至于出入加絃之法，又当神而明之可也。

双燕口风

燕口生在帝中旁欲尝饮食不能病，针刀善施无差误，功效旋收亦不难。

此症生在帝中紫边靠于上，左右俱有，皆红肿不能吞咽，甚至肿出舌上来连舌亦痛，用刀之法，宜靠肿处将刀轻轻刺破，切不可深，若上中间及燕口形上，切勿将刀误用，先以角药取痰次开风路针，吹回生丹，服紫地汤。

枢扶氏曰，此症初起只须吹赤麟散，胜用角药针刀多多矣，内仍服紫地汤加开关散，火甚，量加石膏，此余屡经收效者也。

单燕口风

单名燕口一边生，治法同前不用更，慎使针刀毋误及，赤麟吹上立奇功，是症，或生左，或生右，亦有肿上舌来不能饮食者，甚则将帝中挤往一边了，治法与双燕口同。

重风

口内生来上，浮，心脾有热积成愁，珥然七窍流脓血，纵遇卢医未必神。

此症生在上，靠帝中之上位，红肿不能吞咽，症虽重却可治，以角药调噙，内消为贵，如不得消，直肿到牙床边者可用破皮刀轻切出血，若上中间乃七孔相连之处，万勿误用刀，宜吹冰硼散，服紫地汤，开风路针，如口耳鼻中有一处出脓血者，即是病延日久，热毒蕴蓄，以致腐穿七窍，此诚不治之症。

枢扶氏曰，重者，皆由心脾二经积热而成，珥病日久前药治之不效宜用紫雪散治之服[黄连解毒汤](#)，即效。

木舌风

口中舌表肿兼红热积心脾发是风，丹散频投根据法治，管教立刻见奇功。

初起舌头红肿不能转动渐至饮食不能迎送，言语不便，可用破皮刀于舌下弦紫边无筋处刺之，(筋上不可刺，刺伤立死)先用角药加摩风膏少许，吹冰硼散，服紫地汤，自效。

重舌风

重舌风兮亦不祥，或生左右或中央，专家有诀通元妙，善使针刀割不妨。

凡舌下又生一舌，渐比正舌尤长，以致正舌不能转动，用角药取痰，吹冰硼散，服紫地汤，可用破皮刀须按舌旁边下弦先破一边，如不效，再破一边。

枢扶氏曰，此症无论大人小儿，皆由心脾蕴热循经上冲舌本，遂令舌下血脉胀起如小舌状，故名重舌，用刀之法，先将角药加摩风膏噙久吐出，再将肿患刺破，即吹回生丹或紫雪散并获效。

坐舌莲花风

舌坐莲花六七尖，心家风火转相炎，莫将斯症寻常看，日久缠绵最可嫌。

舌下浮肿多痰涎初生一二瓣渐至五六瓣形似莲花，凡紫边尖瓣者可用刀若中间一瓣尖者，切不可用刀，盖人舌下中间俱有一筋，直连上下，乃心之苗，所以切不可用刀者，恐误伤筋，则枉人命匪浅也，先用角药调敷舌下取痰涎，再将冰硼散挑上，服紫地散，重加连翘，症甚者，外用气针自然取效。

枢扶氏曰，莲花证乃蕴热乘风而发于心，舌本属心，又为心之苗，心火上炎，或思虑太过或酒后当风受寒，以致风痰相搏，而成是症也。

合架风

合架风生齿尽头，牙关紧闭病难休，若还不识针刀法，患者如何得便神。

此症生在上下牙床紫根头勾合之处，起一红核肿痛，牙关紧闭不能开口先用角药调噙，次用破皮刀切红肿处，吹冰硼散赤麟散可用消芦散熏之。

角架风

风名角架不为嘉肿痛须知药可加，昧却个中真妙诀，任他肘后秘方夸。

是症生上下牙床尽处，根上浮肿，以致闭口不便紫齿难合咀嚼艰难，初起生在一边或延生紫边者治法同合架风，可用破皮刀切肿处，即效。

爆骨搜牙风

爆骨搜牙疾势骄声声痛楚费推敲。金针已度根据方法。功效随收心莫焦。

牙匡之上逐齿红肿骨中璫痛不可忍者。名为爆骨搜牙。若通牙床上红肿。或在外牙床肿者。或在内牙床红肿。口内作烧生痰名搜牙风。若有面红肿者。恐成粟房风症。部位虽分内外。法宜同治。先用角药调噙。吹冰硼散。服紫地汤。次以针挑牙缝中有红紫血管者。即要挑断出血。若爆骨搜牙。每齿肿处俱要用破皮针。针出血即效。如症在牙床内者必须肿起牙上。方可用刀。

牙痛风

牙匡生疔是牙痛上下生兮总共同。但用破皮针出血更加角药有奇功。

凡牙匡生疔毒或满匡红肿或一处红肿。先用冰硼散以角药调噙。服紫地汤。凡牙痛搜牙疔症。以牙床高低界为辨。在牙床上高处为搜牙。在牙床下低处为牙痛。此症亦有内外生者。皆可用破皮针。针去脓血自效。

枢扶氏曰。此症由箴明胃热毒所致。初起身发寒热。腮颊浮肿红痛者。当以前法治之。若初起往往有认牙疼等症。过服寒凉清火之剂。以致坚肿色淡。自破流黄水日久烂至牙根。及延烂咽喉。名曰骨槽风。又名附骨。一名穿珠。法当用二陈汤加箴和丸煎服。或箴和汤消之。珥遇溃者以箴和汤犀黄丸。每日早晚轮服。珥有多骨。以推车散吹入。隔一夜其骨不痛。自行刺出。须俟骨尖退出。摇则内动。方可渐次取下。再吹。次日无骨退出即以生肌散吹入内服保元汤。加肉桂归芎。草宜生自然获效收功。而愈矣。

凡骨槽风首。初起牙骨及腮内疼痛。不肿不红。惟肿连脸骨者。是骨槽风也然齿症不一。有齿者。是虫蚀齿至龈。由胃经瘀湿风火凝聚而成。齿根胀痛腐烂时出脓血臭汁也。有齿齲者亦以箴明入风热之邪。转齿龈气血。腐烂为脓血臭汁。谓之齿齲。(音拒)亦云风齲有齿历蠹者。由骨髓气不能荣盛。故令齿黑黯谓之历齿。皆由箴明之所致而治法各理。俱详注续集焉。

悬风

牙床浮肿号悬。外症能疗内症危。烂及咽间妨饮食。蓬莱妙药亦难施。

凡牙匡下浮肿为外悬。起生牙根内为里悬。红肿如蜒蚰样。渐次而长。先用角药调噙。吹冰硼散。服紫地汤。初起可用破皮针。日久不宜针。(刺红肿处出血效。若白烂者不可用针)凡外悬属善症。易治。生于内属恶症。却难治。稍医差迟。即能伤人。若白烂延至咽喉。及落尽面颊肉者。不治。

夺食风

(即呛食风)

呛食还将夺食名，舌根喉 震然成，休蚤是疾无方法，善使针刀泡立平。

此症或因饮食火物，触动肺胃积热，致簏起斯症，或在喉头上，及舌根左右生一血泡，或数小泡，即变大胀满不能吞咽气息不能出入急以竹针挑破，咯出紫血即吹赤麟散，或回生丹，其泡若起喉内，不能用针刀挑破，只须气针，针百会前顶后顶三穴，内泡自平。

鱼口风

鱼口生来一片浮，心家有热夜癢嗽上冲痰气医当急，莫待深碍始怨尤。

凡上唇生小疮或一二枚者，初起红肿渐至下唇，亦肿及面颊俱浮，若初起红赤发热作痒，痒后起小黄泡切勿用破皮针，如生在上唇中间者难治，若上唇赤肿直长出者，名龙唇发可针紫鼻角，又一症上唇生小白红疮干燥，常欲以舌舐唇上，亦不可针，又一症唇上直痛入骨连颊俱痛不可忍可针鼻角，又一症不浮肿只口眼 斜转过一边，名转风此症宜针合谷颊车二穴，以上诸症，先以角药调敷，吹吕雪丹服紫地汤，加犀角，大凡唇皮生疮，初起者，不可以针妄挑破，若误针之，身必潮热，满身骨节疼痛不治，如用针刀必须根据法律，切勿妄任己意施为，至要至要。

驴嘴风

驴嘴风生在下唇，逐时肿大不堪论，更加作痛如刀刺，敷药频施效自神，初起下唇生一红疮，逐时肿大渐至下唇长出，用消芦散熏，服紫地汤，吹冰硼散，可用破皮针，针破即效，针法须认紫旁肿处针之。

鱼腮风

鱼腮疾染在腮颐，肿痛难当只自知，传诀与君根据法治，免教迟慢势难支。

是症生在酒腋边，紫腮浮赤红肿，为双鱼腮，一边红肿者，为单鱼腮，治法以角药调敷，或用消芦散熏，服紫地汤，噙冰硼散，如逐日红肿璫盛，方可用破皮针，针出血，仍以角药外敷，瑛症日久腮穿出脓者，须内服笏矾丸，外敷生肌散。

双搭颊风

风名搭颊紫边浮，赤肿难当筋似抽，若遇此风非易治，值时敷刺莫移游。

初起面颊紫边红肿发热恶寒，须看口内牙上有肿无肿，如牙匡肿者，不是搭颊，乃是牙风，即以牙风法治之，若属搭颊先用角药外敷，服紫地汤重加[连翘桔梗牛蒡子](#)，如肿仍不消，宜用破皮针出血，不可针挑深，外仍不离敷药，加摩风膏少许。

单搭颊风

一边红赤颊名单证治如双毋用参，日久肿浮牙赤肿，外敷角药内噙丹。

面颊一边浮赤肿痛，或日久致牙匡亦肿痛，须以角药外敷内噙，吹回生丹，服紫地汤。

落架风

落架风兮信不良，总因血气暗中伤，搭勾合上方无事，不合匡时费酌量。

此症或因酒后，或偶大笑或大呵欠致脱落下，不得合架，口大开而不能咀嚼，虽属上热下虚，实由气血有亏，以致筋弛而不收，若起于一二日者可治，日久则其筋已纵，恐难安合矣，治用上兜之法先将下轻轻托上，用绸手巾兜住，然后以手揣其搭勾之处，令其勾合，再用老姜一片，置颊车左右穴上，以艾丸置姜上用香点灸一再，即可断根。

枢扶氏曰，此症由内伤所致，宜灸不宜针，当服归脾汤，加熟地，气血虚者，或[当归](#)补血汤主之，切勿以喉风诸药妄投，致误人匪浅也。

粟房风

粟米疮形满面淫，或成大泡痛难禁，施针用药根据真法，病者舒眉患不侵。

初起发热满面红肿，先如粟米黄疮，日久合成大泡，先用[荆芥](#)葱白煎角药频洗，再以角药用[荆芥](#)煎水调敷泡上，服紫地汤，凡初起不可针破，俟合成大泡以针口向下挑出脓血，自效。

瘰风

瘰风生似核形，又如疔毒一般称，莫疑此症由冤债，妙药能除夙琪平。

是症自面生起红肿如小疔毒，渐至满头俱浮肿生核可用破皮针逐个针出微血敷以角药服紫地汤效。

穿颌风

病生穿颌不为祥，幸赖仙传有秘方角药频敷汤紫地，徐徐图治莫蚤惶。

紫腮下红肿生核，或在一边初生一二枚者易治日久生多透入口内而自穿者，多至不治以角药敷，服紫地汤，可针。（俟肿甚用铍针刺肿头出血仍敷前药）

肥珠子风

肥株斯疾耳弦生，肿痛方知病不情紫正开关兼急进，频加敷药立时轻。

紫耳坠上浮肿如核或一边生者外敷角药服紫地汤，加开关散可用针，针核上即效。

掩颈风

左右俄生掩颈风，分明赤肿似成痈，时人莫作寻常看，紫地辛乌有化工。

颈项上浮肿生痛，或左右，或一边，或浮肿，上头敷角药，服紫地汤，若浮大赤肿甚者，可以针肿处。

双缠风

缠喉之症本非奇日久无声气道危若见此形宜速退仓公遇了亦愁眉。

初起外颈红肿至咽喉，亦皆满塞不分红白渐四围俱肿，先以辛乌散，加摩风膏内噙外敷，吹赤麟散，回生丹，服紫地汤加开关散，若颈项遍肿及头亦肿者属璫重症却可治须开风路针，如症日久难治，切勿用破皮针刀。

枢扶氏曰，此症由膏粱浓味太过，致肺胃积热，复受风邪上壅咽喉，红肿紧痛声音难出，汤水不下，而痰涎壅塞之声，颇以睬锯初发暴速，宜急针少商穴，以泻其热痰盛者，角药调噙，症重者，宜服雄黄解毒丸，若面青唇黑鼻流冷涕者，皆属逆症，又有因肾经有热内枯不能上润，致令心火盛而发是症者，内紧外肿，潮热恶寒，乃属实症法宜前治若体虚因思虑太过，兼过食五辛而生似此症者，其发缓，其色淡，其肿微，咽喉干燥，舌见白胎，大便自利，六脉微浮，重按无力，吞咽疼痛，名曰慢喉风，乃属虚症，法当从治，若午前痛者，宜补中益气汤加麦冬元参桔梗服之，午后痛者，或作渴身热足冷，此阴籛紫虚也，忌用苦寒宜少阴甘桔

汤。以宣誓之。若面赤咽干不渴。而微塞痛者。其脉必虚大。当以清露饮服之。兼用青雪丹吹之。自然获验。

单缠风

一边浮肿证缠单。或起头心或颈间。治法详前须识别。针开风路自绥安。
初起一边红肿作痛左属心。右属肺。或肿头顶或肿颈上治同双缠风。

边头风

半边头痛苦无休病者何须紫泪流风药不璣宜补剂管教肿痛去靡忧。
此症一边头痛如破。或左右红肿如核。须针风池二穴。服紫地散。加开关散。惟下元虚者。多致此疾。宜投补剂。以四物汤。加**白芷**服之。(虚症不可刺)
枢扶氏曰。儿头痛如破。前药罔效者。以**当归**五钱木通二钱。酒煎服下。即愈。

乘枕风

乘枕风兮本不奇。若成枕发却难医。只须急急调敷药。紫地开关服勿离。
是症脑后生疔毒红浮肿痛。可用破皮针。服紫地汤。合开关散。取效如神。

耳防风(附)

耳内红浮痛倍常。或脓或血不安康。少年若是沾斯疾。定主他年重患殃。
此症耳内肿痛。或耳外亦红肿及头亦痛。或耳内出脓血。若肿痛甚者。至口齿紧闭不能开小便赤短。宜用紫地汤。加龙胆草木通。外敷角药。吹入五行丹。即效。
枢扶氏曰。以上三十六症妙以一方统治之。无不神验。故宜其秘也后之学人务须辨症详审毋致虚实有差。庶不稍误于万一耳。

秘诀

喉风诸症初起。必作寒发热头痛。大便秘结小便赤涩。以紫正散**地黄**散合服。勿离其药。乃气血并治能理气散血。逐风痰。不使邪热壅塞。痰涎甚者。用角药调井水噙口取之。使

痰涎外涌，不停蓄于肺胃，兼吹回生丹亦拔热邪外出也。凡患喉症，而误服凉药，致胸膈如坠不安者，以井水调角药噙之，心烦即止。科内所定方药总在拦定风热在上不下，然后随症治之，自获效神速。如修合诸药勿宜见火皆生用之，吹药务研璿细，临用合愈妙。水剂宜蒸，不宜煎，以上皆口诀之秘，须究心焉。