

風癩第一

《巢氏病源》：小兒風癩者，由乳養失理，血氣不和，風邪所中。或衣濃汗出，腠理開張，（《聖惠》於此又云：當風解脫。）風因而入。如得之時，先屈指如數乃發，掣縮是也，當與豚心湯。又，病先身熱，螻，驚啼喚而後發（《聖惠》以喚字為笑字。）癩。脈浮者為陽癩，內在六腑，外在肌膚，猶得易治。病先身冷，不驚螻不啼喚，乃成病。（《聖惠》亦以喚字為笑字。）發時脈沉者為陰癩，內在五臟，外在骨髓，極者難治。病發時身軟，時醒者謂之癩；身強直，反張如尸，不時醒者謂之瘻。診其心脈滿大，癩螻筋攣。肝脈小急，亦癩螻筋攣。尺寸脈俱浮，直上直下，此為督脈，必腰背強直，不得俯仰。小兒風癩，三部脈緊急，其癩可治。小兒脈多似雀。（《聖惠》云：雀啄。）要以三部脈為主，若緊者必風癩。凡諸癩發，手足掣縮，慎勿持捉之，捉之則令曲戾不隨也。

《千金》治少小風癩，積聚，腹痛，夭矯，二十五癩。大黃湯方

大黃 人參 細辛 乾薑 當歸 甘皮（各三銖。甘皮，《嬰孺方》用甘草）
上六味 咀，以水一升，煮取四合，服如棗許，日三。

《千金》治小兒風癩，胸中有痰。白羊鮮湯

白羊鮮（三銖） 蚱蟬（二枚） 大黃（四銖） 甘草（炙） 鉤藤皮 細辛（各二銖） 牛黃（如豆大四枚，別研）
蛇蛻皮（一寸）

上八味 咀，以水二升半，煮取一升二合，分五服，日三。若服已盡，而癩不斷者，可更加大黃、鉤藤各一銖，以水漬藥半日，然後煮之。（此方與《聖惠》分兩稍異。）

《圖經》：《篋中方》治小兒風癩。

上取蠍五枚，以二大石榴割頭去子作瓮子，納蠍其中，以頭蓋之。紙筋和黃泥封裹，以微火炙乾；漸加火燒令通赤，良久去火；待冷去泥，取中焦黑者細研。乳汁調半錢匕，灌之便定。兒稍大，則以防風湯調末服之。

《外台》：《廣濟》療大人、小兒風癩，卒倒嘔沫，無省覺方。

麻黃（去節） 大黃 牡蠣（熬） 黃芩（各四兩） 寒水石 白石脂 石膏（研） 赤石脂 紫石英 滑石（研。各八兩） 人參 桂心（各二兩） 蛇蛻皮（一兩，炙） 龍齒（六兩，研） 甘草（三兩，炙）

上十五味搗為散。用藥八兩，以一薄絹袋盛散藥，用水一升五合，煮取七合，絞去滓，頓服之，日再服。

一方，水二升，煮散方寸匕，取一升，去滓服之。少小百日服一合，熱多者日二服，三五日一服亦得。本方無麻黃、龍齒、蛇蛻皮，忌海藻、菘菜、生蔥、熱面、蕎麥、豬肉、蒜、膩、粘食。

《外台》：《廣濟》又方

鉤藤皮 麻黃(去節。各二分) 龍齒(六分, 研, 綿裹) 銀(一斤) 寒水石(二十分) 梔子(擘, 二十分) 知母(二十分) 石膏(碎, 綿裹, 二十分) 升麻(十分) 杏仁(去皮尖、雙仁, 研, 二十分) 子芩(十四分) 蛇蛻皮(七寸, 炙) 蚱蟬(四枚, 去足、翅、炙) 柴胡(十分) 芍藥 沙參(各八分) 生葛汁(五分) 蜜(七合) 牡牛黃(如大豆粒十枚, 煎成, 研下之)

上十九味切, 以水六升、淡竹瀝二升合煮, 取二升四合, 絞去滓; 內杏仁脂、葛汁、蜜於微火上煎, 攪不停手; 冷, 余二升三合, 成。三、四歲一服二合, 五、六歲一服二合半, 日再服稍增。兒若大便澀者, 加大黃十分, 慎熱面、炙肉、魚、蒜、粘食、油膩、冷水。

《聖惠》治小兒風癇, 筋脈抽掣, 夜臥驚悸, 四肢煩躁, 皮膚壯熱。**天竺黃散方**

天竺黃 牛黃(各細研) 知母 赤芍藥 犀角屑 鉤藤 元參 桔梗(去蘆頭) 龍骨 川大黃(銼碎, 微炒) 白僵蠶(微炒) 茯神(以上各一分) 蜚螂(七枚, 去足, 微炒) 檳榔(一枚, 紙裹, 微煨)

上件藥搗, 細羅為散。每服以薄荷湯調下半錢, 一日五服。隨兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒心臟久積風熱, 發癇。或遍身壯熱, 多饒痰涎, 睡即驚悸, 手足抽掣。**水銀丸方**

水銀 黑鉛(各半兩, 同水銀銚子內慢火結砂子, 細研) 乾蠍(二十一枚, 頭尾全者, 微炒) 半夏(湯浸七遍, 去滑) 白附子(炮裂) 天麻 鬱金 麝香(各一分, 細研)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻, 用糯米飯和丸如麻子大。每服以薄荷湯下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風癇, 發動無時, 壯熱心煩, 筋脈拘急。**牛黃散方**

牛黃 朱砂(各細研) 木香 白僵蠶(微炒) 乳香(各一分) 乾蠍(七枚, 微炒) 羌活(半兩)

上件藥搗, 細羅為散。不計時候, 以溫竹瀝半合調下半錢。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風癇, 並心熱多驚。**七寶鎮心丸方**

虎睛(一對, 酒浸, 微炙用) 朱砂(細研, 水飛過) 雄黃 琥珀 真珠(末。各半兩) 金銀箔(各五十片) 腦麝(各一分)

上件藥都細研如面, 以棗肉和丸如綠豆大。每服以井華水下三丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風癇, 精神昏悶, 遍身壯熱, 不得睡臥。**茯神散方**

茯神 木通(銼) 人參(去蘆頭) 川升麻 子芩 犀角屑(各一分) 鐵粉 龍齒(各三分) 蜚螂(三枚, 微炒, 去翅、足)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 入竹瀝半合。不計時候, 量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒心臟壅熱, 變為風癇, 身體壯熱, 驚悸不安, 心神煩悶, 多啼少睡。**犀角散方**

犀角屑 羌活 川升麻 柴胡(去苗。各三分) 茯神 白蘚皮 葛根(各半兩, 銼) 甘草(炙微赤) 蛇蛻皮(炙。各一分) 蚱蟬(三枚, 微炒, 去翅足) 石膏(二兩, 細研) 鉤藤(半兩) 麥門冬(一兩半, 去心, 焙) 川大黃(銼碎, 微炒) 子芩(各一兩)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓。量兒大小以意加減服之。

《聖惠》治小兒風癇，自三歲以來至十歲不瘥，發時口中吐白沫，大小便不覺。**虎睛丸方**

虎睛(一對，酒浸，炙令黃) 朱砂(細研，水飛過) 麻黃(去根節) 鉤藤 柴胡(去苗) 白蘚皮 川升麻 雷丸 沙參(去蘆頭) 牛黃(細研。各半兩) 防風(去蘆頭) 子芩 川大黃(銼、研，微炒) 鐵粉 銀屑(細研) 梔子仁 羌活(各三分) 龍齒(細研) 石膏(細研，水飛過。各一兩) 蚱蟬(四枚，微炒炙，去翅足) 細辛(一分)

上件藥搗為末，煉蜜和，搗三、二百杵，丸如綠豆大。三歲以下以薄荷湯下三丸，日三服；三歲以上以意加丸服之。

《聖惠》治小兒風癇及一切驚熱。**蛇蛻皮散方**

蛇蛻皮(五寸，燒灰) 細辛 鉤藤 黃(銼) 甘草(炙微赤) 鉛霜(各半兩研) 川大黃(一兩，銼碎，微炒) 蚱蟬(四枚，微炙，去翅足)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓。入牛黃末一字，放溫。量兒大小臨時加減服之。

《聖惠》治小兒風癇及天。宜服**雄黃散方**

雄黃 熊膽(各半錢) 朱砂 天麻(末) 鉛霜(各一分) 牛黃 晚蠶蛾 天竺黃(各半分) 馬牙硝(半兩) 麝香(一錢)

上件藥同研如粉，常以不津器貯之。每服用溫水調下半錢。量兒大小，以意加減服之。

《聖惠》治小兒風癇，發即迷悶，手足抽掣，口內多涎，良久不醒。**牛黃丸方**

牛黃 麝香(各細研) 乾蠍 半夏(湯洗七遍，去滑) 蟬殼(各一分) 天南星 白附子 白僵蠶 天麻(各半兩)

上件藥並生用。搗、羅為末，又以水銀一兩，煮棗三七枚，去皮核，與水銀同研令星盡，入煎，藥末和丸如綠豆大。如隔日發者，每服煎黃牛乳汁下三丸，日三服。如驚風即煎荊芥湯下兩丸。

《聖惠》治小兒風癇，手腳抽掣，翻眼吐沫，久患不可者。宜服**黑金丹方**。

黑鉛 水銀 天南星(炮裂，搗，羅為末。各半兩)

上件藥先熔鉛為汁，次下水銀結為砂子，細研。與天南星末和勻，以糯米飯和丸如綠豆大。每一歲兒，以乳汁研一丸服之。兒稍大以意加之。

《聖惠》治小兒風癇，睡中驚叫，兩眼翻露；及臍風，撮口，天，驚風，並服此牛黃散方

牛黃 鉛霜(各一分) 天竺黃(半兩) 馬牙硝(一兩)

上件藥細研為散。不計時候，以熱水調下半錢。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒心熱風癇，發歇不定方。

天靈蓋(塗酥，炙微黃) 黃連(去鬚，一分)

上件藥搗，粗末為散。每服一錢，水一盞，煎取五分，去滓，溫服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒風癘，化涎。**水銀丸方**

水銀(一兩) 生黑豆(末，二錢)

上以棗瓢同研，令星盡，丸如綠豆大。一歲兒，每服以乳汁下一丸，良久吐出粘涎，神效。兒稍大，加丸服之。

《聖惠》治小兒二十五種風癘，無時發動。宜服**天麻散方**

天麻 防葵 真珠(末) 天竺黃(細研) 威靈仙 蜚螻(微炒) 川芒硝(各三分) 牛黃(一分，細研)

上件藥搗，細羅為散，更研，乳入。每有疾之時，取雞冠血三兩滴子，與新汲水一合，打散令勻，調下半錢。更隨兒大小以意加減。

《嬰孺》**救賜神驗方** 治少小熱風癘兼失心者。

菖蒲(石上一寸九節者) 宣連 白朮 車前子 生地黃 苦參 地骨皮(各一大兩)

上為末，蜜丸大如黍米。每食了，服十五丸，不拘早晚以飲下。不論治疾，兼令人長壽。忌豬羊肉、血、飴糖，桃、梅果物。藥宜常服之。

《嬰孺》治少小兒風癘，發無時數已，下虛不足，後治風虛。**黃湯方**

黃 麻黃(去節) 蚱蟬(炙) 甘草(炙) 當歸 細辛 桂心 芍藥 人參(各二分) 蜚螻(四個，炙) 牛黃(半分) 蛇蛻皮(一寸，炙)

上件十二物，水五升，煮取一升半，一服二合。常用神效，良。

《嬰孺》治少小風癘，晝夜數十發。**麻黃湯方**

麻黃(去節) 黃芩 黃連 大黃(各一分) 甘草(二分，炙)

上五物，水一升，先煮麻黃五沸，去沫；納諸藥，煮五合，為五服，日夜再服。

《嬰孺》治少小風癘，屢經發動。**獨活酒方**

獨活 甘草 木防己(各四分) 乾薑 細辛(各五分) 鴟頭(二個) 桂心(二兩) 鐵粉(一兩) 人參(七分)

上九物入絹袋中，酒四升浸五夜。初服半合，日二。

《嬰孺》治少小風癘發動，手足不仁。**木防己酒方**

木防己(十四分) 鉛丹 防風 桂心 龍齒(各八分) 丹砂 甘草(炙，各六分) 獨活(二十分) 細辛 當歸 乾薑(各五分) 莽草(一分)

上切入絹袋中，酒五升浸五日，熟取。初服半合，日三。

《嬰孺》治小兒風癘掣，戴眼，極者日數十發。**雷丸膏方**

雷丸 莽草(各如雞子黃大) 豬脂(一斤)

上先煎豬脂，去滓下藥，微火上煎七沸，去滓。逐痛處摩之。小兒不知痛處，先摩腹背，乃摩余處五十遍，勿近陰及目。一歲兒以帛包膏摩，微灸身。及治大人賊風。

《嬰孺》治風癩掣，身體汗出而頭獨不出。灸頂上旋毛中，以小炷勿令大，三炷訖，以白朮湯浴之方

白朮(五兩，碎)

上取白米泔二升，同煮三沸。適寒溫，洗頭及身，立瘥。

《嬰孺》又方

菖蒲

上煮為湯，浴兒大良。

《嬰孺》治少小風癩，發作言語謬錯。紫石酒方

紫石英(八分) 附子(炮，三分) 鐵精 茯神 獨活(各五分) 遠志(去心) 桂心(各六分) 牛黃 蜂房(炙，各二分) 乾薑 甘草(炙) 人參(各四分)

上以絹袋盛，清酒五升浸五宿。初服一合，日二服。

張渙 烏蛇散方 專治一切風癩，角弓反張，潮搐甚者及心肺中風，並宜服之。

烏蛇梢(一兩，生用) 白附子 半夏(各一分) 天麻 白僵蠶 人參(去蘆頭) 全蠍 羌活 石菖蒲(一寸九節者，各半兩) 川附子(一枚，重半兩，微炮，去皮臍)

上件搗，羅為粗末。每服二錢，水兩盞，入生薑十片薄荷五葉，同煎至一盞，濾去滓。放溫，時時滴口中。

張渙 蜚螂方 治諸種風癩。

乾蜚螂(三分，微炒) 威靈仙(洗，焙乾) 天麻 防葵(各半兩) 蠍梢(一分)

以上搗，羅為末。次用：川芒硝 天竺黃(各一分，同細研)

上件與諸藥一處拌勻。每服一字至半錢，乳香湯調下。

張渙 蚱蟬湯方 治諸風癩，胸中痰盛。

乾蚱蟬(七枚，微炙) 白蘚皮(一兩) 鉤藤 細辛(去土) 川大黃(銼，微炒) 天麻 牛黃(別研，各一分) 蛇蛻皮(五寸許，炙令黃)

上搗、羅為末，同牛黃拌勻。每服一錢，水八分，入人參、薄荷各少許，同煎五分，去滓。稍熱服。

張渙 茯神湯方 治風癩，身體壯熱不除，精神恍惚。

茯神 綿黃 獨活 防風 羚羊角(屑，各一兩) 肉桂 桔梗 甘草(微炒) 麻黃(去根節，各半兩)

上件搗，羅為細末，每服一錢。水一小盞，入荊芥、乳香各少許，煎五分，去滓。放溫服。

張渙 芎犀散方 治風癩，多因不省。

川芎 犀角屑 獨活(各一兩) 蠍梢 人參 天麻(各半兩)

上件搗，羅為細末。每服一錢，水八分一盞，入生薑兩片，薄荷兩葉，煎至五分，去滓，溫服。

《劉氏家傳》治風癩及小兒驚風。

上以芭蕉自然汁，時時呷一兩口。甚者服及五升必愈。亦治小兒驚風。邵孚仲通直云：加麝香更佳。予見蔣元明秘校云：風牙，頤頰腫痛。以自然汁一碗煎及八分，乘熱嗽牙腫處，嗽盡即止。凡是風牙用之必愈。頤頰腫而牙齦痛者，風牙也；頤頰不腫只牙齦腫痛者，牙也。

《吉氏家傳》治一切風癩。

木賊(半兩，為末) 臘茶(一錢半)

上件為末，拌勻。每服一錢，以磨刀清水調下，不計時候。服罷，吃少人參。

《吉氏家傳》治熱風癩。茯神丸

茯神 鐵粉 參(各八分) 龍齒 梔子仁 子芩 升麻(各六分) 門冬子(三分)

上末，煉蜜為丸如麻子大。食前，漿水下二、三十丸。

《吉氏家傳》治風癩。水銀丸

水銀 雄黃 蛇黃(各一分) 輕粉 生犀(末。各二錢)

上細研水銀，入肉棗，丸如○此大。蜜水化二丸。

驚癩第二

《巢氏病源》小兒驚癩候：驚癩者，起於驚怖大啼，精神傷動，氣脈不定，因驚而發作成癩也。初覺兒欲驚，急持抱之，驚自止。故養小兒常慎驚，勿聞大聲。每持抱之間常當安徐，勿令驚怖。又，雷鳴時常塞兒耳，並作余細聲以亂之。驚癩當按圖灸之、摩膏，不可大下。何者？驚癩心氣不足，下之內虛則甚難治。凡諸癩正發，手足掣縮，慎不可捉之，捉之則令曲戾不隨也。

《本草》治小兒驚癩方。

上以豬齒燒灰，飲服半錢匕，並治蛇咬。

《本草》治小兒驚癩方。

上以蛇黃，少水煮，研，服汁。

《顛凶經》治小兒、孩子二十四種驚癩，壯熱，抽掣腳手，嘔吐，夜啼，眼腫。安驚癩。虎睛丸方

虎睛(一枚。《聖惠》用一對) 梔子仁 茯苓(各二分) 牛黃(少許。《聖惠》用半兩) 人參(一分。《聖惠》用一兩) 鉤藤 大黃(各四分) 犀角(末，一分。《聖惠》用二兩) 黃芩(一分。《聖惠》用二兩) 蛇蛻(七寸。

《聖惠》用一分，燒灰)

上為末，以蜜丸黍大。空心熟水下，隨年丸。輕者一服，重者三服，奶汁下亦得。《聖惠》熟水下。奶母忌一切生冷、油膩、毒物。

《廣利方》治孩子驚癩，不知迷悶，嚼舌仰目。

上以牛黃一大豆，研，和蜜水服之。

《廣利方》治孩子驚癇，不知迷悶，嚼舌仰目者方。

上以犀角末半錢匕，水三大合，服之，立效。

《葛氏肘後》療小兒驚癇，掣方。

上以大蟲眼睛豆許，火炙，和水服，大良。

《嬰孺方》用虎睛中水治一切癇。

《葛氏肘後》又方

上取熊膽一兩，豆大，和乳汁及竹瀝汁服，並良。得去心中涎，至良。高家用效驗。

《金匱要略》：風引除熱，主癲癇湯。深師云：治大人風引，少小驚癇，日數十發，醫所不療，除熱方。

大黃 乾薑 龍骨(各四兩) 桂枝(三兩，去皮。《千金方》用五兩) 甘草(炙) 牡蠣(各二兩，熬。《千金》各用五兩。《外台》各三兩) 凝水石 滑石 赤石脂 白石脂 石膏 紫石英(各六兩。《外台》此六味各八兩)

上十二味杵，粗篩，以韋囊盛之，取三指撮，并華水三升煮三沸，去滓，溫服一升。《巢源》：腳氣宜風引湯

《千金》紫石煮散與此方治瘡藥味皆同。《外台》崔氏紫石湯治療藥味亦同，有分兩不同者各注於下。注云：永嘉二年，大小兒頻行風癇之病，得發，倒不能言；或發熱，半身掣縮；或五六日、或七八日死。張思維合此散，所療皆愈。

此方本仲景《傷寒論》方。

《千金》鎮心丸 治小兒驚癇百病，鎮心氣方。

銀屑(十一銖) 水銀(二十銖) 牛黃(六銖) 大黃(六分) 茯苓(三分) 茯神 遠志(去心) 防己 白朮 雄黃(別研) 人參 芍藥(各二分) 防葵 鐵精 紫石英 真珠(各四分)

上十六味，先以水銀和銀屑如泥，別治諸藥和丸。三歲兒，如麻子大二丸。隨兒大小增減。一方，無牛黃一味。

《食醫心鑒》治小兒驚癇方。

上以青羊肝一具，細起薄切，以水洗，漉出瀝乾。以五味醬醋食之。

《食醫心鑒》治小兒驚癇，發動無時方。

上以豬乳汁三合，以綿纏浸，令兒吮之，惟多尤佳。

《食醫心鑒》治小兒壯熱，嘔吐不住，驚癇方。

上以葛粉二大錢，水二合，調令勻，瀉向 鐸中，傾側令遍，重湯中煮，令熟。以糜飲相和食之。

《仙人水鑒》天南星丸 治男子、女人上膈痰壅，頭目昏眩，喉嚨腫痛；小兒驚癇，朝熱，一切涎積等患方。

天南星(四兩, 湯洗, 去皮臍) 齊州半夏(二兩, 同上)

上兩味焙乾, 以生薄荷葉五斤已來, 搗取自然汁一大碗, 入藥浸、焙, 直候藥汁盡。搗、羅為末, 煉蜜為丸如梧子大。每服十丸、十五丸, 生薑薄荷湯吞下。小兒丸如黍米大, 每服七丸至十丸。驚風, 金銀薄荷湯吞下; 心臟壅熱, 荊芥薄荷湯吞下。食後臨臥服。

《仙人水鑒》孩子百日內驚癇神驗方。

黃梨汁和黃梨花, 偏治驚癇力更加, 牙硝入之一大分, 亦須更著少鉛華。(鉛華, 黃丹也。)

《外台》: 深師療大人風引, 少小驚癇掣, 日數十發, 醫所不能療, 除熱方。

龍骨 大黃 乾薑(各四兩) 牡蠣(熬) 滑石 赤石脂 白石脂 桂心 甘草(炙。各三兩)

上九味搗, 下篩, 韋囊盛。大人三指撮, 以井華水二升煮三沸, 藥成。適寒溫, 大人服一升, 未滿百日兒服一合。未能飲者, 綿裹箸頭納湯中, 著小兒口中, 以當乳汁。熱多者, 日四服。無毒, 以意消息之。忌海藻、菘菜、生蔥。一方無大黃、赤石脂、桂心、甘草。

《外台》: 崔氏療暴得驚癇立驗方。

鉤藤皮 茯神 黃芩 升麻 白蘚皮 沙參(各二兩) 龍齒(三兩) 蚱蟬(七枚, 去翅, 炙, 研, 湯成內之)

石膏(八兩) 寒水石(六兩, 碎研, 裹) 甘竹瀝(二升, 湯熟內之)

上十一味切, 以水九升, 煮取三升。溫, 分三服, 相去六、七裡久。若小兒孩子患, 藥各減量, 取多少細細飲之, 立瘥。忌醋物。

《外台》: 《廣濟》療小兒驚癇, 體羸不堪, 療子母五癇煎方。

鉤藤(二分) 知母 子芩(各四分) 甘草(炙) 升麻 沙參(各三分) 寒水石(六分) 蚱蟬(一枚, 去翅, 炙) 蜩螂(三枚, 炙)

上九味搗、篩。以好蜜和薄泔, 著銅鉢於沸湯調之, 攪不停手, 如飴糖。煎成, 稍稍別出少許。一日兒, 啖之一枚, 棗核大, 日夜五、六過服不妨; 五六十日兒, 啖之三枚; 一百日兒, 啖四枚; 二百日兒至三百日兒, 啖五枚; 三歲兒, 啖七枚。以意量之。

《藥性論》治小兒驚癇、客忤。鎮心安神方

麝香當門子(一粒) 丹砂(一塊, 大小相似)

上以細研, 熟水灌之下。

《藥性論》治小兒驚癇方。

上以 羊角燒灰, 酒服之少許。

《聖惠》治小兒忽得驚癇, 壯熱口燥。鉤藤散方

鉤藤 白茯苓 黃芩 川升麻 白蘚皮(各三分) 龍齒 元參 石膏 寒水石(各一兩)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓; 入竹瀝半合, 攪令勻, 重煎一、兩沸, 分溫二服。更量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇，發作不定。蛇蛻皮散方

蛇蛻皮(五寸，炙黃) 蚱蟬(十枚) 蜚螂(三枚，各去翅，足，微炙) 麻黃(去根節) 甘草(炙微赤，銼) 當歸(銼，微炒) 細辛 黃 (銼碎。各半兩) 人參(三分，去蘆頭) 川大黃(一兩，銼碎，微炒) 上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓；入牛黃二豆許，攪令勻，溫服。更量兒大小以意加減(《嬰孺方》云：兒體氣羸者，以桂心二分代大黃，治百病驚癇。初瘥後，變成諸疾、風癇悉治之。)

《聖惠》治小兒驚癇，仰目嚼舌，精神昏悶。宜服鉤藤散方

鉤藤 川大黃(銼碎，微炒) 子芩(各半兩) 龍齒 麥門冬(去心，焙) 石膏(各三分) 梔子仁(一分) 上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，水一小盞，煎至五分，去滓。量兒大小分減，不計時候，溫服。

《聖惠》治小兒驚癇，邪氣發即吐涎，迷悶難醒。白蘚皮散方

白蘚皮 鉤藤 龍齒(各一兩) 犀角屑(三分) 子芩(三分) 蚱蟬(半兩，去翅、足，微炒) 上件藥搗，羅為散。每服一錢，以水一小盞，入淡竹葉七片，煎至五分，去滓。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒驚癇，壯熱心躁，發歇不定。宜服牛黃散子方

牛黃(一分) 馬牙硝 鐵粉 龍齒(各三分) 上件藥都細研為散。每於乳食後，以熱水調下半錢。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒心肺積熱，發驚癇，煩悶吐逆，心神昏迷，痰涎壅滯。朱砂丸方

朱砂 牛黃 鉛霜(各細研) 乾蠍 蠶蛾(並微炒。各一分) 膩粉(一錢) 腦麝(各細研，半分) 天漿子(二七枚，內有物者，微炒) 上件藥搗，羅為末，都研令勻，煉蜜和丸如黍米大。每服以薄荷湯化五丸服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇，多涎體熱。犀角丸方

犀角屑 天麻 白附子(炮裂) 天竺黃 鉛霜(並細研。各半兩) 朱砂(一兩，細研，水飛過) 上件藥搗，羅為末，入研了藥，更研令勻，以軟飯和丸如綠豆大。每服煎竹葉湯下五丸。看兒大小加減丸數服之。

《聖惠》治小兒驚癇。鎮心丸方

金銀箔(各細研，五十片) 防葵 水銀(以少棗瓢研，令星盡) 鐵粉 紫石英(細研，水飛過) 真珠(末) 雄黃(細研) 人參(去蘆頭) 白芍藥(各半兩) 牛黃(細研) 遠志(去心) 漢防己 白藪(各一分) 川大黃(銼碎，微炒) 茯神(各三分) 上件藥搗，羅為末，入研了藥，都研令勻，煉蜜和丸如綠豆大。每服以薄荷湯下三丸，日三服。看兒大小以意加減服之。

《聖惠》治小兒驚癇壯熱，心神不定。犀角丸方

犀角屑 麝香(各半兩) 朱砂 天竺黃 牛黃(並細研) 乾蠍(微炒。各一分) 天南星(半分, 炮裂)
上件藥搗, 羅為末, 水浸, 蒸餅, 和丸如綠豆大。每服以薄荷湯下三丸, 日三、四服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇邪氣, 皮肉壯熱, 嘔吐心煩, 不得安睡。**虎睛丸方**

虎睛(一對, 細研) 牛黃 天竺黃 麝香(各細研, 一分) 川升麻 鉤藤 甘草(炙微赤, 銼) 犀角屑 梔子仁(各半兩) 川大黃(一兩, 銼碎, 微炒) 蚱蟬 蜚螂(各去翅足, 微炒, 三枚) 蛇蛻皮(五寸, 燒灰)
上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和丸如綠豆大。三歲兒, 以粥飲, 研三丸服之。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇, 頻發不定。**至寶丸方**

金銀箔(各五十片, 細研) 川升麻 子芩 犀角屑 梔子仁 川大黃(銼碎, 微炒) 朱砂(細研, 水飛過。各一兩) 鐵粉 龍齒(並細研。各二兩) 麥門冬(一兩半, 去心, 焙) 蜚螂(三枚, 去翅足, 微炒)
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 同研令勻, 煉蜜和丸如麻子大。每服煎竹葉湯研下五丸。更量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒驚癇煩熱, 眠臥不安。**龍腦丸方**

龍腦(半分, 細研) 朱砂(一兩, 細研, 水飛過) 粉霜(半兩, 細研) 鐵粉 龍齒(各細研, 二兩) 人參(三分, 去蘆頭)
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 同研令勻, 煉蜜和丸如麻子大。不計時候, 以粥飲下五丸。更看兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇發熱, 搖擗不定。**鉛霜丸方**

鉛霜(細研) 馬牙硝(各半兩) 朱砂(細研, 水飛過) 鐵粉(細研。各一兩) 麝香(半分, 細研) 川大黃(銼碎, 微炒) 人參(去蘆頭。各三分) 羌活 芎 白茯苓 牛黃 乾蠍(微炒) 龍膽(去蘆頭。各一分)
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 同研令勻, 煉蜜和丸如綠豆大。每服不計時候, 以荊芥薄荷湯下五丸。量兒大小以意加減服之。

《聖惠》治小兒驚癇。**蛇黃丸方**

蛇黃(三枚大者, 細研) 麝香(半分) 鬱金(三分, 為末) 金銀箔(各細研, 五十片)
上件藥同研令勻, 以粳米飯和丸如綠豆大。每服用磨刀水煎一、兩沸, 如人體, 下三丸。更量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇, 體熱羸瘦。**鉤藤煎方**

鉤藤 沙參(去蘆頭。各一分) 子芩 甘草(炙微赤, 銼) 川升麻 知母(各半兩) 寒水石(三分) 蚱蟬(二枚, 去翅、足, 微炙) 蜚螂(二枚, 去翅、足, 微炙)
上件藥搗, 羅為末, 入蜜五兩, 以慢火煎, 煉為膏。每以熟水調一杏仁大服, 日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇，頻頻發動，經久不瘥，肌體瘦弱。**蚱蟬煎方**

蚱蟬(三枚，去翅足，微炙) 麻黃(去根節) 鉤藤(各一分) 柴胡(去苗) 白芍藥 犀角屑 知母 沙參(去蘆頭) 甘草(炙微赤，銼) 杏仁(湯浸，去皮尖、雙仁，研作膏。各半兩) 蛇蛻皮(五寸，燒灰) 生薑汁(一合) 牛黃(一分，細研) 生地黄汁(一兩) 石膏 子芩 蜜龍齒(各一兩)

上件藥除薑汁、地黄汁、蜜、杏仁、牛黃外，並細銼。先以水二大盞，煎至一盞，去滓；入竹瀝一小盞，又煎五七沸，納杏仁、蜜、薑汁、地黄汁；以慢火煎，攪不停手，約十餘沸，放冷，於瓷合中盛；入牛黃，攪令勻。每一合，分為三服。更量兒大小加減。

《聖惠》治小兒發驚癇，體瘦煩熱。**犀角煎方**

犀角屑 知母 川升麻(各一兩) 子芩 人參(去蘆頭) 鉤藤(各三分) 蚱蟬(二枚，去翅足，微炒) 蛇蛻皮(三寸，微炙) 甘草(炙微赤，銼) 柴胡(去苗。各半兩)

上件藥搗，羅為末，用水二盞入銀鍋中，以文火煎取六分，去滓；入蜜二合，竹瀝一小盞，再煎如錫。每服抄半錢，以溫水調化服之。更量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒驚癇，四肢抽掣及身體反張，目睛上視，色青，大叫聲不轉者。宜服**寒水石散方**

寒水石 紫石英 石膏 貝齒(各半兩) 龍齒(一兩)

上件藥搗碎，以水二大盞煎至一盞，去滓。量兒大小分減服之。

《聖惠》治小兒驚癇極妙方。

鐵粉 石膏 牡蠣粉(各一分) 黃丹(半兩)

上件藥細研為散，以井華水調下半錢。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒驚癇，連發不醒，體羸反張，不堪服藥。**麻黃拭體方**

麻黃(去根節) 葛根 雷丸(各三兩) 金(一兩) 石膏(五兩，末) 蛇蛻皮(一條)

上件藥細銼，用水七升，煎取一升，去滓。以軟帛浸，拭兒身上，即效。

《聖惠》治小兒二十四種驚癇，壯熱，抽掣手足，嘔吐，夜啼，睡臥不安。**虎睛丸方**

虎睛(一對，微炙，細研) 牛黃(細研) 川大黃(銼碎，微炒) 白茯苓(各一分) 人參(半兩，去蘆頭) 蛇蛻皮(五寸，微炙)

上件藥搗，羅為末，煉蜜和丸如綠豆大。一、二歲兒每服以乳汁化破二丸服，三、四歲兒薄荷湯化破五丸服。更看兒大小以意加減服。

《聖惠》治小兒二十四種諸驚癇，眼口牽掣，嚼舌反拗。**牛黃散方**

牛黃(一分，細研) 石膏(細研) 鉤藤(各一兩半) 甘草(炙微赤，銼) 白藪(各一兩) 蛇蛻皮(半分，炙令黃色)

上件藥搗，羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓，入牛黃一字。不計時候，量兒大小分減溫服。

《聖惠》碧雪 治大人、小兒心熱驚狂，諸癩熱病皆主之方。

川升麻(二兩) 黃芩 鉤藤 犀角屑 青黛(各一兩) 虎睛(一對，取) 天竺黃(半兩) 腦麩(各一分) 川朴硝(一斤) 竹瀝(三合)

上件藥虎睛、天竺黃、腦麩、青黛等別細研，入餘藥並細銼。用水一斗，煎至三升，濾去滓；澄清，下朴硝，微火更煎，以柳木篋攪令勻，勿住手，候消散，下竹瀝並研了藥，更攪令勻。候稍凝，即於新瓦盆中盛，經宿即凝，搗、羅為散。每服以金銀湯調下二錢，食後並夜臨臥時服。老少以意服之。

《聖惠》治小兒百日以來至三、四歲肝心風熱，發驚癩掣，身體如火。犀角散方

犀角屑 鉤藤 黃芩 川升麻(各一兩) 龍齒(二兩) 麥門冬(一兩半，去心，焙)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，用水一小盞，入竹葉七片，煎至五分，去滓。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒一歲至四歲壯熱，大驚發癩。石膏散方

石膏(細研) 子芩 知母 川大黃(銼碎，微炒) 葛根(銼) 龍齒(各一兩) 蚱蟬(二枚，微炙) 柴胡(一兩半，去苗) 川升麻 麻黃(去根節) 鉤藤(各三分) 梔子仁 赤芍藥(各半兩) 甘草(一分，炙微赤，銼)

上件藥搗，粗羅為散。每服一錢，以水一小盞，煎至五分，去滓；入竹瀝一合，更煎一、兩沸。量兒大小加減溫服。

《聖惠》治小兒四、五歲忽患驚癩。鉤藤散方

鉤藤 石膏(細研，水飛過) 梔子仁(各半兩) 犀角屑 牛黃(細研) 防風 人參(各去蘆頭) 獨活(各一分) 虎睛(一對) 蚱蟬(一枚。各微)

上件藥搗，細羅為散。每服一錢，水一中盞，煎至五分，和滓。分為二服，如人行二、三裡進一服。更量兒大小以意加減。

《聖惠》治中風目眩，羸瘦，小兒驚癩及五勞，手足無力。宜吃蒸羊頭肉方

白羊頭(一枚，洗如法)

上蒸令極熟，細切，以五味汁食之；或作膾，入五辛醬醋食之，亦得。

《博濟方》治小兒驚癩及大人卒中惡風，涎潮昏重，口眼斜，四肢拽，口噤不省。大效延壽丹

辰錦砂 膩粉 鐵焰粉 白附子(各二兩) 蛇黃(用醋浸少時，以大火過) 大附子(炮。各九兩) 天南星(生，淨洗) 羌活 巴豆(槌碎，用新水浸，逐日換水，七日後，以紙裹，壓出油用) 牛膝(去苗，酒浸，焙) 蠟梢(各三兩) 生金 生銀(各別研，一分) 麝香 真牛黃(各別研，一兩一分)

上件十五味同研，和為細末，以蜜和粟米飲搜和為丸，如雞頭大。每中惡風、緩及五般癩疾，薄荷酒磨下一丸，老人半丸。小兒驚癩，十歲以上，一丸分四服；四歲以下，一丸分五服；新生孩兒，一丸分七服，並用蜜水磨下。如中風者，發直，面如桃花色，口眼俱閉，喉中作聲，汗出如油及汗出不流，多要下泄；或瀉血者並是惡候，更不用服。唯口噤眼開者，藥下立瘥。如纏喉風壅塞，氣息不通將絕者，急化一丸，生薑薄荷酒下，必效。

太醫局 紫雪 療腳氣毒遍內外，煩熱不解，口中生瘡，狂易叫走；瘡疫，毒癘，卒死，溫瘧，五尸，五疰，心腹諸疾，刺切痛及解諸熱藥毒發，邪熱卒黃等，並解蠱毒魅，野道熱毒。又治小兒驚癇百病。

黃金(一百兩。《千金翼》用十六兩) 石膏 寒水石 磁石 滑石(各三斤，搗碎。《千金翼》無滑石)
以上用水一斛煮至四斗，去滓。入下項：

元參(洗，焙，搗碎) 升麻(各一斤) 羚羊角(屑) 犀角屑 青木香 沉香(並搗碎。各五兩) 丁香(一兩，搗碎。《千金翼》用四兩) 甘草(炙，銼，八兩)

以上八味入前藥汁，再煮取一斗五升，去滓。入下項：

硝石(四升，芒硝亦得，每升重七兩七錢半) 朴硝(精者十斤。《千金翼》用四升)

以上二味入前藥汁中，微火煎，柳木篋攪不住手，候有七升，投在木盆中，半日欲凝。入下項：

朱砂(飛研，三兩) 麝香當門子(一兩二錢半。《千金翼》用麝粉半兩余，斤兩不注者皆同)

以上二味入前藥汁中，攪調令勻。寒之二日，上件藥成霜雪，紫色。每服一錢或二錢，用冷水調下。大人、小兒臨時以意加減，食後服。

《養生必用》桃奴丸 治心氣虛，有熱，恍惚不常，言語錯亂，尸疰客忤，魘夢不祥，小兒驚癇並宜服方。

桃梟(七枚，別為末，桃不成實，經冬在枝上不落者是也) 桃仁(十四枚，去皮尖，炒，別研) 安息香(一兩，以無灰酒斟酌多少，研，飛去砂石，銀器中入上二味，慢火熬成膏) 生玳瑁(鎊過，杵為末、要細，一兩) 琥珀(三分，別研) 雄黃(用桃葉煮，水研飛，取三分) 辰砂(研飛，半兩) 黑犀(石上以水磨，澄去水，取末，半兩) 牛黃腦麝(各一分，別研)

上細末，和前膏，丸如雞頭，陰乾，密器封，安靜室。人參湯研服一丸，食後臨臥。

《養生必用》雞舌香丸 治憂恙、逆沖、痞結等氣，胸管窒塞、噎悶，臟腑積聚，欲作 瘕；酒食毒，痰癖，嘔逆，有妨食飲。兼治小兒驚癇，客忤，泄利等方。

雞舌香(用母丁香) 墨(略燒) 麝香 牛黃(並別研) 犀角(末) 鐵鑊粉(各一分半) 棗(五枚，燒，存性) 荊三棱(末，一錢) 烏梅(肉，焙乾，一分) 巴豆(大者十五枚，去皮心、膜，漿水煮三五十沸，再入麩炒，令赤色，別研)

上為末，煮糊和丸如黃米大。每服三、五丸，煎人參湯下，漸漸加至七丸至十丸，食後服。

茅先生小兒鎮心驚癇雄朱散方

朱砂 雄黃 真珠(末) 礞砂 水銀 鉛(各半兩，先將鉛在銚子內煮溶，便放水銀潑轉成砂子，瀉出放冷即用之) 全蠍 白附子(各三錢) 腦麝(隨意入)

上前件藥各研，一處為末。每服一字、半錢，用荊芥、薄荷煎湯，入蜜少許，同調下。

《嬰孺》治驚癇發熱，如無癇但似熱，即與服之方。

升麻 子芩 犀角 大黃(各六分)

上，水二升半，煮一升二合，候溫，漸漸與服。微利三、兩行。切忌面、豬、魚、醋物。

《嬰孺》又方

月候血

上取和青黛，新汲水調。一服一大錢，入口即瘥。童兒增減，如神。

《嬰孺》又方

上以熊膽，水調服少許，妙。

《嬰孺》又方

上麻油少少吃之，亦妙。

《嬰孺》又方

上以鐵粉，水調，常服之。

《嬰孺》又方

乾薑 凝水石

上敷頭，大佳。醫云：此病是氣不通，常與薏苡仁、紫蘇粥食，大良。

《嬰孺》治熱風常發驚癇，每發或吐沫方。

鉤藤 防葵 羚羊角(屑) 人參 茯苓 遠志(去心) 漢防己(各八分) 麥門冬(去心) 龍齒(研。各十二分) 鐵精(六分，研) 杏仁(十分，去皮尖，炒，別研入)

上為末，蜜丸大豆大。空心飲下三十丸，漸加至五六十丸，常服大佳。忌豬、牛肉及醋。小兒量多少服。

《嬰孺》治少小驚癇，脹滿，掣縮，吐。百病湯方

黃 黃芩 鉤藤(各一分) 蚱蟬(炙，三分) 甘草(二分，炙) 蛇蛻皮(一寸，炙) 牛黃(三銖)
上，水一升半煮六合。百日兒與半合，二歲三合，取利為度。有汗則以粉粉之。

《嬰孺》治少小驚癇，掣縮不止。十二味牛黃豚血湯方

豚血(五合，炙) 牛黃 當歸 大黃 人參(各四分) 蜣螂 蚱蟬(各二十個，炙) 芎 黃芩(各八分) 葛根(十二分) 鼠屎(四兩) 蛇蛻皮(五寸) 蜂房(八分)

上十三味，入酒五升，煮取四升，去滓。服二合，日三夜二。此論一歲兒耳。三歲兒服三合，神效。

《嬰孺》治少小驚癇，壯熱中風，四肢掣，吐舌出沫。當歸湯方

當歸(二分) 豚卵(二雙，切細)

上二物以醇酒三升，煮取一升，為二服。兒小即用一卵(一大，棗二十個大者)

《嬰孺》治少小驚癇經年，小勞輒發。牛黃酒方

牛黃 鐘乳(研。各八分) 麻黃(去節) 秦艽 人參(各六分) 桂心(七分) 龍角 白朮 甘草 當歸 細辛(各五分) 杏仁(四分) 蜀椒(三分, 汗) 蜚螬(九枚, 炙)
上十四味切, 入絹袋中, 酒五升浸之。隨時月數, 服半合, 日三。

《嬰孺》治少小痰實結癖, 或腹內堅強, 驚癇百病。**牛黃丸方**

牛黃 元參 乾薑(各二分) 苦參 丹參 桔梗 甘草(炙) 人參(各四分) 甘遂(炒) 沙參(炙。各五分) 蟲(十四個) 大黃(十二分) 蜀椒(四分, 汗) 巴豆(一百粒, 去皮心, 炒, 別研入) 葶藶(一合半, 炒)
上為末, 蜜丸如小豆大。一服二丸, 飲下。

《嬰孺》治少小癖實, 驚癇百病。**牛黃丸方**

牛黃 芒硝 真珠(末) 甘遂(炒) 雄黃(各四分) 麝香(一分) 蜀椒(三銖, 炒汗) 蜈蚣(一條, 去足) 蚱蟬(十四個, 炙) 巴豆(五分, 去皮心, 炒, 別研入)
上為末, 入巴豆勻, 次下真珠末, 煎蜜三合令如飴, 白蠟一兩水煎和熟, 下諸藥, 杵和得所。有病者, 一服如麻子大二丸飲下, 日一服, 快下為度。

《嬰孺》治少小驚癇除熱, 常服**蛇蛻皮丸方**。

蛇蛻皮(炙) 細辛 黃芩 蜚螬(炙, 用自死者) 牛黃(各一分) 大黃(五分)
上以為末, 蜜丸小豆大。服三丸; 不知, 稍增之。日三。

《嬰孺》治少小傷寒, 溫病, 驚癇, 以入八味人參浴湯方

人參 牡蠣 雷丸(各半升) 沙參 苦參 元參 丹參(各一升) 大黃(三升)
上以水三斗, 作東向灶, 以葦薪煮三沸, 停後煮小沸留之, 度一斗許, 去滓。先以三指染藥汁, 注兒口二七已。大染手, 濕吻、額、腹、背以後, 如炊物溫之; 再浴, 度盡七升止。一日一浴, 甚者三浴。三日無令兒見風, 浴時避目及陰也。

《嬰孺》又方

露蜂房(一個)
上以五升水煎令濃赤。浴兒, 三、四日一遍。

《嬰孺》治少小驚癇掣, 一日一夜百餘發。**葛散子方**

葛(炒) 雄黃 甘草(炙。各六分) 當歸(三兩, 好者)
上為末, 取一小豆乳汁和, 令咽之, 日夜三、四服。若不可服, 用當歸半兩、小豚卵一具並切, 酒一升二合, 煮八合。服半合至一合。量兒大小, 日夜三、四服, 大妙。

張渙 **截驚癇安神湯方**

白茯苓(二兩) 甘草 犀角(末。各一分) 人參(去蘆頭) 遠志(去心) 菖蒲(一寸九節者) 白蘚皮(各一兩) 石膏(半兩)
上件搗, 羅為細末。每服一錢, 水一盞, 入去心麥冬少許, 煎五分, 去滓。放溫, 時時與服。

張渙 **天竺黃散方** 治驚癇啼叫。

天竺黃(一兩, 研) 牡蠣粉 白芍藥 犀角屑 白附子 天麻 乾蠍 人參(去蘆頭。各半兩)
上件搗, 羅為細末。每服一錢, 水八分, 生薑、薄荷各少許, 煎四分, 去滓。溫服。

張渙 **鎮心膏** 治驚癇及發癇挾熱者, 尤宜服之。

遠志(一兩, 去心) 漢防己 人參(去蘆頭) 川大黃(微炮) 茯神(各半兩)
以上搗, 羅為細末。次用:

好朱砂(一兩, 細研, 水飛) 龍腦(一錢, 細研) 水磨雄黃(一分, 細研, 水飛) 金箔(三十片) 銀箔
(二十片。各細研)
上件一處拌勻, 煉蜜成膏。每服一皂皂大, 煎薄荷湯化下, 乳後。

張渙 **犀角丹方** 治驚癇悶亂。

犀角屑 天南星(微炒。各一兩) 乾蠍(半兩)
以上搗, 羅為細末。次用: 朱砂(半兩, 細研, 水飛) 牛黃(一分, 研) 麝香(一錢, 研)
上件都一處拌勻, 水浸、蒸餅, 和丸如黍米大。每服十五粒, 煎人參湯下。

張渙 **蛇蛻丹方** 治驚癇涎盛。

蛇蛻皮(五寸, 燒灰) 麝香 牛黃 膩粉 天竺黃(各細研) 鉤藤(取末。各一分) 虎睛(一對, 炙, 研) 蜚
螂(三枚, 去翅、足, 微炒, 取末)
上件都拌勻, 煉蜜和丸如黍米大。每服七粒至十粒, 用麥門冬去心煎湯下。

《嬰童寶鑒》治小兒驚癇, 搐搦、眼上、身熱。 **散方**

白附子 朱砂(各一錢, 末) 巴豆(四十四粒, 研, 不去油) 膩粉(半錢) 棘岡子(三枚, 去殼) 麝香(一
字)
上件細研勻如面。每服一字, 再研薄荷湯調下。量大小用藥。

《嬰童寶鑒》治小兒驚癇, 手足顫, 身熱眼上。 **紫汞膏**

汞(一錢重, 棗肉五個, 研汞成泥, 然後入諸藥) 朱砂(末, 二錢) 蠍尾(肉七枚, 去心、膜) 黑附子
(尖, 一個) 生薑(一塊, 去皮) 生天南星(心中末, 一錢) 膩粉(五錢七)
上件都研為膏。每服雞頭大, 薄荷湯化開服。量大小用, 微取下涎, 立效。

《萬全方》治小兒諸癇驚惕, 掣 及中客忤。 **宜服牛黃丸**

牛黃(細研) 熊膽 人參 細辛 赤芍藥 當歸(微炒) 栝蔞根 防風(去苗。各半兩) 川大黃(一兩, 微
炒) 蚱蟬(七枚, 去翅足, 炒) 巴豆(三十枚, 去皮, 心, 研如泥) 蛇蛻皮(五寸, 炙黃色) 麝香(一分,
研) 甘草(三分, 炙)
上件藥搗, 羅為末, 入巴豆研勻, 煉蜜和杵, 丸如麻子大。初生一月至百日兒, 每服一丸; 一歲至三歲
服兩丸; 四歲至五歲服三丸, 並用薄荷湯下, 快利為度。

《萬全方》治小兒驚癇，壯熱，心神不定。**犀角丸方**

犀角屑(半兩) 朱砂 天竺黃 麝香 牛黃(各細研) 乾蠍(微炒) 天南星(炮) 人參(以上各一兩)
上件藥搗，羅為末，水浸、蒸餅，和丸如綠豆大。每服三丸，以薄荷湯下。量兒大小加減。

《劉氏家傳》治小兒驚癇方

青州白丸子(半兩) 陰陽硫黃(系生、熟者各用綠豆大) 蠍(兩個全者，不得用火焙，要晒乾。一法，用蠍梢)

上同為細末。每一歲至五歲半錢，六歲至十歲一平錢，用無灰好酒下。忌動風物，小兒奶母亦忌口。若驚發作，用無灰酒下一大錢，病深者不過十服。

《王氏手集》**辰砂乳香丸** 亦名鎮驚安神丸方。治驚癇，胎風壯熱，蜎，弄舌搖頭，眠睡不穩，目睛上視，口眼牽引，痰實咳嗽，咬齒譫語。

半夏(炮) 乳香 朱砂(各研)

上各等分，為細末，麵糊為丸。每服十丸，乳食後，溫薄荷湯下。量兒大小增減。

《孔氏家傳》治小兒諸風驚癇及諸痢。**青金丹方**

青黛(三分) 雄黃(研) 胡黃連(各二分) 朱砂 蘆薈(各研) 膩粉 熊膽(溫水化) 白附子(各一分) 麝香(半分) 蟾酥 水銀(各一皂子大) 鉛霜 龍腦(各一字)

上同入乳鉢，再研令勻，用 豬膽一枚，取汁熬過，浸，蒸餅少許，為丸黃米大，曝乾。一歲可服二丸，量兒大小，增減服之。諸風驚癇，先以溫水化，滴鼻中令嚏。戴目者當自下，蜎 亦定，更用薄荷湯下。諸疳，粥飲下。變蒸寒熱，薄荷湯下。諸瀉痢，粥米飲下。疳蛔咬心，苦楝子煎湯下。赤爛口齒，疳蟲口瘡等，乳汁研，塗病處。疳眼雀目，白羊子肝一枚，竹刀子批開，納藥肝中，以麻縷纏，米泔煮，令熟，空腹服。

乳母常忌毒魚、大蒜、雞、鴨、豬肉。治疳最佳。

《趙氏家傳》治小兒因吐瀉後虛風，眼澀多睡，潮搐驚癇及丈夫、婦人一切虛風，頭旋眼黑，惡心吐逆，筋脈緊緩，手足麻木，身體疼痛，精神不爽。**丸方**

全蠍(微炒) 白僵蠶 雄黃(研) 白附子(炮) 天麻(銼碎) 朱砂 麝香(各細研) 天南星(濕紙裹，炮，秤用) 半夏(湯浸五、七次，去黑臍，生薑三分，取汁煮，令盡焙乾。各一分) 烏蛇梢(尾穿一百足錢者佳，於項後粗處取七寸，酒浸七日，去皮、骨，慢火炙黃)

上十味再同研細，生薑汁煮，稀糊為丸如黍米大。每服三歲以下七丸，五歲以下十丸，五歲以上十五丸，荊芥湯下，不計時候。大人丸如綠豆大，每服二十丸，荊芥湯茶下。如急用，即以二十丸研碎，荊芥、生薑濃煎湯化下。

長沙醫者鄭愈傳治驚風癇病，眼目翻視，牙關噤急，口內無氣，唇赤，用**奪命散方**

蜈蚣(赤者一條) 輕粉 朱砂 麝香 白附子 牛黃(以上各一分) 水銀(用棗肉少許研, 不見星, 秤一錢) 蟾酥(半錢) 天南星(一個, 去心) 真珠(末, 一字) 巴豆霜(三個, 去油)

上為末, 棗肉和丸。每服三丸, 薄荷湯下。口噤不開, 研, 灌入鼻中。心煩壯熱, 荊芥湯下。加減服。

食癩第三

《巢氏病源》：食癩者，因乳哺不節所成。

《聖惠》論：夫小兒食癩者，由臟腑壅滯，內有積熱，因其哺乳過度，氣血不調之所致也。此皆乳母食飲無常，恚怒不節，煩毒之氣在於胸中，便即乳兒，致使結滯不消，邪熱蘊積，腸胃痞塞，不得宣通，則令壯熱多驚，四肢抽掣，故發癩也。

張渙云：每遇傷飽即發，乃名食癩。

《聖惠》治小兒食癩，四肢抽掣，壯熱驚悸，乳食不消，痰涎壅滯，發歇不定。宜服代赭丸方

代赭 朱砂(各細研) 馬牙硝 川大黃(銼碎, 微炒) 水銀(以少棗瓢研, 各令星盡, 各一分) 金銀箔(各二十片, 細研) 蟾酥(一錢, 研入) 巴豆(七枚, 去皮心, 研, 紙裏壓去油) 膩粉 麝香(各半分, 細研) 龍腦(細研, 半錢) 蠟梢(四十九枚, 微炒) 天漿子(二七枚內有物者, 炒)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和丸如黍粒大。每服以薄荷湯下二丸, 日三服。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食癩及驚風百病。虎睛丸方

虎睛(一對, 微炒, 取仁) 牛黃 朱砂(各細研) 真珠(末) 甘遂(煨黃) 赤芍藥 赤茯苓 甘草(炙微赤, 銼) 牡蠣(炒黃) 杏仁(湯浸, 去皮尖, 雙仁, 麩炒微黃。各一分) 麝香(半分, 細研) 犀角屑 巴豆(去皮心, 紙裏去油。各半兩)

上件藥搗, 羅為末, 用糯米飯和丸如綠豆大。每服以荊芥湯下二丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食癩。朱砂丸方

朱砂(一兩, 細研, 水飛過) 川大黃(銼碎, 微炒) 石(細研, 半兩) 牛黃 雄黃(並細研) 桂心 雲母粉 半夏(湯洗七次, 去滑) 黃連(去鬚) 雷丸 代赭 真珠(末) 乾薑(炮裂, 銼) 巴豆(去皮心、膜, 炒黃。各一分)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和丸如黍米大。百日內兒, 以乳汁下二丸; 三歲至七歲, 以粥飲下五丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒食癩, 喘息粗。真珠丸方

真珠(末) 天竺黃 雄黃 巴豆(去皮心, 壓去油) 麝香 丁頭代赭(搗、羅為末) 杏仁(湯浸, 去皮尖, 雙仁, 研如膏。各一分)

上件藥都細研令勻, 煉蜜和丸如黃米大。一歲、二歲, 每服以溫水下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食癩, 乳癖、積聚、壯熱, 心神多驚。牛黃丸方

牛黃 朱砂 鉛霜(各細研) 真珠(末) 犀角(屑) 牡蠣粉 甘草(炙微赤, 銼) 杏仁(湯浸, 去皮尖、雙仁, 研如膏。各一分) 麝香(半兩, 細研) 巴豆(十粒, 去皮心, 研, 紙裏壓去油)
上件藥搗, 羅為末, 入研了藥, 同研令勻, 煉蜜和丸如麻子大。三歲兒以金銀薄荷湯下二丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒七歲以下食癩壯熱, 無辜 癖等。**雄黃丸方**

雄黃 麝香 牛黃(各細研) 朱砂 石膏(各細研, 水飛過) 蕤仁(湯浸, 去赤皮) 牡蠣粉 巴豆(去皮心、膜, 壓出油。各半兩) 甘遂(一分, 煨微黃)
上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和丸如黍米大。每服以粥飲下三丸, 如利三、兩度勿怪。更隨兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒食癩, 化聚滯奶食, 墜涎, 利大腸。**真珠丸方**

真珠(末) 天竺黃 朱砂(並細研。各一分) 雄黃 麝香(各細研) 代赭 蜣螂(微炙) 杏仁(湯浸, 去皮尖、雙仁, 麩炒微黃。各半兩) 巴豆(十粒, 用油煎, 令褐色, 與杏仁研)
上件藥都研為末, 煉蜜和丸如綠豆大。每服以生薑湯下二丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒食癩, 心胸痰滯, 大小便常多秘澀。**防葵丸方**

防葵(末) 滑石(各半兩) 牛黃 麝香(各半分) 巴豆(二十粒, 取霜) 膩粉 朱砂(各一分) 蛇蛻皮(一條, 燒灰)
上件藥同細研, 以糯米飯和丸如黍米大。每服以粥飲下二丸。量兒大小增減服之。

《聖惠》治小兒食癩, 乳食不消, 心腹壅滯, 四肢驚掣, 宜服此方。

朱砂 五靈脂(各一分) 巴豆(五枚, 去皮心, 研, 紙裏壓出油)
上件藥細研如粉, 用燒粟米飯和丸如黃米大。一、二歲兒, 每服用溫水下二丸, 以吐利為妙。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒乳食不消, 心腹結實, 壯熱煩悶, 搖頭反目, 口吐涎沫, 名為食癩。**鉛霜丸方**

鉛霜 膩粉(各一分) 巴豆(五粒, 去皮、心, 紙裏壓去油)
上件藥都研為末, 以糯米飯和丸如粟米大。每服以通草薄荷湯下一丸, 三歲以上加丸服之。

《聖惠》治小兒食癩, 墜痰涎。**金箔丸方**

金箔(五片, 細研) 甘遂(一分, 煨微黃, 搗為末) 膩粉(三分)
上件藥拌和, 研令勻, 以棗瓢和作劑子, 以五片金箔裹上, 更著濕紙裹煨, 灰火煨勻熱, 候冷取研, 丸如綠豆大。每服以人參湯下二丸。量兒大小以意加減。

張渙 **雄珠膏方** 治食癩, 快胸膈。

牛黃(研) 真珠(末, 研) 白僵蠶(細研) 丁頭代赭(搗為細末) 蕤仁(湯浸, 去赤皮, 為細末。各一分)
雄黃(半兩, 水磨精明者, 細研)

上件同拌勻, 煉蜜和丸如雞頭大。每服一丸至二丸, 人參湯化下。

張渙 **妙聖丹方** 治食癩, 利胸膈。

木香 代赭石 馬牙硝 川大黃(炮。各一分) 蠟梢(四十九枚, 微炒)

以上搗, 羅為細末。次用:

朱砂(半兩, 細研, 水飛) 麝香(一錢, 研) 龍腦(半錢, 研) 膩粉(半分) 巴豆(七個, 去皮心、膜, 紙裹出油細研)

上件一處拌勻, 滴水和丸如黍粒大。每服三粒至五粒, 磨沉香湯下, 乳後。量兒大小加減。

張渙 **蟾酥丹** 治食癩毒盛, 湯藥不下方。

蟾酥 真珠(末, 各研) 甘草(慢火煨黃) 牡蠣粉(研) 犀角屑(為末) 杏仁(麩炒, 去皮尖, 研細。各一分) 麝香(一錢, 研細) 巴豆(七粒, 去皮心、膜, 出油, 細研)

上件一處再研為細末, 用糯米飯和如丸黍米大。每服三粒, 煎荊芥湯, 放溫冷下。量兒大小加減。

熱癩第四

(亦名退癩除熱)

《聖惠》論：夫小兒熱癩者，由氣血不和，內有積熱之所致也。凡小兒骨木輕軟，腸胃細微，易為傷動。若乳食不常，臟腑壅滯，蘊播生熱，不得宣通，熱極甚者則發癩也。其狀口眼相牽，手足抽掣，口中吐沫，鼻裡作聲，頸項反張，腰背強直，身體壯熱，或叫或啼者，是熱癩之候也。

張渙論：小兒心神多不寧，將養過溫，內生邪熱，所以多驚，甚者變成諸癩，宜服退癩除熱之藥。

《外台》療未盈月兒及出月兒壯熱發癩。**鉤藤湯方**

鉤藤(一分) 蚱蟬(一枚, 去翅, 熬, 為末, 湯成下) 柴胡 升麻 黃芩 甘草(炙) 大黃(各二分) 蛇蛻皮(二寸, 炙) 竹瀝(三合) 石膏(三分, 研)

上十味切, 以水一升, 煮三合半, 和竹瀝服一合, 得利, 見湯色出, 停後服。至五六十日兒, 一服一合。

乳母忌海藻、菘菜等。崔氏云：若連發不醒, 加麻黃一分, 去節。

《聖惠》治小兒風壅氣盛, 心胸痰滯, 壯熱發癩。**鉤藤散方**

鉤藤(一分) 蚱蟬(二枚, 微炒, 去翅足) 川升麻 麥門冬(去心, 焙) 川大黃(銼, 研, 微炒) 甘草(炙微赤, 銼) 子芩(各半兩) 蛇蛻皮(五寸, 燒灰) 石膏(三兩)

上件藥搗, 羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 入竹瀝半合。量兒大小分減服之。

《聖惠》治小兒熱癩, 皮肉壯熱, 煩躁頭痛。宜服**茯神散方**

茯神 川升麻 鉤藤 甘草(炙, 銼, 微赤) 犀角屑(各三分) 白蘚皮 羚羊角(屑, 各半兩) 石膏(二兩) 龍齒(一兩) 蚱蟬(三枚, 微炒, 去翅足)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒百日已來至三、四歲發熱癩蝨, 身體如火。宜服**白蘚皮散方**

白蘚皮 黃芩 川升麻 地骨皮 鉤藤 犀角屑 胡黃連(各三分) 麥門冬(去心, 焙) 龍齒(各一兩) 甘草(一分, 炙微赤, 銼)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一升, 煎至五分, 去滓, 入牛黃末一字。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒熱癩, 嘔吐逆, 煩悶體熱。**子芩散方**

子芩 人參(去蘆頭) 犀角屑 甘草(炙微赤, 銼) 鉤藤(各半兩) 赤茯苓 川升麻(各三分)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 水一小盞, 煎至五分, 去滓。量兒大小分減服。

《聖惠》治小兒熱癩, 時時戴上眼, 吐沫。**鉤藤散方**

鉤藤(三分) 蚱蟬(二枚, 微炒, 去翅足) 人參(去蘆頭) 子芩 牛黃(細研, 留零入) 川大黃(銼碎, 微炒, 各半兩)

上件藥搗, 粗羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 入牛黃一字。量兒大小分減溫服。

《聖惠》治小兒體熱、嘔吐、發癩。**麥門冬散方**

麥門冬(一兩, 去心, 焙) 鉤藤(半兩) 黃芩 赤芍藥 川升麻 茯神 川大黃(銼碎, 微炒, 各三分)

上件藥搗, 羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 溫服。更量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒熱癩, 面赤心躁。**犀角散方**

犀角屑 鉤藤 元參 蚱蟬(微炒, 去翅足) 甘草(炙微赤, 銼) 川升麻 黃芩 梔子仁(各半兩) 麥門冬(一兩, 去心, 焙)

上件藥搗, 羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 入苦竹葉七片, 煎至五分, 去滓, 溫服。更量兒大小, 以意加減。

《聖惠》治小兒熱癩, 不知人, 迷悶, 嚼舌仰目。**梔子散方**

梔子仁(半兩) 子芩 鉤藤 吳藍(各一兩) 龍齒 石膏(各二兩) 川大黃(三兩, 銼碎, 微炒)

上件藥搗, 羅為散。每服一錢, 以水一小盞, 煎至五分, 去滓, 溫服。更量兒大小以意加減

《聖惠》治小兒熱過, 迷悶, 發癩。**升麻散方**

川升麻 鉤藤 使君子 子芩 朴硝(各一兩) 石膏 龍齒(各二兩。《嬰孺》各用四錢) 柴胡(去苗) 赤芍藥 川大黃(銼碎, 微炒, 各三分。《嬰孺》用大黃八分, 別搗, 候湯成, 和服)

上件藥搗, 羅為散。每服一錢, 水一小盞, 煎至五分, 去滓, 溫服。更量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒熱癩, 四肢抽掣, 每日數發, 宜服此除熱鎮心。**紫石英散方**

紫石英 石膏(各細研,水飛過) 滑石 白石脂 寒水石(各一兩) 川大黃(銼碎,微炒) 朱砂(細研,水飛過) 甘草(炙微赤,銼) 犀角屑(各半兩) 龍齒(二兩,細研) 牡蠣粉(一分)

上件藥搗,羅為散。每服以溫薄荷湯調下半錢。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒熱癩,發歇不定,眼目直視,身體壯熱,吐沫,心神迷悶。**牛黃丸方**

牛黃(半兩,研) 蚱蟬(三枚,微炒,去翅足) 石膏(細研,水飛過) 龍齒(細研。各二兩) 梔子仁 川升麻 犀角屑 胡黃連 鉤藤 龍膽(去蘆頭) 川大黃(銼碎,微炒) 杏仁(湯浸,去皮尖、雙仁,麩炒微黃。各三錢) 金銀箔(各十五片,細研)

上件藥搗,羅為末,入研了藥,同研令勻,煉蜜和,搗三二百杵,丸如綠豆大。每服,以竹瀝湯研五丸服之。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒熱癩,搖頭吐舌,四肢抽掣,心神驚悸。**虎睛丸方**

虎睛(一對,酒浸,微炙用) 牛黃(細研) 人參(去蘆頭) 鉤藤 茯神(各半兩) 麝香(一分,細研) 犀角屑(三分) 川大黃(銼,微炒) 朱砂(細研,水飛過。各一兩)

上件藥搗,羅為末,入研了藥,同研令勻,煉蜜和丸如綠豆大。一歲兒,以金銀湯研化一丸服之,日三服;兒稍大,加丸數服之。

《嬰孺》治少小驚癩,除熱。**二味丹參摩膏方**

丹參 雷丸(各二兩)

上煎豬脂並藥,七上七下,去滓,摩身上,日再三摩之。

《嬰孺》治少小百二十癩。止驚,常服除熱疾。**芍藥丸方**

芍藥 石膏 當歸 鐵粉(各三分) 蚱蟬(四個,自死者) 大黃 人參(各五分) 桂心(二分半) 銀屑 芎

龍骨 細辛 黃芩(各二分) 牛黃(三銖)

上為末,蜜丸麻子大。一服二丸,日三。如不知,稍增,可至四、五丸。

《嬰孺》治少小癩病,熱多者方。

壯荊根(十五斤,細銼,洗淨) 生鐵(一大半,碎) 黑豆(一大斤半,布袋盛) 甘草(一大兩,碎)

上件藥以水五大斗,煎取一斗半,去滓,澄清、濾,煎如飴。每食,上取一匙和桑谷湯及酒服之,日再服。

重者,一月永瘥。

張渙 **蟬殼散方** 治諸癩挾熱。

蟬殼 人參(去蘆頭。各半兩) 黃芩 茯神 川升麻(各一分)

以上搗,羅為細末。次用:牛黃(一分,研) 天竺黃(研) 牡蠣粉(研。各一錢)

上件同細研勻。每服半錢,煎荊芥薄荷湯調下。

張渙 **犀角湯方** 退癩,鎮心神。

犀角屑(一兩) 茯苓(細銼) 麥門冬(去心, 焙乾) 人參(去蘆頭) 甘草(炙) 黃芩(各半兩)
上件搗, 羅為細末。每服一錢, 水八分, 入生地黃汁少許, 同煎四分, 去滓, 溫服。

癲癇第五

《黃帝素問》奇病論：帝曰：人生有病癲疾者，病名謂何？安所得之？歧伯曰：病名為胎病。此得之在母腹中，時母有所大驚，氣上而不下，精氣並居，故令子發為癲也。

《巢氏病源》：癇者，小兒病也。十歲以上為癲，十歲以下為癇。其發之狀，或口眼相引而目睛上搖，或手足掣，或背脊強直，或頸項反折。諸方說癇，名証不同，大體其發之源皆因三種。三種者，風癇、驚癇、食癇是也。

《聖惠》論：夫小兒癲癇者，由風邪、熱毒傷於手少陰之經故也。心為帝王，神之所舍，其臟堅固不受外邪。

若風熱蘊積於心，則令恍惚不安，精神離散，榮衛氣亂，陰陽相並，故發癲癇也。又云：小兒在胎之時，其母卒有大驚，精氣並居，則令子癲癇也。

張渙論：小兒五、七歲至十歲以上發癇者，若精神恍惚不定，陰陽相乾，霍亂之類，病乃名癲疾。

《顛凶經》治孩子從一歲至大，癲發無時，口出白沫，小便淋瀝不利，**二十二味虎睛丸**

虎睛(一雙, 左眼佳, 曝乾, 酒浸令黃色) 真珠 蜂房(各三錢) 麻黃(二分, 去節) 鉤藤(三分) 鐵精 防葵 大黃 子芩 龍齒 銀屑 梔子仁 羌活(各四分) 柴胡 升麻 白蘚皮 雷丸(燒令赤) 人參(各三分) 細辛(一分半) 蛇皮(五寸, 炙) 石膏(五分) 蚱蟬(四枚, 去翅足, 炙)

上件為末, 研, 煉蜜為丸。四、五歲如赤豆大五丸, 日再服。大兒十丸, 米飲下。忌生、冷、油膩。

《外台》：《古今錄驗》療五癲。牛癲則牛鳴，馬癲則馬嘶，狗癲則狗吠，羊癲則羊鳴，雞癲則雞鳴。五癲病者，腑臟相引，盈氣起寒，厥不識人，氣急掣，吐沫，久而得蘇。**雄黃丸方**(《千金》名雄雌丸) 雄黃(研) 雌黃(一方無，一方用一兩) 真珠(末) 水銀(各一兩, 熬。《千金》水銀使八分) 鉛丹(二兩, 熬成屑。《千金》此一味是鉛) 丹砂(半兩, 研。《千金》用二兩?)

上六味□o, 和以蜜又搗三萬杵, 為丸。先食, 服胡豆大三丸, 日再, 驚癇亦愈。良。(《千金》、《范汪》同, 兒三丸如小豆。忌生、血物。)

《聖惠》治小兒心臟積熱，時發癲癇，嘔吐涎沫，作聲迷悶。**鐵粉丸方**

鐵粉 龍齒(各細研, 一兩) 鉛霜 麝香(各細研) 天南星(各一分) 天麻(三分) 朱砂(細研, 水飛過) 水銀 黑鉛(各半兩, 與水銀結為砂子, 細研)

上件藥搗, 羅為末, 都研令勻。以煉蜜和丸如綠豆大。每服, 以竹瀝研化五丸服之。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒癲，發動無時，心悶吐沫。**雄黃丸方**

雄黃 鐵粉(各細研) 朱砂(細研, 水飛過。各半兩) 豬膽(二枚) 熊膽(一分) 鯉魚膽(七枚) 烏牛膽(半枚) 青羊膽(二枚) 麝(一錢, 細研)

上以諸般膽汁相和令勻, 即入諸藥末, 和丸如綠豆大。每服以金銀湯下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒五歲至七歲發癲癩, 無時發動, 口出白沫, 遺失大小便不覺。**虎睛丸方**

虎睛(一對, 細研) 朱砂(細研, 水飛過, 半兩) 雷丸(三分) 露蜂房(炙) 麻黃(去根節) 子芩 甘草(炙微赤, 銼) 天麻 鉤藤(各半兩) 防葵 川大黃(銼碎, 微炒) 龍齒(細研) 梔子仁 石膏(細研, 水飛過) 蚱蟬(去翅足, 微炙。各一兩) 銀箔(三十片, 細研) 麝香 牛黃(各細研) 蛇蛻皮(銼, 微炒。各三分) 羌活 柴胡(去苗) 白蘚皮 川升麻 沙參(去蘆頭。各三分)

上件藥搗, 羅為末, 煉蜜和, 搗三、二百杵, 丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒癲癩, 蝮, 發歇無時。**地龍散方**

乾地龍(半兩, 微炒) 虎睛(一對, 微炙) 人參(一分, 去蘆頭)

以上三味同搗, 羅為末。

金銀箔(各三十片) 朱砂 雄黃 天竺黃 代赭 鉛霜 鐵粉(各一分)

上件藥都研細, 入前三味研令勻。每服以溫水調下半錢。更看兒大小加減。

《聖惠》治小兒癲癩至大不瘥, 或發即口出白沫, 並大小便出不知。**虎睛丸方**

虎睛(一對, 酒浸一宿, 微炒, 細研) 朱砂 石膏(各細研, 水飛過) 鐵粉 龍齒(細研。各一兩) 露蜂房(微炙) 羌活 鉤藤 防葵 麻黃(去根節) 川升麻(各半兩) 細辛(一分) 牛黃(半分, 細研) 蚱蟬(四枚, 去翅足, 炙)

上件藥杵, 羅為末, 都研令勻, 煉蜜和丸如麻子大。每服以溫水下五丸。量兒大小加減服之。

《聖惠》治小兒癲癩, 連年不瘥方。

鉛 水銀(各二兩) 硫黃 鐵粉(各一兩)

上先將鉛於鑊子中令消, 即下硫黃, 炒不住手, 就鑊研攪; 待硫黃煙氣似息, 入水銀又攪; 次下鐵粉, 以武火燒, 少時將出。一夜露地出火毒後, 研令極細, 即以粟米飯和丸如綠豆大。每於食後, 以金銀湯下五丸。量兒大小以意加減。

《聖惠》治小兒癲癩等疾方。

光明朱砂(二兩, 顆塊者)

上以金箔隨朱砂顆塊大小各裹之, 用磁石末入固濟了瓶子中, 實築中心留一坑子, 即以朱砂置坑子內, 上更以磁石末覆之瓶子口, 更以鉛一片可瓶口大小蓋之。以文火養七日, 火常令露鉛以箸刺得入。養一七日後, 去鉛, 大火 之, 候冷出, 於乳鉢中細研, 即置於通油鉢子內; 上以馬牙硝末遍覆之, 即置飯甑中, 蒸一炊久, 其朱砂化成水。有患者, 食後以溫水調下半錢。量兒大小以意加減服之。

《聖惠》治小兒癲癩, 欲發即精神不足, 眼目不明, 蝮 惡聲, 嚼舌吐沫。**雌雄丸方**

雌黃(細研, 炒令褐色) 黃丹(炒令褐色。各一兩) 麝香(一分)

上件藥相和, 細研如粉。用牛乳一升, 慢火熬成膏, 可丸即丸如綠豆大。每服以溫水下三丸, 日三服。量兒大小, 以意加減服之。

《聖惠》治小兒癲癩, 發歇不定。朱砂丸方

朱砂(細研, 水飛過) 鉛霜 鐵粉 馬牙硝(各一兩)

上件藥細研如面, 以棗肉和丸如綠豆大。每於食後, 以熱水下三丸。量兒大小以意加減。

《嬰孺》治小兒一、二歲發癩, 至大不瘥, 成癩病, 發無時, 口出白沫, 並大小便不知出。虎睛丸方

虎睛(一具, 酒浸一宿, 炙黃) 丹砂 鐵粉(精) 子芩 大黃 龍齒 梔子仁 銀屑(各四分) 蜂房(炙) 鉤藤皮 柴胡 白蘚皮 麻黃(去節) 雷丸(炙。各二分) 羌活 沙參 升麻(各三分) 牛黃(半分) 蚱蟬(四枚, 去翅足, 自死者) 防葵 蛇蛻皮(各七分, 炙) 細辛(一分半) 石膏(五分)

上為末, 蜜丸。四、五歲服大豆大十丸。與《顛凶經》藥味同, 只多牛黃及分兩不同。

張渙 熊膽丹方 治癲癩, 鎮心安神。

真熊膽 鐵粉(各細研) 朱砂(細研, 水飛) 生天南星(末) 雄黃(水磨精明者, 別研。各半兩) 粉霜(一分, 研) 腦麝(各研一錢)

上件同拌勻, 用豬膽一枚, 取汁和諸藥, 丸如黍米大。每服十粒至二十粒, 煎金銀薄荷湯下。

張渙 天麻散方 祛風, 治癲癩。

天麻 防風 麻黃(去節根。各一分) 甘草(炙) 川升麻 羌活 黃芩 川大黃(炮。各半兩)

上件搗, 羅為末。每服一錢, 水一盞, 煎至五分, 去滓, 放溫服。

張渙 黑錫丹方 治癲癩及諸癩, 胞絡涎盛。

黑錫(二兩, 同水銀半兩慢火結砂子) 鉛霜 鐵粉(各細研, 半兩) 麝香(一分, 細研) 天南星(一兩, 炮, 取末)

上件同再研勻, 滴水如黍米大。每服十粒, 煎竹葉湯下。

張渙 日應丹方 治癲癩連年不瘥。

黑錫 硫黃 水銀(細研) 鐵粉(研。各一兩) 金銀箔(各三十片)

上件將錫於鑊子內熔令消, 即入硫黃, 炒不住手, 就鑊研攪; 候硫黃煙氣似息, 次入水銀、鐵粉、金銀箔同攪。用緊火燒, 少時都傾出, 露地一宿, 出火毒; 再研和勻, 用粟米飯和如綠豆大。每於食後, 服五粒至七粒, 煎人參湯下。量兒大小加減。